

Cours De Résidanat

Sujet : 1

Les Accidents Vasculaires Cérébraux

Dr Khalil Ayadi

Laboratoire d'anatomie humaine

Faculté de médecine de Sfax

Sfax le 30/06/2025






Objectifs :

I. Accident Vasculaire Cérébral ischémique :

- 1.** Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale.
- 2.** Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques.

Aires corticales



- Brodmann a étudié la cytoarchitectonie du cortex
- ➔ Subdivision du cortex en aires cérébrales
- La classification de Brodmann a défini **52 aires**



Le lobe frontal



Lobe frontal

- Il est subdivisé en plusieurs gyri par des sillons
- On distingue trois régions :
 - Motrice
 - Prémotrice
 - Préfrontale




La region motrice

- L'aire 4
- Correspond à l'aire motrice primaire
- La frontale ascendante ++





- Les projections motrices se font selon une organisation somatotopique précise
- La surface corticale correspondante à un territoire vasculaire est en rapport avec son importance fonctionnelle
- ➔ Homonculus moteur de Penfield



La region pré-motrice



- L'aire 6
- Correspond à l'aire prémotrice et à l'aire motrice supplémentaire
- Planification des mouvements complexes et coordonnés
- Imagination du mouvement



- L'aire 8


- Les aires cortico-oculo-céphalogyres

➔ mouvements conjugués des yeux associés aux mouvements de la tête



Aire de Broca



- Dans l'hémisphère **dominant**
- **F3**
- Les aires 44 et 45
- Constituent l'aire de Broca
- Impliquée dans l'**expression** du langage.
- ➔ **Aphasie de Broca**



Le lobe pariétal



La face latérale

- Le sillon post-central
- Sépare P1 + P2 du gyrus post-central (ou pariétal ascendant)




Lobe pariétal

- Le lobe pariétal remplit des fonctions principalement sensibles.
- L'aire somesthésique primaire (aires 3, 1, 2)
- C'est la pariétale ascendante ++




Lobe pariétal

- Aire 3 : l'aire somato-sensitive
- Aire 2 : l'aire somato-psychique d'interprétation
- Aire 1 : l'aire somato-psychique de perception.
- Aire 5 : l'aire somato-gnosique de reconnaissance





- Les projections sensibles se font, comme pour le cortex moteur, selon une organisation somatotopique précise
- ➔ Homonculus sensitif de Penfield



Lobe temporal

Aire de Wernicke

- Dans l'hémisphère dominant
- La partie postérieure du gyrus temporal supérieur intervient dans la **compréhension** du langage
- Aire 22 ou aire de Wernicke
- ➔ Aphasie de Wernicke



Merci pour votre attention