

Cancer du Cavum

Objectif (1)

1. Le Cavum

- A. Constitue la partie moyenne du pharynx
- B. Est situé sous la base du crâne
- C. Est compris entre les choanes et le rachis cervical haut
- D. Est caché à l'observateur par le rideau vélo-palatin.
- E. Sa taille et sa forme évoluent avec l'âge

2. Le Cavum

- A. A une forme de parallélépipède
- B. Sa limite inférieure est constituée par un plan horizontal tangent au bord supérieur de l'épiglotte
- C. S'ouvre en bas directement dans le laryngopharynx
- D. Sa paroi latérale est musculo-aponévrotique
- E. Sa paroi antérieure est constituée par les choanes.

3. La paroi postéro-supérieure du cavum :

- A. présente une formation lymphoïde
- B. répond en haut à la partie postérieure du corps sphénoïdal et au sinus sphénoïdal
- C. répond en haut et en avant à la fosse cérébrale antérieure
- D. répond en arrière à l'espace rétro-pharyngé et à la moitié supérieure de la dent de l'axis
- E. est vascularisée par des branches collatérales de l'artère carotide interne

4. cocher les bonnes réponses

- A. La paroi latérale du cavum répond à la glande parotide
- B. La paroi latérale du cavum répond en haut à la trompe auditive
- C. La paroi latérale du cavum répond au dessous de l'ostium de la trompe auditive à l'espace maxillo-pharyngé.
- D. La paroi antérieure du cavum répond en avant aux fosses nasales.
- E. La paroi antérieure du cavum répond en avant aux sinus maxillaires

5. Cocher les bonnes réponses :

- A. Le réseau lymphatique est très riche au niveau du toit du cavum
- B. Le réseau lymphatique est pauvre au niveau des parois latérales du cavum
- C. Le réseau lymphatique est constitué de 3 types de collecteurs principaux
- D. L'espace rétro-pharyngé contient des ganglions lymphatiques
- E. Les voies de drainage lymphatiques du cavum sont communes à celles des cavités nasales

6. Cocher les bonnes réponses :

- A. les ganglions jugulaires internes constituent une voie principale du drainage lymphatique du cavum
- B. les ganglions de la chaîne cervicale transverse constituent une voie principale du drainage lymphatique du cavum
- C. Le caractère croisé des voies lymphatiques explique la fréquence des adénopathies bilatérales.
- D. La topographie profonde du cavum rend le diagnostic du cancer du cavum tardif
- E. Les parois latérales du cavum entretiennent des rapports étroits avec les espaces parapharyngés rétrostyliens et préstyliens

7. Citer deux rapports supérieurs du Cavum

.....

.....

.....

.....

8. Citer deux signes cliniques en rapport avec l'extension antérieure du cancer du Cavum

.....

.....

9. Citer une structure anatomique pouvant être envahie en cas d'extension postérieure du cancer du cavum

.....

.....

10. Expliquer la survenue d'ophtalmoplegie en cas d'extension endocrânienne du cancer du cavum

.....

.....

11. Citer deux signes cliniques en rapport avec l'extension endocrânienne du cancer du cavum

.....

.....

12. Citer 2 rapports latéraux du cavum

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. Citer un signe clinique en rapport avec l'extension latérale du cancer du cavum

.....

.....