

Question 29 : Les états confusionnels

1) Les éléments sémiologiques suivants peuvent se voir au moment d'un delirium :

- A- Idées délirantes mélancoliques
- B- Idées fixes post onirique
- C- Perplexité anxieuse
- D- Lacune mnésique
- E- Tremblement

Réponse : **CE**

2) On entend par « Syndrome confusionnel » :

- A- L'état d'altération progressive et irréversible des fonctions cognitives
- B- La sidération des automatismes acquis entraînant une perte des réactions d'adaptation posturale, avec difficulté à se maintenir en orthostatisme
- C- Ou delirium, l'état de faillite temporaire et réversible du fonctionnement
- D- L'impossibilité d'obtenir la ration protéino-énergétique nécessaire à cause de la sévérité de la maladie et l'intensité de l'anorexie
- E- Une altération de la capacité à réaliser une activité malgré des fonctions motrices intactes

Réponse : **C**

3) Le syndrome confusionnel, chez le sujet âgé est favorisé par :

- A- Le déficit de réserve fonctionnelle rénale
- B- Des troubles cardio-vasculaires
- C- Le stress environnemental
- D- Des troubles métaboliques
- E- Les effets du vieillissement sur le cerveau

Réponse : **ABCDE**

4) Les confusions mentales :

- A- Sont le plus souvent d'origine psychogène
- B- Évoluent toujours vers un état démentiel
- C- Ont comme symptomatologie principale des troubles de l'humeur
- D- S'accompagnent dans les formes aiguës d'une hyperthermie
- E- Peuvent mettre en jeu le pronostic vital

Réponse : **DE**

5) Les symptômes qui sont au premier plan lors du syndrome confusionnel chez le sujet âgé :

- A- Les troubles de la mémoire
- B- L'onirisme
- C- La perplexité anxieuse
- D- Les troubles de la conscience
- E- La désorientation temporo-spatiale

Réponse : **DE**

6) Tous les symptômes suivants peuvent se voir lors d'un état confusionnel chez l'alcoolique, sauf un, lequel ?

- A- Perplexité anxieuse
- B- Amnésie lacunaire
- C- Troubles de la vigilance
- D- Fabulation compensatrice
- E- Fausses reconnaissances

Réponse : **B**

7) Concernant les symptômes prodromiques de la confusion mentale :

- A- Ils s'installent de façon très progressive
- B- Ils se caractérisent par la tolérance de l'hyper-luminosité
- C- Leur apparition chez un patient à risque implique son hospitalisation
- D- Les troubles du sommeil sont fréquents
- E- Des modifications de l'humeur et du caractère peuvent se voir

Réponse : **DE**

8) Concernant la confusion mentale :

- A- Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique
- B- Elle se définit par une dysfonction partielle aigüe, transitoire des activités supérieures
- C- L'évolution fluctuante est une caractéristique principale de la confusion mentale
- D- Elle s'accompagne par un délire polymorphe dans ses thèmes et ses mécanismes
- E- Elle s'installe progressivement

Réponse : **AC**

9) Quelles affirmation(s) retenez-vous pour caractériser un syndrome confusionnel ?

- A- L'onirisme est constamment retrouvé
- B- Les troubles de la mémoire des faits anciens sont constants
- C- L'étiologie la plus fréquente est organique
- D- La perplexité anxieuse est un des symptômes caractéristiques
- E- Le contact verbal est impossible

Réponse : **CD**

10) Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes. Un état confusionnel peut être déclenché par :

- A- Une prise de L.S.D
- B- Une prise de phénothiazine
- C- Un traumatisme crânien
- D- Une hypoxie
- E- Un traitement corticoïde

Réponse : **ABCDE**

11) Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes. Un état confuso-délirant peut être déclenché par :

- A- Une prise de L.S.D
- B- Une prise de phénothiazine
- C- Un traumatisme crânien
- D- Une hypoxie
- E- Un traitement corticoïde

Réponse : **ACDE**

12) Dans un syndrome confusionnel, quel est ou quel sont le(s) signe(s) cliniques orientant vers un délirium tremens ?

- A- Délire érotomaniaque
- B- Hypothermie
- C- Catatonie
- D- Tremblements réguliers intenses des extrémités
- E- Onirisme professionnel

Réponse : **DE**

13) Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) une (des) cause(s) possible(s) de syndrome confusionnel ?

- A- Sevrage brutal chez un alcoolique chronique
- B- Conversion somatique
- C- Intoxication médicamenteuse par les antidépresseurs tricycliques
- D- Traumatisme crânien
- E- Accès d'angoisse

Réponse : ACDE

14) Concernant la confusion mentale chez l'alcoolique :

- A- Elle peut être précédée par des hallucinations transitoires non critiquées par le patient
- B- Les thèmes professionnels et mystiques de l'onirisme sont évocateurs du delirium tremens
- C- La tachypnée et les tremblements sont des signes retrouvés lors du delirium tremens
- D- Un EEG est indiqué
- E- L'hypertension avec évolution vers un collapsus en l'absence de prise en charge est possible

Réponse : CE

15) L'amnésie est rencontrée dans toutes les pathologies suivantes, sauf une, laquelle ?

- A- Syndrome de Korsakoff
- B- Hystérie
- C- Maladie d'Alzheimer
- D- Névrose obsessionnelle
- E- Confusion mentale

Réponse : D

16) Concernant le delirium tremens :

- A- Il peut se voir lors d'une consommation excessive d'alcool
- B- S'accompagne d'une hypertension artérielle
- C- Il peut se compliquer de crises convulsives
- D- Il répond bien au traitement antidépresseur
- E- Une supplémentation en thiamine (vitamine B1) est recommandée pour le prévenir

Réponse : BC

17) Les confusions mentales :

- A- Sont le plus souvent d'origine médicamenteuse chez le sujet âgé
- B- Évoluent toujours vers un état démentiel
- C- Ont comme symptomatologie principale des troubles de l'humeur
- D- S'accompagnent d'une hyperthermie
- E- Peuvent mettre en jeu le pronostic vital

Réponse : ADE

18) Un élément sémiologique est faux dans cette description d'état confusionnel, lequel ?

- A- Onirisme
- B- Indifférence
- C- Altération du rythme veille-sommeil
- D- Troubles de la vigilance
- E- Ecmnésie

Réponse : B

19) La confusion mentale se caractérise par :

- A- Délire polymorphe
- B- Désorientation temporo-spatiale
- C- Les trémulations
- D- Le début progressif
- E- La fluctuation de la symptomatologie

Réponse : BE

20) Parmi les désordres suivants, quel est celui que l'on ne rencontre pas dans un état confusionnel ?

- A- Hallucinations visuelles
- B- Hallucinations auditives
- C- État dissociatif
- D- Interprétation pathologique
- E- Illusion sensorielle

Réponse : C

21) Parmi les médicaments suivants, quels sont ceux qui peuvent induire un état confusionnel ?

- A- Corticoïdes
- B- Antiparkinsoniens
- C- Sels de Lithium
- D- Antidépresseurs tricycliques
- E- Amines

Réponse : ABCD

22) La forme mixte de la confusion mentale :

- A- Elle peut constituer un diagnostic différentiel avec la démence
- B- Elle se caractérise par la coexistence de symptômes dépressifs et maniaques
- C- Elle signe une étiologie toxique
- D- Il s'agit d'un mélange de symptômes d'hypo- et d'hyper-activité
- E- Elle est de bon pronostic

Réponse : D

23) Parmi les médicaments suivants, quels sont ceux qui peuvent induire un état confusionnel ?

- A- Les anti-arythmiques
- B- Les corticoïdes à fortes doses
- C- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
- D- Les anti-histaminiques (anti H2)
- E- Les digitaliques

Réponse : ABCDE

24) Un syndrome confusionnel peut être évoqué devant :

- A- La prostration
- B- Indifférence
- C- Inversion du rythme nyctéméral
- D- Délire polymorphe
- E- Désorientation temporo spatiale

Réponse : ACE

25) Quelle sont les propositions vraies concernant la confusion mentale ?

- A- C'est un trouble du cours de la pensée
- B- C'est un trouble de la vigilance
- C- Elle affecte l'orientation temporo-spatiale
- D- Elle s'accompagne d'hallucinations visuelles
- E- On y observe un état de perplexité anxieuse

Réponse : BCDE

26) Concernant le patient confus :

- A- Il présente une hypoactivité associée à une vigilance accrue dans le delirium dû au sevrage d'une substance ou toxique
- B- Il peut présenter un mélange de symptômes d'hypo- et d'hyperactivité
- C- Il présente une altération des souvenirs anciens
- D- Il présente une réduction de la capacité à résoudre les problèmes
- E- Il présente une amnésie et une catalepsie

Réponse : BD

27) Peuvent entraîner un état confusionnel :

- A- Le sevrage brutal des barbituriques
- B- L'hypoglycémie
- C- L'hypercuprémie
- D- L'intoxication saturnine
- E- L'intoxication mercurielle

Réponse : **ABCDE**

28) Quelle(s) affirmation(s) reprenez-vous pour caractériser un syndrome confusionnel ?

- A- La fluctuation de la symptomatologie est constamment retrouvée
- B- La privation sensorielle est un facteur aggravant
- C- L'hyperstimulation sensorielle est un facteur aggravant
- D- La perte de la capacité de s'identifier
- E- L'incapacité de soutenir ou de déplacer l'attention

Réponse : **ABCE**

29) Lors du delirium :

- A- Le discours peut être décousu ou incohérent
- B- On retrouve des fausses reconnaissances avec des fabulations
- C- Les troubles de l'humeur les plus habituels sont la colère et l'agressivité injustifiée
- D- Le patient peut passer rapidement d'une émotion à une autre au cours de la même journée
- E- Le sommeil est toujours court et fragmenté

Réponse : **ADE**

30) Au cours des syndromes confusionnels, on rencontre tous les symptômes suivants, sauf un, lequel ?

- A- Troubles de la vigilance
- B- Troubles de l'idéation
- C- Recrudescence matinale
- D- Agitation anxieuse
- E- Onirisme

Réponse : **C**

31) Un syndrome confusionnel associe sur le plan sémiologique :

- A- Une désorientation temporelle et spatiale
- B- Une fluctuation des symptômes au cours du nyctémère, avec aggravation le soir
- C- Un onirisme où prédominent les hallucinations auditives
- D- Une obnubilation de la conscience, de degré variable
- E- Une hypermnésie de l'épisode pathologique, après sa résolution

Réponse : **ABD**

32) Les causes à évoquer systématiquement devant un delirium tremens :

- A- Une infection intercurrente
- B- La prise de neuroleptique
- C- L'arrêt brutal de l'intoxication éthylique
- D- Une intervention chirurgicale
- E- Un traitement antidépresseur

Réponse : **ACD**

33) La confusion mentale chez le consommateur d'alcool :

- A- La consommation de l'alcool est une étiologie exceptionnelle de la confusion mentale
- B- Les états confusionnels dus à une intoxication alcoolique aigüe sont transitoires, et régressifs
- C- Les états confusionnels dus à une intoxication alcoolique aigüe sont suivis d'une amnésie et sont sans lendemain
- D- L'encéphalopathie hépatique est l'une des étiologies de la confusion mentale lors des intoxications aigües
- E- Elle peut se voir dans les suites d'un sevrage brutal

Réponse : **BE**

34) L'évolution de l'état confusionnel :

- A- L'évolution favorable est la plus fréquente
- B- L'amélioration concomitante de l'état mental et physique prédit un bon pronostic
- C- Des idées fixes post oniriques apparaissent et évoluent habituellement vers un délire chronique post-onirique
- D- L'évolution mortelle peut survenir par l'épuisement et les désordres métaboliques sévères
- E- Elle dépend de l'étiologie et de la fragilité du terrain

Réponse : ABDE**35) Au cours des syndromes confusionnels, on rencontre les symptômes suivants, sauf un, lequel ?**

- A- Troubles de la conscience
- B- Quasi mutisme
- C- Paraphasies
- D- Agitation anxieuse
- E- Apathie

Réponse : C**36) Le syndrome confusionnel comporte :**

- A- Un état toxi-infectieux
- B- Un onirisme
- C- Une désorientation temporo spatiale
- D- Une perplexité anxieuse
- E- Une exaltation euphorique de l'humeur

Réponse : BCD**37) Un état stuporeux peut être constaté au cours de l'évolution de :**

- A- La schizophrénie
- B- La confusion mentale
- C- La mélancolie
- D- La dépression névrotique
- E- Les délires chroniques

Réponse : ABCE**38) Un syndrome confusionnel peut être évoqué devant :**

- A- Hébétude
- B- Agitation alternant avec la prostration
- C- Dépersonnalisation
- D- Perplexité anxieuse
- E- Troubles mnésiques

Réponse : ABDE**39) On peut soupçonner la présence d'un état confusionnel chez un patient qui :**

- A- Est agité
- B- Ne retrouve pas sa chambre
- C- Présente un ralentissement psychomoteur
- D- Présente une inversion du rythme nyctéméral
- E- A de la peine à répondre à des questions simples

Réponse : ABCDE**40) Lors d'un délirium tremens, le patient peut présenter :**

- A- Astasie-abasie
- B- Agitation anxieuse
- C- Vigilance normale
- D- Onirisme avec zoopsie
- E- Elévation de la température

Réponse : BDE

41) Laquelle (Lesquelles) des propositions suivantes décrit (décrivent) un trouble du fonctionnement cognitif chez le confus ?

- A- Un trouble de la mémoire
- B- Un trouble de la sensibilité tactile
- C- Une désorientation dans l'espace
- D- Des troubles du langage
- E- Un trouble de la motricité

Réponse : ACD

42) Lors d'un délirium tremens, le patient peut présenter :

- A- Antécédent d'alcoolisme
- B- Automatisme mental
- C- Tremblement régulier des extrémités
- D- Sueurs
- E- Crampes musculaires

Réponse : ACDE

43) Quelle(s) affirmation(s) fait(font) partie de la définition de l'état confusionnel ?

- A- La symptomatologie est fluctuante au cours de la journée et peut varier d'une heure à l'autre
- B- Le patient présente des troubles de la vigilance et de l'état de conscience
- C- On retrouve classiquement dans l'histoire du patient des antécédents psychiatriques de type psychotique
- D- Sa cause est somatique (organique)
- E- L'état confusionnel s'installe généralement en 5 à 6 semaines

Réponse : AB

44) Les facteurs suivants prédisposent un patient à développer un état confusionnel :

- A- Le refus d'accepter la maladie qui l'affecte
- B- La présence de troubles cognitifs préexistants
- C- Une poly-médication
- D- Un abus chronique d'alcool
- E- Un quotient intellectuel bas

Réponse : BCD

45) Concernant le délirium tremens, on retrouve :

- A- Il peut être précédé par des vomissements
- B- Il est dû à l'arrêt brutal et non médicalisé de la consommation d'opiacés
- C- L'insomnie est habituelle
- D- Une claustrophobie peut être retrouvée
- E- La dysarthrie peut se voir

Réponse : ACE

46) Un état confusionnel peut être déclenché par :

- A- Une prise de benzodiazépines
- B- Un traumatisme cranio-cérébral
- C- L'annonce d'une mauvaise nouvelle
- D- Un traitement corticoïde
- E- Un sevrage des benzodiazépines

Réponse : ABCDE

47) Lorsqu'un patient présente un état confusionnel sans signe de localisation, quels sont les deux examens les plus importants à effectuer ?

- A- NFS
- B- Albumine sanguine
- C- ECG
- D- Ionogramme (Na⁺, K⁺,...)
- E- Glycémie capillaire

Réponse : CE

48) Parmi les affections suivantes, laquelle(lesquelles) peut (peuvent) être à l'origine d'un état confusionnel chez la personne âgée ?

- A- Accident vasculaire cérébral (AVC)
- B- Infection urinaire
- C- Hyperglycémie
- D- Consommation de benzodiazépines
- E- Douleur intense

Réponse : ABCDE

49) Quel est, en règle générale le traitement médicamenteux de choix de l'état confusionnel aigu ? (Une seule réponse correcte)

- A- La Lévomépromazine (Nozinan®)
- B- Le Halopéridol (Haldol®)
- C- La Gabapentine (Neurontin®)
- D- La Carbamazépine (Tegretol®)
- E- Le Lorazépam (Temesta®)

Réponse : B

50) L'état confusionnel aigu ou Delirium :

- A- Est une pathologie psychiatrique qui nécessite généralement une hospitalisation en milieu spécialisé
- B- S'améliore la nuit
- C- Est une affection médicale rare qui touche essentiellement les patients ayant des antécédents de schizophrénie
- D- Est essentiellement rencontrée chez des patients jeunes ayant récemment consommé du LSD
- E- N'est pas toujours complètement réversible et peut laisser des séquelles

Réponse : E

51) Parmi les situations suivantes, laquelle (lesquelles) suffit (suffisent) à expliquer la survenue d'un état confusionnel ?

- A- Un trouble bipolaire (psychose maniaco-dépressive)
- B- Un excès de cholestérol
- C- L'hypoxie
- D- Une embolie pulmonaire
- E- Une infection urinaire

Réponse : ACDE

52) Face à un patient confus, il convient de :

- A- Lui répéter régulièrement la date et le lieu où il se trouve
- B- Lui parler en le nommant
- C- Lui retirer lunettes et appareil auditif pour limiter les stimulations externes
- D- L'attacher avec douceur
- E- Le regarder en face

Réponse : ABE

53) Les pathologies pouvant représenter un diagnostic différentiel avec la confusion mentale dans sa forme hypoactive :

- A- Débilité mentale
- B- Hystérie
- C- Mélancolie délirante
- D- Catatonie
- E- Paranoïa

Réponse : CD

54) Face à un état de stupeur, la confusion mentale est évoquée devant :

- A- La présence d'une désorientation temporo-spatiale
- B- L'EEG montre un ralentissement général de l'activité
- C- Les antécédents d'un épisode maniaque
- D- Le passage rapide d'un état de profonde tristesse vers un état d'euphorie au cours de la même journée
- E- Une déshydratation

Réponse : ABDE**55) Face à un état de stupeur, la mélancolie stuporeuse est évoquée devant :**

- A- La présence d'une désorientation temporo-spatiale
- B- L'EEG montre un ralentissement général de l'activité
- C- Les antécédents d'un épisode maniaque
- D- Le passage rapide d'un état de profonde tristesse vers un état d'euphorie au cours de la même journée
- E- Une déshydratation

Réponse : CE**56) Les éléments de mauvais pronostic lors de l'évolution de l'état confusionnel :**

- A- La survenue chez le sujet âgé
- B- La discordance entre l'amélioration mentale et celle physique
- C- La survenue même de la confusion
- D- La rapidité de la prise en charge
- E- La survenue chez un sujet présentant une pathologie neurologique préalable

Réponse : ABCE**57) Après l'épisode confusionnel, le patient peut présenter :**

- A- Idées fixes post onirique
- B- Amnésie de fixation
- C- Évolution vers la paranoïa
- D- Perte de la capacité de s'identifier
- E- Rechute

Réponse : AE**58) Un syndrome confusionnel peut se compliquer par :**

- A- Un raptus anxieux
- B- Une défenestration
- C- De l'hétéro-agressivité
- D- Un acte suicidaire
- E- Conduites addictives

Réponse : ABCD**59) Le délire aigu compliquant un syndrome confusionnel est caractérisé par :**

- A- La rareté
- B- L'inhibition intense
- C- L'hypothermie
- D- L'hyperazotémie
- E- Les fausses reconnaissances

Réponse : AD**60) Le syndrome biologique du patient confus peut révéler :**

- A- Un hématicrite augmenté
- B- Des anomalies glycémiques
- C- Une hyperazotémie
- D- Une hypoprotidémie
- E- Une acidocétose

Réponse : ABCE

Cas clinique N°1

Madame Y., 82 ans, est hospitalisée en chirurgie orthopédique après un accident de la voie publique; elle a été opérée de multiples fractures (fémur, épaule, poignet).

À J + 3 de l'intervention, elle inquiète l'équipe soignante en demandant le goûter après le petit déjeuner et veut quitter le service pour dit-elle aller chercher sa fille de 5 ans à l'école.

1- Quel diagnostic évoquez-vous ?

- A- Troubles obsessionnels compulsifs
- B- Troubles dépressifs
- C- Etat confusionnel
- D- Schizophrénie
- E- Autres diagnostics que ceux ci-dessus

Réponse : C

2- Parmi les étiologies du syndrome confusionnel citées ci-dessous, quelle est la plus fréquente chez la personne âgée ?

- A- L'hyperglycémie
- B- L'insuffisance hépatique
- C- La tumeur cérébrale
- D- Les causes médicamenteuses
- E- L'encéphalopathie hypertensive

Réponse : D

3- Le syndrome confusionnel se définit par :

- A- Une altération des fonctions sensorielles
- B- Une désorganisation globale de l'activité psychique
- C- Une altération de la mémoire des faits anciens
- D- Une dégradation progressive des fonctions intellectuelles
- E- Un déficit sensitivo-moteur

Réponse : B

4- Dans le syndrome confusionnel, l'altération de la conscience est :

- A- Inconstante
- B- Constante
- C- Absente
- D- Partielle
- E- Rarement observée

Réponse : B

5- Les premiers examens à réaliser en présence d'un syndrome confusionnel est :

- A- ECG
- B- Ionogramme sanguin
- C- Dextro
- D- Alcoolémie
- E- Scanner cérébral

Réponse : AC

6- Les causes les plus fréquentes du syndrome confusionnel sont :

- A- Les causes endocriniennes
- B- Les causes infectieuses
- C- Les causes iatrogènes
- D- Les causes psychiatriques
- E- Les causes vasculaires

Réponse : C

Cas clinique N°2

Monsieur A., âgé de 70 ans, est amené aux urgences par la police après avoir été interpellé errant sur la voie publique. Son aspect est débraillé, sa chemise mal boutonnée sort à moitié d'un short de sport, il paraît hagard et prostré. Lorsque vous lui demandez la date et le lieu, il est incapable de vous répondre, tout en tournant sans arrêt dans la pièce. Il met du temps pour répondre à vos questions et vous devez répéter la question plusieurs fois avant qu'il réponde. Sa famille, informée, lui rend visite, et vous dit qu'il n'avait absolument rien, à part un tremblement prononcé au niveau des mains installé depuis quelques mois et pour lequel, un médecin l'a mis il y a deux semaines sous traitement. Depuis 4 jours, il est devenu distrait et voulait s'en fuir de chez lui car il risque, selon ses dires, d'être mordu par les serpents qui l'attaquent. L'examen somatique est normal, hormis un très léger tremblement.

1- Faites le relevé sémiologique chez ce patient :

- Désorientation temporo-spatiale
- Onirisme
- Trouble de l'attention
- Agitation

2- Quel autre signe sémiologique est recherché chez ce patient ?

- Le caractère fluctuant de la symptomatologie

3- Quel diagnostic paraît le plus probable ?

- État confusionnel

4- Quelle est son étiologie la plus probable ?

- Origine médicamenteuse
- Effet anticholinergique

5- Quelle est la 1^{ère} mesure thérapeutique à mettre en œuvre ?

- Arrêt du traitement

Cas clinique N° 3

Mr X. 46 ans, boucher, vient d'être opéré en urgence d'une hernie inguino-scrotale étranglée.

Ce patient pléthorique, au faciès érythrosique, présente 4 jours après l'intervention les troubles suivants : il se croit aux abattoirs et attend impatiemment les fêtes de Noël. Il est excité, se lève sans cesse.

Dans la nuit il a des gestes automatiques d'aiguisage de couteaux, il appelle sa femme à haute voix pour lui rappeler les commandes de viande à effectuer. Il cherche des frigidaires dans sa chambre.

Sa température est de 38 degrés.

L'état abdominal et digestif est normal.

L'examen neurologique ne note qu'un tremblement rapide.

1- Quel est le diagnostic psychiatrique ?

- A- Bouffée délirante aigüe
- B- Mélancolie délirante
- C- Délire paranoïaque
- D- État confuso-onirique
- E- État maniaque

Réponse : D

2- Les éléments sémiologiques du diagnostic comportent :

- A- Idées délirantes mélancoliques
- B- Désorientation spatiale
- C- Onirisme
- D- Idée délirante de persécution
- E- Tremblement

Réponse : BCE

3- Quel est le facteur de causalité le plus probable ?

- A- Sevrage aux benzodiazépines
- B- Abus de LSD
- C- Encéphalopathie porto-cave
- D- Sevrage alcoolique
- E- Complication infectieuse

Réponse : D

4- Quel est ou quels sont le(s) médicament(s) utile(s) au traitement immédiat ?

- A- Clomipramine (Anafranil®)
- B- Diazépam (Valium®)
- C- Sécobarbital (Immenotal®)
- D- Vitamines B
- E- Halopéridol (Haldol®)

Réponse : BDE

5- Au cours de l'évolution de cet état confusionnel, on peut rencontrer :

- A- Guérison totale
- B- Syndrome de Korsakoff
- C- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
- D- Délire post onirique
- E- Schizophrénie

Réponse : AD

6 - L'évolution peut se faire vers :

- A- Guérison totale
- B- Syndrome de Korsakoff
- C- Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
- D- Délire post onirique
- E- Schizophrénie

Réponse : ABCD

Cas clinique N°4

Une dame de 70 ans, polymédiquée, vient d'être opérée en urgence pour une chirurgie orthopédique. Rapidement après, en fin d'après-midi, elle commence à s'agiter, à poser des questions sur la date et le lieu où elle se trouve, et à rapporter son angoisse massive d'être agressée par son entourage et par les serpents qui ont envahi sa chambre.

1- Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ?

- A- Trouble obsessionnel compulsif
- B- Accident vasculaire cérébral
- C- Confusion mentale d'origine médicamenteuse
- D- Décompensation aiguë d'une schizophrénie
- E- Thrombophlébite cérébrale

Réponse : C

2- Quels autres signes pourrait-on rechercher chez cette patiente ?

- A- Troubles du langage
- B- Troubles de l'attention
- C- Altération de la conscience
- D- Troubles de la mémoire
- E- Conduites d'évitement

Réponse : ABCD

3- Quel effet pharmacologique pourrait expliquer la survenue de cette symptomatologie clinique ?

- A- Effet dopaminergique
- B- Effet muscarinique
- C- Effet cholinergique
- D- Effet anticholinergique
- E- Effet antihistaminique

Réponse : D

4- Quelles mesures thérapeutiques pourraient être proposées chez cette patiente ?

- A- Contention physique
- B- Réhydratation
- C- Antidépresseurs tricycliques en intraveineux
- D- Antipsychotique Atypique
- E- Sismothérapie

Réponse : BD