

Le 26 Septembre 2025
EPREUVE DE RESIDANAT
(LES TROUBLES DE L'HUMEUR)

PREMIÈRE PARTIE : QCM : Cocher la ou les réponses justes

1/- Parmi les symptômes suivants, quels sont qui sont habituels au cours d'un épisode dépressif majeur ?

- A- Humeur labile
- B- Idées obsédantes
- C- Perte d'intérêt et du plaisir
- D- Froideur affective
- E- Troubles de la concentration

2/- Parmi les signes suivants, quels sont ceux qui évoquent un épisode dépressif majeur avec caractéristiques mélancoliques ?

- A- Réveil matinal précoce
- B- Ralentissement psychomoteur
- C- Traits de personnalité névrotique
- D- Amélioration vespérale
- E- Perte de poids importante

3/- Les symptômes suivants permettent de retenir le diagnostic d'une dépression délirante

- A- Des antécédents de dépression mélancolique
- B- L'apparition des symptômes dépressifs avant les symptômes délirants
- C- Début progressif
- D- Des obsessions idéatives
- E- La prédominance des symptômes dépressifs par rapport au délire

4/- Les signes suivants sont des caractéristiques mélancoliques d'une dépression

- A- L'aggravation vespérale
- B- L'inhibition motrice
- C- Le réveil matinal précoce
- D- L'absence de réactivité de l'humeur
- E- La perte de poids importante

5/- Les signes suivants sont observés dans la dépression névrotique

- A- Un ralentissement psychomoteur
- B- Des antécédents de conversion
- C- Une insomnie d'endormissement
- D- L'absence de réactivité de l'humeur
- E- Une amélioration vespérale

6/- La dépression du sujet âgé est caractérisé par :

- A- Des plaintes somatiques
- B- Des troubles cognitifs
- C- Une tristesse de l'humeur
- D- Une forte irritabilité
- E- Un risque suicidaire élevé

7/- Le trouble dépressif majeur récurrent :

- A- Est la récurrence de plus de 2 épisodes dépressifs séparés de 2 mois au minimum
- B- Est exclusivement de nature exogène
- C- Associe un épisode hypomaniaque
- D- Est caractérisé par le risque de récurrence
- E- Nécessite des antidépresseurs au long cours

8/- Les signes cliniques prédictifs de bipolarité chez un sujet déprimé sont :

- A- L'hypersomnie
- B- Le début tardif
- C- L'aggravation vespérale
- D- Le nombre élevé d'épisodes dépressifs
- E- Le début dans le postpartum

9/- Les éléments suivants constituent des signes de gravité au cours d'une dépression

- A- L'aggravation vespérale
- B- La composante anxieuse importante
- C- Le sexe féminin
- D- L'association à un délire
- E- La survenue chez un sujet jeune

10/-Quels sont les étiologies d'une dépression secondaire?

- A- Hypothyroïdie
- B- Accident vasculaire cérébral
- C- Epuisement professionnel
- D- Idées obsédantes
- E- Antihypertenseurs centraux

11/- Les signes cliniques suivants sont prédictifs de bipolarité chez un sujet déprimé

- A- Caractéristiques atypiques selon le DSM 5
- B- Début tardif
- C- Anxiété
- D- Nombre élevé d'épisodes dépressifs
- E- Sexe féminin

12/- Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome maniaque ?

- A- Projets multiples
- B- Anxiété permanente
- C- Idées de grandeur
- D- Dépenses inconsidérées
- E- Discours désorganisé

13/- Les symptômes suivants caractérisent un épisode hypomaniaque

- A- Augmentation de l'estime de soi
- B- Réduction du besoin du sommeil
- C- Troubles du comportement avec hétéro-agressivité
- D- Délire de grandeur
- E- Plus grande communicabilité que d'habitude

14/- Au cours d'un épisode maniaque on peut relever :

- A. Une labilité thymique
- B. Une bradypsychie
- C. Une désinhibition
- D. Des troubles du sommeil
- E. Un ludisme

15/- Les manies secondaires peuvent être lié au :

- A. Corticoïdes
- B. Tumeur frontale
- C. Syphilis tertiaire
- D. Epilepsie
- E. Alcoolisme chronique

16/- Quels sont les toxiques qui induisent une manie :

- A. Morphine
- B. Cocaine
- C. Ecstasy
- D. Cannabis
- E. Amphétamine

17/- Selon le DSM 5, le trouble bipolaire de type I est caractérisé par :

- A- Survenue obligatoire d'épisodes dépressifs
- B- Survenue obligatoire d'épisodes maniaques
- C- Survenue obligatoire d'épisodes mixtes
- D- Survenue obligatoire d'épisodes hypomaniaques
- E- Exclusion de troubles de l'humeur induits par une substance

18/- Le trouble bipolaire de type II est caractérisé par :

- A- La survenue d'épisodes dépressifs et hypomaniaques
- B- La survenue d'épisodes dépressifs et maniaques
- C- La présence de caractéristiques psychotiques lors de l'épisode hypomaniaque
- D- Plus de récurrences
- E- Un âge de début tardif par rapport au trouble bipolaire I

19/- Les comorbidités suivantes peuvent se voir au cours du trouble bipolaire

- A- Schizophrénie
- B- Troubles anxieux
- C- Conduites addictives
- D- Trouble de la personnalité
- E- Trouble délirant

20/- Les complications du trouble bipolaire sont :

- A- La schizophrénie
- B- Les troubles de la personnalité
- C- Les conduites addictives
- D- Les troubles anxieux
- E- Les actes médicolégaux

21/- Le passage à l'acte suicidaire dans le trouble bipolaire est lié à:

- A- La présence de caractéristiques mixtes
- B- La comorbidité anxieuse
- C- La présence d'antécédents familiaux de conduites suicidaires
- D- La présence d'une hypersomnie
- E- La comorbidité somatique

22/- Le risque suicidaire dans le trouble bipolaire :

- A- Est moins élevé que dans le trouble dépressif majeur
- B- Est plus élevé dans le trouble bipolaire de type I
- C- Augmente lors d'antécédents familiaux de conduites suicidaires
- D- Diminue lors d'un virage maniaque sous antidépresseurs
- E- Augmente lorsqu'il y a des antécédents personnels de tentatives de suicide

23/- Un épisode dépressif majeur peut se compliquer de :

- A- Conduites suicidaires
- B- Conduites addictives
- C- Désinsertion socioprofessionnelle
- D- D'un trouble anxiété généralisée
- E- D'une démence

24/- Les symptômes suivants permettent de retenir le diagnostic d'une dépression délirante plutôt que celui d'une bouffée délirante aiguë

- A- Un délire polymorphe et riche
- B- L'apparition des symptômes dépressifs avant les symptômes délirants
- C- Début brutal
- D- Un délire vécu intensément
- E- La prédominance des symptômes dépressifs par rapport au délire

25/- Quels sont, parmi les éléments suivants, ceux qui permettent de retenir le diagnostic d'un trouble bipolaire plutôt que celui d'un trouble schizoaffectif ?

- A- L'existence d'antécédents familiaux de troubles de l'humeur
- B- Persistance de symptômes psychotiques entre les intervalles
- C- Association de symptômes thymiques et délirants
- D- Association de symptômes thymiques et dissociatifs
- E- Début à un âge jeune

26/- Quels sont, parmi les éléments suivants, ceux qui permettent de retenir le diagnostic d'un trouble bipolaire plutôt que celui d'un trouble de la personnalité de type borderline ?

- A- Rupture avec l'état antérieur
- B- Impulsivité
- C- Automutilations
- D- Épisodes maniaques ou hypomaniaques
- E- Variation de l'humeur en fonction des facteurs de stress

27/- Le bilan pré-lithium comprend :

- A- Un scanner cérébral
- B- Une protéinurie de 24 heures
- C- Une β HCG
- D- Un bilan hépatique
- E- Un EEG

28/- Le chef de file des thymorégulateurs est :

- A- La Carbamazépine
- B- La Quétiapine
- C- Le Valproate de Sodium
- D- Les Sels de lithium
- E- La Lamotrigine

29/- Quels sont, parmi les antipsychotiques suivants, ceux qui ont des propriétés thymorégulatrices ?

- A- Chlorpromazine
- B- Olanzapine
- C- Halopéridol
- D- Quétiapine
- E- Aripiprazole

30/- Quelles sont parmi les explorations suivantes celles qui sont nécessaires avant d'instaurer un traitement à base d'acide valproïque ?

- A- TSH
- B- β HCG
- C- NFS
- D- Bilan hépatique
- E- EEG

31/- Les contre indication des sels du lithium sont :

- A- Une dysthyroïdie
- B- Une insuffisance rénale
- C- Une insuffisance hépatique
- D- La prise de diurétiques
- E- Grossesse

32/- Quels éléments sont nécessaires pour surveiller un patient déprimé mis sous antidépresseur ?

- A- L'évolution de l'humeur
- B- Température
- C- Qualité du sommeil
- D- Signes de virage maniaque
- E- Risque de levée d'inhibition

33/- Quels sont les effets indésirables des sels du lithium ?

- A- Tremblements
- B- Dépression
- C- Syndrome polyuropolydipsique
- D- Dysthyroïdie
- E- Bloc auriculo ventriculaire

34/- Parmi les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), on retrouve :

- A- Paroxétine
- B- Excitalopram
- C- Venlafaxine
- D- Amitryptiline
- E- Clomipramine

35/- Quelles sont les indications de l'électroconvulsivothérapie

- A- Dépression névrotique
- B- Dépression d'épuisement
- C- Dépression délirante
- D- Dépression catatonique
- E- Manie furieuse

36/- Quelle est la contre indication absolue de l'électroconvulsivothérapie

- A- Accident vasculaire cérébral
- B- Processus expansif intracrânien
- C- HTA
- D- Hypocalcémie
- E- Tabagisme chronique

37/- Une lithémie efficace doit être :

- A- Entre 0,01 et 0,1 mmol/l
- B- Entre 0,1 et 0,5 mmol/l
- C- Entre 0,6 et 1 mmol/l
- D- Entre 6 et 10 mmol/l
- E- Entre 60 et 100 mmol/l

38/- Les effets indésirables de la Lamotrigine sont :

- A- Rash cutané
- B- Syndrome de Lyell
- C- Pic Hypertensif
- D- Somnolence
- E- Diplopie

CAS CLINIQUE 1 :

Mme B, âgée de 40 ans, mariée, mère de 4 enfants, femme au foyer ramené par son époux en consultation psychiatrique pour un changement de comportement.

Le début des troubles remonte à un mois, de façon insidieuse, Mme B, a commencé à s'isoler, a ne prendre plus soins d'elle, ne plus se maquiller. Elle ne sort plus de la maison, se sent triste, ne parle plus ni à son mari ni à ses enfants. Elle a arrêté de prendre soin de ses enfants n'a plus d'appétit et se réveille à 3heures du matin.

A l'examen Mme B met du temps pour répondre, parle avec un débit lent, baisse la tête, sa mimique est triste, rapporte un dégoût de la vie, qu'elle ne voit pas l'intérêt de vivre et que de toute façon on va tous mourir. Elle pense avoir commis des erreurs graves.

Le mari rapporte qu'elle a eu deux épisodes similaires. Le premier est survenu à l'âge de 19 ans dans les suites immédiates de la naissance de leur fils aîné et le deuxième 5 ans après.

Son père, qui était alcoolique, a présenté des épisodes similaires mais il a présenté d'autres types d'épisodes nécessitant son hospitalisation sous contrainte. Il s'est pendu à l'âge de 50 ans.

39/- Quelles sont les symptômes que présente cette patiente ?

- A- Ralentissement psychique
- B- Délire de persécution
- C- Dépenses excessives
- D- Perte d'intérêt et du plaisir
- E- Isolement

40/- Quelles sont les signes de gravité ?

- A- Sévérité de la dépression
- B- Idées suicidaires
- C- Début dans le post-partum
- D- Traits de personnalité pathologique
- E- ATCD familiaux de suicide

41/- Les explorations biologiques et radiologiques sont revenue négatives, Quelle est le diagnostic à retenir ?

- A- Trouble dépressif majeur récurrent
- B- Trouble dépressif majeur, épisode isolé
- C- Manie anxieuse
- D- Trouble bipolaire de type II
- E- Schizophrénie

Après avoir revu le mari, il vous rapporte que Mme B a eu plusieurs épisodes de courte durée au cours desquelles elle devient plus joviale que d'habitude, plus active, parle d'une manière plus abondante et dort moins que d'habitude.

42/- Quelle est le diagnostic à retenir ?

- A- Trouble dépressif majeur récurrent
- B- Trouble Bipolaire de type I
- C- Trouble panique
- D- Trouble bipolaire de type II
- E- Schizophrénie

43/- Quelles sont les molécules à proposer chez cette patiente ?

- A- Antidépresseur
- B- Sels de Lithium
- C- Lamotrigine
- D- Quétiapine
- E- Haldol Décanoas

44/- Si vous aller prescrire un antidépresseur tricyclique, quelles sont les effets indésirables ?

- A- Hypotension orthostatique
- B- Pic hypertensif
- C- Constipation
- D- Tremblements
- E- Syndrome extrapyramidal

45/- Quelles sont les mesures éducatives à préconiser ?

- A- Règles d'hygiène de vie
- B- Restriction hydrique
- C- Arrêt du traitement après 3 mois
- D- Eviction du stress
- E- Régularité des horaires du sommeil

CAS CLINIQUE 2 :

De garde aux urgences, vous recevez Mme Mariem, 31 ans, amenée par son mari pour une instabilité psychomotrice. Depuis cinq jours, Mme Mariem est à la fois joyeuse et énervée. Elle ne tient pas en place. Elle ne dort pas la nuit, ne mange plus et boit peu. Selon le mari, elle aurait démissionné de son travail de cadre supérieur du jour au lendemain et organisé une fête de départ pour tous ses collègues. En entretien, vous avez du mal à capter son attention. Mme Mariem fait des jeux de mots à propos de tout ce qui lui passe par la tête. Elle vous avoue ne s'être jamais sentie aussi bien depuis ces dernières semaines. Elle vous dit qu'elle prévoit d'aller faire le tour du monde car « ici la vie est si nulle, alors que c'est la fête partout ailleurs ! ». Elle admet que ses pensées se bousculent dans sa tête.

Dans ses antécédents personnels, on note une appendicectomie à l'âge de 24 ans et une « petite dépression » à l'âge de 20 ans liée à un chagrin d'amour. Elle a présenté une dépression du post-partum après sa première grossesse. Sur le plan familial, sa mère souffrait d'un « problème à la thyroïde ».

46/- Quels sont les syndromes présentés chez cette patiente ?

- A- Syndrome maniaque
- B- Syndrome dépressif
- C- Syndrome anxieux
- D- Syndrome délirant
- E- Syndrome démentiel

47/- Quel sera votre diagnostic final ?

- A- Episode Maniaque
- B- Confusion mentale
- C- Mélancolie délirante
- D- Mélancolie catatonique
- E- Trouble anxiété généralisée

48/- Quelles sont les mesures thérapeutiques les plus adaptées lors de son hospitalisation en psychiatrie ?

- A- Antidépresseur tricyclique
- B- Antipsychotique atypique
- C- Thymorégulateur
- D- Neuroleptique classique à action prolongée
- E- Electroconvulsivothérapie