

1. Les réponses correctes sont : Toux sèche quinteuse, Catarrhe nasal, Odynophagie
2. Les réponses correctes sont : Adénovirus, Myxovirus influenzae, Rhinovirus
3. Les réponses correctes sont : L'incinérer, Le bouillir pendant 15 minutes, L'enterrer à 2 m de profondeur
4. Les réponses correctes sont : Le signe du delta, Un signe de la corde, Une hyperdensité spontanée d'un sinus veineux
5. Les réponses correctes sont : Déshydratation, Persistance de l'obstruction nasale pendant 7 jours
6. Les réponses correctes sont : Torticolis fébrile, Convulsion hyperthermique, Éthmoïdite aigue, Otite moyenne aigue
7. Les réponses correctes sont : la voix est rauque, le traitement se base sur une corticothérapie à forte dose par voie générale
8. Les réponses correctes sont : Mycoplasme pneumoniae, Chlamydia pneumoniae
9. Les réponses correctes sont : Le cancer du côlon, Le volvulus du sigmoïde
10. Les réponses correctes sont : Pleurésie purulente, Abscès du poumon
11. Les réponses correctes sont : Tachycardie > 120 BPM, Troponine positive, Élévation du NT proBNP, Saturation O₂ < 90%
12. Les réponses correctes sont : La majorité des cancers recto-coliques provient de la dégénérescence de polypes adénomateux, Le risque de cancer croît avec le nombre et la taille des adénomes, Le dépistage et l'exérèse des polypes adénomateux et villosités sont la meilleure prévention actuelle du cancer recto-colique, Après colectomie totale pour polyposse familiale diffuse, le rectum restant doit être surveillé très régulièrement, pour possibilité de cancer rectal
13. Les réponses correctes sont : Sa disparition à 30 mois de vie, Le caractère rapidement résolutif de sa détresse
14. Les réponses correctes sont : La survenue chez un sujet sur corticothérapie au long cours, L'existence d'une perforation colique, L'existence d'un œdème aigue du poumon sur la radiographie du thorax
15. Les réponses correctes sont : Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Staphylococcus aureus
16. Les réponses correctes sont : La voie laparoscopique est actuellement préconisée dans la perforation ulcéreuse, Dès que le diagnostic est posé, une antibiothérapie probabiliste par voie intraveineuse doit être débutée
17. Les réponses correctes sont : Peuvent compliquer le traitement chirurgical d'une appendicite aigue, Des signes urinaires à type de dysurie et pollakiurie peuvent être révélateurs
18. Les réponses correctes sont : Les infections génitales hautes, Le tabac, Un antécédant d'appendicectomie
19. Les réponses correctes sont : Une épistaxis récidivante unilatérale, Une névralgie sous orbitaire, Une diplopie
20. Les réponses correctes sont : Une mucoviscidose, Une colonisation bactérienne chronique du grêle, Une maladie de Whipple, Une giardiase
21. La réponse correcte est : Une bilobectomie
22. Les réponses correctes sont : Sus-claviculaire, Axillaire
23. La réponse correcte est : Une Pneumonectomie
24. Les réponses correctes sont : Cholécystotomie, CPRE
25. Les réponses correctes sont : Fièvre, Douleur de l'hypocondre droit, Ictère
26. La réponse correcte est : Isoniazide
27. La réponse correcte est : Virus parainfluenzae
28. Les réponses correctes sont : Adhérentes, Saignantes, D'aspect blanc nacré
29. Les réponses correctes sont : Limitées aux loges amygdaliennes, Non reproductibles
30. La réponse correcte est : Céphalées profondes
31. Les réponses correctes sont : Douleur pharyngée intense, adénopathie sous-angulo-maxillaire, fièvre élevée
32. Les réponses correctes sont : La prise en charge des comorbidités, L'incitation à l'arrêt du tabagisme
33. La réponse correcte est : Occlusion intestinale aiguë
34. Les réponses correctes sont : Colique néphrétique, Cholécystite lithiasique, Sigméïdite diverticulaire, Péritonite appendiculaire

35. Les réponses correctes sont : Le sevrage alcoolique, Cécité brutale, Hydrocéphalie à pression normale, Douleurs aiguës
36. Les réponses correctes sont : Hernie inguinale étranglée, Volvulus sur bride, Invagination intestinale aiguë
37. Les réponses correctes sont : Une masse médiastinale., Une inhalation de corps étranger., Une insuffisance cardiaque.
38. Les réponses correctes sont : Un eczéma associé., Un asthme allergique aux acariens chez l'un des parents.
39. Les réponses correctes sont : Des symptômes variables dans le temps., Des symptômes déclenchés par l'exposition aux irritants., Les antécédents familiaux d'atopie., La présence d'une rhinite.
40. Les réponses correctes sont : La privation de sommeil, Un traumatisme psychique intense, La dépression du sujet âgé
41. Les réponses correctes sont : La fibrose pulmonaire, La silicose, Les séquelles pleuro-pulmonaires
42. Les réponses correctes sont : L'inflammation bronchique, L'hypersécrétion de mucus, L'épaississement pariétal bronchique, La diminution des forces de rétraction élastique du poumon
43. Les réponses correctes sont : *Hémophilus influenzae*, *Branahmella catarhalis*
44. Les réponses correctes sont : Angine de Vincent, Syphilis, Carcinome amygdalien
45. Les réponses correctes sont : mucoviscidose, syndrome de Kartagener, SIDA, Polypose nasosinusienne
46. Les réponses correctes sont : Tamoxifène, Thalidomide, Diane®
47. Les réponses correctes sont : Une résection segmentaire basse, Une hémicolectomie gauche
48. Les réponses correctes sont : Antécédents personnels d'HTA chronique, Le syndrome des antiphospholipides
49. Les réponses correctes sont : Un infiltrat réticulo-nodulaire apical unilatéral, Des hyperclartés multiples au sein d'infiltrats bilatéraux
50. Les réponses correctes sont : Prothèse valvulaire mécanique, Infarctus du myocarde récent (< 4 semaines), Cardiomyopathie dilatée
51. Les réponses correctes sont : Sont des céphalées primaires, Sont chroniques et permanentes, Sont associées à des troubles psychologiques
52. Les réponses correctes sont : Endocardite infectieuse, Dissection aortique, Taux de plaquettes à 90 000/mm³
53. Les réponses correctes sont : 2 heures en cas d'œdème aigu des poumons, 2 heures en cas de sous-décalage diffus du segment ST avec sus-décalage en aVR
54. Les réponses correctes sont : Ionogramme sanguin, fonction rénale (urée et creat), la gazométrie sanguine
55. Les réponses correctes sont : Antécédents d'exacerbation ayant menacé le pronostic vital, Pas de prise actuelle de CSI ou défaut d'observance, Sevrage récent de corticoïdes par voie générale, Allergie alimentaire confirmée chez un patient asthmatique
56. Les réponses correctes sont : Une hémorragie active en jet sur la fibroscopie initiale, Le diamètre de l'ulcère > 20 mm, La présence d'un état de choc hémorragique à l'admission
57. Les réponses correctes sont : Un hippocratisme digital, Un flush syndrome (diarrhée et bouffées vasomotrices), Un Syndrome de Schwartz-Barter, Un syndrome de Cushing
58. Les réponses correctes sont : Un défaut d'absorption au niveau de l'anse occluse, Une perte des électrolytes Cl⁻, Na⁺, K⁺, Une ischémie de la paroi intestinale, Une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle
59. Les réponses correctes sont : Malformations vasculaires, Angéites cérébrales, Anomalies de l'hémostase :AVK
60. Les réponses correctes sont : Insomnie d'endormissement, Sommeil haché
61. Les réponses correctes sont : la petite courbure gastrique par lésion de l'arcade artérielle de la petite courbure, le bord supérieur du bulbe par lésion de l'artère gastrique droite
62. Les réponses correctes sont : Le prasugrel est contre-indiqué en cas d'antécédent d'accident vasculaire cérébral, Le clopidogrel doit être arrêté 5 jours au moins avant une chirurgie non urgente
63. Les réponses correctes sont : Abaissement de la tension artérielle systolique à moins de 140 mm Hg, Mise du patient en position demi assise
64. Les réponses correctes sont : La tumeur est dit multicentrique si ≥ 2 foyers dans des quadrants différents, Nait à partir du revêtement épithélial des canaux et des lobules, Dans le carcinome in

situ, la membrane basale est toujours intacte, Le carcinome in situ ne donne pas des métastases ganglionnaires

65. Les réponses correctes sont : Dépression, Trouble anxiété de séparation, Trouble anxiété généralisée
66. La réponse correcte est : Une tamponnade
67. Les réponses correctes sont : Prurit, Selles décolorées, Urines foncées, TP spontanément bas
68. Les réponses correctes sont : Le genre masculin, L'origine cholestatique de l'ictère, Une glycémie à jeun élevée, Le caractère indolent de l'ictère
69. Les réponses correctes sont : Bilan hépatique complet, Echographie abdominale
70. La réponse correcte est : Une hépatite chronique B à virus mutant
71. La réponse correcte est : Repose sur l'Entécavir au long cours
72. La réponse correcte est : Il a une hépatite B guérie
73. Les réponses correctes sont : Un nodule rhumatoïde, Un cancer pulmonaire primitif, Une métastase pulmonaire d'un carcinome mammaire
74. La réponse correcte est : Une biopsie transpariétale du nodule sous contrôle scanographique
75. La réponse correcte est : Adénocarcinome pulmonaire
76. Les réponses correctes sont : Métrorragies, Hémorragie génitale
77. Les réponses correctes sont : Un antécédent de MST, Des antécédents de chirurgie pelvienne, Endométriose, Tabagisme
78. Les réponses correctes sont : Une coelioscopie diagnostique, Une hospitalisation pour surveillance
79. Les réponses correctes sont : Appendicite aiguë, Coliques néphrétiques
80. La réponse correcte est : TDM abdominale
81. La réponse correcte est : Appendicite aiguë méso coeliaque
82. La réponse correcte est : Le territoire de l'artère cérébrale antérieure gauche
83. La réponse correcte est : La thrombolyse intraveineuse
84. La réponse correcte est : IRM cérébrale
85. La réponse correcte est : une endocardite infectieuse
86. La réponse correcte est : Une échocardiographie transthoracique
87. La réponse correcte est : Arrêt AVK
88. Les réponses correctes sont : Frissons et asthénie, Fièvre à 39,5°C, Douleurs thoraciques en point de côté
89. Les réponses correctes sont : Le terrain immunodéprimé, La fréquence respiratoire à 32c/mn
90. La réponse correcte est : Amoxicilline-acide clavulanique
91. La réponse correcte est : Une endocardite infectieuse
92. Les réponses correctes sont : Purpura pétéchial, Faux panaris, Taches de Janeway, Splénomégalie
93. La réponse correcte est : Amoxicilline + oxacilline + gentamicine
94. La réponse correcte est : Adénocarcinome Lieberkühnien
95. Les réponses correctes sont : Une coloscopie totale, Un dosage antigènes carcino embryonnaires, Une échographie hépatique
96. La réponse correcte est : Résection antérieure du rectum
97. Les réponses correctes sont : Coloscopie de contrôle, Echographie hépatique, Dosage de l'antigène carcino-embryonnaire
98. Les réponses correctes sont : Le syndrome cave supérieur, Le PS à 2
99. Les réponses correctes sont : Un carcinome épidermoïde, Un carcinome à petites cellules
100. La réponse correcte est : T4N3M1b
101. Les réponses correctes sont : Chimiothérapie palliative, Radiothérapie décompressive, Immunothérapie
102. Les réponses correctes sont : Une désorganisation totale du tracé de fond, Des pointes et des pointes-ondes asynchrones, diffuses et permanentes
103. La réponse correcte est : Une sclérose tubéreuse de Bourneville
104. La réponse correcte est : Echographie thoracique
105. Les réponses correctes sont : Hospitalisation, Traitement chirurgical
106. Les réponses correctes sont : Lavage soigneux des crudités, Lavage soigneux des mains
107. Les réponses correctes sont : Le début à l'adolescence, Les myoclonies matinales, La survenue de crises tonico-cloniques généralisées
108. Les réponses correctes sont : Le manque de sommeil, L'exposition à une stimulation lumineuse intermittente, Les réveils brusques

109. La réponse correcte est : Des polypointe-ondes généralisées
110. Les réponses correctes sont : Une hyperplasie des cryptes, Une atrophie villositaire totale, Un infiltrat inflammatoire lympho plasmocytaire du chorion
111. Les réponses correctes sont : Ostéoporose, Un lymphome du grêle, Une dermatite herpétiforme
112. Les réponses correctes sont : Des médicaments parasympholytiques, Une anesthésie générale
113. Les réponses correctes sont : Est secondaire à une agression aigue circonstancielle du système nerveux central, Peut être secondaire à une hypoglycémie, Peut-être secondaire à une intoxication au monoxyde de carbone
114. Les réponses correctes sont : Une tumeur neuroendocrine digestive, Une hyperthyroïdie, Un syndrome de l'intestin irritable
115. Les réponses correctes sont : Est caractérisée par une instabilité hémodynamique, Peut être associée à une élévation des troponines, Implique obligatoirement une dysfonction du ventricule droit, Est responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire
116. Les réponses correctes sont : En présence d'une hémiplegie fébrile chez un sujet de 65 ans, En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque
117. Les réponses correctes sont : La récurrence des crises (>5 crises), Une durée des crises inférieure à 4 heures, Des vomissements
118. Les réponses correctes sont : Une crise d'épilepsie focale, Des troubles du comportement, Une hémiplegie, Une aphasie
119. Les réponses correctes sont : La grande courbure gastrique, Les ganglions situés à l'origine de la mésentérique inférieure, Les ganglions lymphatiques de l'arcade de Riolo, Le mésocolon transverse
120. Les réponses correctes sont : L'uretère droit, La valvule de Bauhin, Les ganglions lymphatiques à l'origine de l'artère iléo-appendiculaire
121. La réponse correcte est : Il s'agit d'un trouble dépressif récurrent