

Problema R7. Combinações

Dados dois inteiros N e K , gere todos os subconjuntos de K elementos escolhidos entre os inteiros de 1 até N .

A ordem dos elementos dentro de um subconjunto não importa, então cada subconjunto deve ser escrito uma única vez, com seus elementos em ordem crescente. O total de subconjuntos é o número binomial $\binom{N}{K}$.

Os subconjuntos devem ser listados em ordem lexicográfica, isto é, na mesma ordem em que apareceriam num dicionário se cada subconjunto fosse lido como uma palavra.

Entrada

A entrada contém uma única linha com dois inteiros N e K ($1 \leq K \leq N \leq 18$), separados por um espaço.

Saída

Imprima $\binom{N}{K}$ linhas, uma para cada subconjunto, em ordem lexicográfica.

Cada linha deve conter exatamente K inteiros em ordem crescente, separados por um espaço.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 2	1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
5 1	1 2 3 4 5

Observações

No primeiro exemplo, os $\binom{4}{2} = 6$ subconjuntos de tamanho 2 são listados em ordem: primeiro todos os que começam com 1, depois os que começam com 2 e assim por diante.