




แนวทางการปฏิบัติ การจัดการเลี้ยงไก่เนื้อ

ธุรกิจไก่เนื้อ ครบวงจร

29 November 2022



Process การเลี้ยงไก่เนื้อ



1. การเตรียมโรงเรียน

(House Preparation)



1. การเตรียมโรงเรือน : อุปกรณ์ เครื่องมือสร้างโรงเรือน

เครื่องล้างโรงเรือน	ปั๊ม	สายฉีด	หัวฉีด
			
เครื่องยนต์ ขนาด 15 Hp	ปั๊มรุ่น Y 120 แรงดัน > 55 บาร์	ท่อนานต่อแรงดัน > 150 บาร์	หัวฉีดแบบฟุ้ง ประหมัดน้ำ



1. การเตรียมโรงเรือน : อุปกรณ์ พ่นยา ข่าแมลง

เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ	ปั๊ม	สายฉีด	หัวฉีด
			
เครื่องยนต์ ขนาด 5.5 Hp	ปั๊มรุ่น Y 40 แรงดัน > 40 บาร์	ท่อนานต่อแรงดัน > 125 บาร์	หัวฉีดแบบฟุ้ง ประหมัดน้ำ



1. ขั้นตอน การเตรียมโรงเรือน : 27 ขั้นตอน

ขั้นตอน	รายการ
*	ปลดไก่
1	ทำความสะอาดภายในต่ออาหารด้วยฟองน้ำ
2	หมักมูลไก่ (3วัน) + คลุมผ้าม่านมูลไก่ + เก็บผ้าม่านคลุมมูลไก่
3	ตัดหญ้ารอบโรงเรือน/ฟาร์ม
4	ขนย้ายวัสดุรองพื้นออกจากโรงเรือน
5	วางยาเบื่อหนู
6	พ่นยาฆ่าแมลง (ครั้งที่ 1)
7	ทำความสะอาดอุปกรณ์/ตู้ควบคุมภายในโรงเรือน
8	ซ่อมพื้นโรงเรือน/ตรวจเช็ค-ซ่อมอุปกรณ์การเลี้ยง
9	ถอดจานอาหารล้างและฆ่าเชื้อ
10	ฆ่าเชื้อระบบการให้น้ำ (Nipple) ด้วยกรด Peracetic acid
11	ราดโซดาไฟ ทิ้งไว้ 1 คืน
12	พ่นน้ำเปล่า/พ่น detergent (โฟม)
13	ล้างโรงเรือนและอุปกรณ์ด้วยน้ำที่ผ่านคลอรีน 1-3 ppm.
14	ล้างบ่ออีแวป/ทำความสะอาดก้อนแพดและรางแพด

ขั้นตอน	รายการ
15	เก็บเศษมูลไก่อรอบโรงเรือน/ทำความสะอาดบ่อเกรอะ
16	พ่นยาฆ่าแมลง (ครั้งที่ 2)
17	ทำความสะอาดเศษซากแมลงออกจากโรงเรือน
18	พ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือน/อุปกรณ์/ถึงโซไล Glutaraldehyde + QAC (ครั้งที่ 1)
19	ราดปูนขาวร้อน ด้านนอกและด้านในโรงเรือน
20	นำวัสดุรองพื้นเข้าโรงเรือน
21	เกลี่ยวัสดุรองพื้นให้ทั่วสม่ำเสมอ ดูดเศษโลหะ
22	PM ระบบ ROTEM/ระบบไฟฟ้า
23	จัดเตรียมห้องกกลูกไก่/ตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุม เตรียมอุปกรณ์น้ำ อาหาร
24	พ่นยาฆ่าแมลง (ครั้งที่ 3) / พ่นยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 2)
25	กรอกวัสดุรองพื้นสำรอง
26	พ่นหมอกฆ่าเชื้อภายในโรงเรือน
27	ปิดโรงเรือน
*	ลงลูกไก่



1. แผนการเตรียมโรงเรือน : พักโรงเรือน 18 วัน

ขั้นตอน	รายการ	จำนวนวันในการเตรียมโรงเรือนฟาร์ม																					
		*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	ปลดไก่																						
1	ทำความสะอาดภายในห้องอาหารด้วยฟองน้ำ																						
2	หมักมูลไก่ (3วัน) + คลุมผ้าม่านมูลไก่ + เก็บผ้าม่านคลุมมูลไก่																						
3	ตัดหญ้ารอบโรงเรือน/ฟาร์ม																						
4	ขนย้ายวัสดุรองพื้นออกจากโรงเรือน																						
5	วางยาเบื่อหนู																						
6	พ่นยาฆ่าแมลง ครั้งที่ 1																						
7	ทำความสะอาดอุปกรณ์/ตู้ควบคุมภายในโรงเรือน																						
8	ซ่อมพื้นโรงเรือน/ตรวจเช็ค-ซ่อมอุปกรณ์การเลี้ยง																						
9	ถอดจานอาหารล่างและฆ่าเชื้อ																						
10	ฆ่าเชื้อระบบการให้น้ำ (Nipple) ด้วยกรด Peracetic acid																						
11	ราดโซดาไฟ ทั้งไว้ 1 คืน																						
12	พ่นน้ำเปล่า/พ่น detergent (โฟม)																						
13	ล้างโรงเรือนและอุปกรณ์ด้วยน้ำที่ผ่านคลอรีน 3-5 ppm.																						
14	ล้างบ่ออีแวป/ทำความสะอาดก่อนแพดและรางแพด																						
15	เก็บเศษมูลไก่รอบโรงเรือน/ทำความสะอาดบ่อเกรอะ																						
16	พ่นยาฆ่าแมลง ครั้งที่ 2																						
17	ทำความสะอาดเศษซากแมลงออกจากโรงเรือน																						
18	พ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือน/อุปกรณ์/ถังไซโล Glutaraldehyde + QAC ครั้งที่ 1																						
19	ราดปูนขาวร้อน ด้านนอกและด้านในโรงเรือน																						
20	นำวัสดุรองพื้นเข้าโรงเรือน																						
21	เกลี่ยวัสดุรองพื้นให้ทั่วสม่ำเสมอ ดูดเศษโลหะ																						
22	PM ระบบ ROTEM/ระบบไฟฟ้า																						
23	จัดเตรียมห้องกกลูกไก่/ตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุม เตรียมอุปกรณ์น้ำ อาหาร																						
24	พ่นยาฆ่าแมลง (ครั้งที่ 3) / พ่นยาฆ่าเชื้อแกลบ (ครั้งที่ 2)																						
25	กรอกวัสดุรองพื้นสำรอง																						
26	พ่นหมอกฆ่าเชื้อภายในโรงเรือน																						
27	ปิดโรงเรือน																						
*	ลงลูกไก่																						



1. การเตรียมโรงเรือน : ขั้นตอนหลักที่สำคัญๆ



1. ตัดหนัารอบโรงเรือน/ฟาร์ม ให้สั้้นก่อนนำมูลไก่ออก เพื่อไม่ให้เป็้นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะ
2. พ่นยาฆ่าแมลงบริเวณผนัง สูง 0.6– 1.0 m. พื้นด้านข้างจากผนังด้านใน 50 cm. เพื่อป้องกันแมลงแพร่กระจายไปแหล่งอื่นและควบคุมปริมาณแมลงให้ลดลง
3. ทำความสะอาดภายในท่อาหารด้วยฟองน้ำ ให้สะอาด เพื่อล้างและฆ่าเชื้อภายในท่อาหาร
4. นำมูลไก่ออกและกวาดเศษมูลไก่ภายในและภายนอกโรงเรือนให้สะอาด
5. ซ่อมแซมพื้น รอยแตกและจุดที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลงภายใน/นอกโรงเรือน
6. พ่น detergent(โฟม) ทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนล้าง เพื่อกำจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรก
7. ล้างโรงเรือนด้วยแรงดันน้ำ 50–60 Bar ล้างเพดาน-อุปกรณ์-ผนัง-พื้น ให้สะอาด-รอบโรงเรือน
8. ตรวจ ควบคุมการล้างโรงเรือนในแต่ละขั้นตอน ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
9. พ่นยาฆ่าเชื้อ/ฆ่าแมลงโรงเรือน อุปกรณ์ มีอัตราส่วนที่ถูกต้อง และพ่นให้ทั่วทุกพื้นที่
10. ราดปูนขาวให้ทั่วพื้นโรงเรือน เน้นรอยแตก รอยร้าว ตามซอกมุม
11. นำวัสดุรองพื้นเข้าโรงเรือน ปริมาณ 3.5 กก./ตรม. พร้อมเกลี่ยให้เรียบสม่ำเสมอ
12. พ่นยาฆ่าเชื้อ/ฆ่าแมลงบนวัสดุรองพื้น มีอัตราส่วนที่ถูกต้อง และพ่นให้ทั่วทุกพื้นที่
13. พ่นหมอกฆ่าเชื้อ(ใช้ Virocid)ภายในโรงเรือน เวลา 15 นาที และปิดทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
14. ปิดโรงเรือนอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์พาหะและเตรียมอ่างจุ่มเท้าฆ่าเชื้อตามหลัก Biosecurity



การพ่นน้ำเปล่า/พ่น Detergent (โฟม)



แนวทางปฏิบัติ



การล้างโรงเรือน (พ่นน้ำเปล่า) เพิ่ม
ความชื้นให้กับผนังโรงเรือนและอุปกรณ์
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โฟมยึดเกาะดีขึ้น
พ่นน้ำเปล่าใช้ระยะเวลา 15 นาที/เล้า

การฉีดพ่นโฟมทั่วโรงเรือน เพื่อช่วยในการทำความสะอาด
โรงเรือนและอุปกรณ์ โดยโฟมจะเข้าไปกำจัดคราบไขมัน และ
คราบสกปรกให้หลุดง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการล้างโรงเรือน
ดีขึ้น พ่นโฟมทิ้งไว้ระยะเวลา 30 นาทีก่อนล้างออก



แนวทางปฏิบัติ



การล้างโรงเรือนและอุปกรณ์ด้วยน้ำ

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาด ภายในโรงเรือน : ล้างจากด้านบนลงด้านล่าง



1.ล้างฝ้าเพดาน



2.ล้างผนังเล่า



3.ล้างอุปกรณ์ น้ำ,อาหาร



4.ล้างพื้นคอนกรีต

น้ำผ่านคลอรีน 1-3 ppm



มีทั้งหมด 26 ข้อ



แบบ Checklist การตรวจการล้างโรงเรือนฟาร์มไก่เนื้อ

Checklist ตรวจสอบการล้างและเตรียมโรงเรือนฟาร์มไก่เนื้อ			
ฟาร์ม	รุ่น	วันที่ตรวจสอบ	โรงเรือนที่
1			กิจกรรม
2			คະແນ
3			หมายเหตุ
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

หมายเหตุ: ข้อ 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 18 และ ข้อ 25 เป็นหัวข้อหลักที่ต้องผ่านเกณฑ์ในการประเมิน

รวม.....คะแนน (จากทั้งหมด 120 คะแนน) คิดเป็น.....%

☐ ผ่านเกณฑ์ (>80%) ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ (<80%) ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ (ไม่ผ่านข้อหลัก)

version update 1/4/62

หมายเหตุ : ข้อ 2 ,3, 6, 8 ,9,10,11,18 และ ข้อ 25

เป็นหัวข้อหลักที่ ต้องผ่านเกณฑ์ในการประเมิน

: รวมคะแนน.....คะแนน (จากทั้งหมด 120 คะแนน)

คิดเป็น%



ผ่านเกณฑ์ (80% ขึ้นไป)



ไม่ผ่านเกณฑ์ (< 80%)



แบบใช้ตรวจช่วง เม.ย. 2019 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : แบบตรวจ เม.ย. 19 เพิ่มมาตรการหัวข้อหลักที่ต้อง

ผ่านเกณฑ์ 9 ข้อ

คณะผู้ตรวจประเมินผลเตรียมโรงเรือน

1. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

2. ผู้บริหาร/ตัวแทน ประจำเขตฟาร์มรับผิดชอบ

3. ผู้จัดการฟาร์ม/สัตวบาลฟาร์มที่ตรวจประเมิน



ข้อหลัก 9 ข้อ



แบบ Checklist การตรวจการล้างโรงเรือนฟาร์มไก่เนื้อ

ข้อ	กิจกรรม	คะแนน
1	มีการใช้น้ำผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนอิสระเข้มข้น 3-5 ppm สำหรับคลอรีนชนิดแก๊ส ส่วนคลอรีนชนิดน้ำเข้มข้นที่ 1 ppm (5)	5
2	การเอาขี้ไก่ออกจากเล้า ทำได้ดี สะอาด มีการคลุมผ้าใบมิดชิดขณะขนขี้ไก่ออก ไม่พบเศษขี้ไก่และเกล็ดเก่าตกหล่นบริเวณด้านหน้าโรงเรือนรอบโรงเรือน และถนนภายในฟาร์ม (5)	5
3	การล้างเล้ามีประสิทธิภาพ มีการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไล่ขี้ไก่เก่า เกล็ดเก่า คราบสกปรก ออกจากภายในโรงเรือน ก่อนพ่นยาฆ่าเชื้อ (5)	5
4	มีการพ่นยาฆ่าแมลง ที่ระดับความเข้มข้น และปริมาณตามที่กำหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง (5)	5
5	มีการล้างทำความสะอาดท่อนิปเปิ้ลด้วยน้ำสะอาด และแช่ท่อนิปเปิ้ลด้วยกรดอินทรีย์หรือ Hydrogen peroxide ก่อน flush ล้าง (5)	5
6	มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือน Omnicide หรือ Ultracide หรือ GPC8 ตามอัตราส่วนและปริมาณที่สัตวแพทย์กำหนด (5)	5
7	มีการฆ่าเชื้อเกล็ดด้วย Omnicide หรือ Ultracide หรือ GPC8 ตามอัตราส่วนและปริมาณที่สัตวแพทย์กำหนด (5)	5
8	อาหารเก่าในท่ออาหารและถังไซโลมีการไล่ออกหมด รวมถึงแพนอาหาร ถัง hopper และท่ออาหาร ต้องสะอาดและไม่ชำรุด (5)	5
9	ไม่พบร่องรอยสัตว์พาหะ หนู แมลง ทั้งในโรงเรือนและรอบโรงเรือน (5)	5

หมายเหตุ: ทั้ง 9 ข้อเป็นหัวข้อหลักที่ต้องผ่านเกณฑ์ในการประเมิน (ถึงแม้คะแนน จะผ่านเกณฑ์เกิน 80 %)

2. การรับลูกไก่ (DOC placement)



แนวทางปฏิบัติ



2.การรับลูกไก่(DOC placement)



1. ปรับระดับอุปกรณ์อาหารให้จานอาหารวางบนพื้นแกลบ เพื่อให้ลูกไก่กินอาหารได้สะดวก
2. ปูกระดาษ Chick paper 6-8 แถว ปริมาณอาหาร 30-50 กรัม/ตัว หรือ ใช้ Turbo grow 70 ตัว/ชุด เพื่อให้ไก่กินเข้าถึงอาหารช่วง 3-5 วันแรก
3. ปรับระดับอุปกรณ์ให้น้ำ Nipple ให้ระดับหัว Nipple อยู่ที่ระดับตาไก่(ประมาณ 10 cm.)
4. ปรับ Flowrate น้ำ 40 ml/min กดหัวนิปเปิ้ลให้มีน้ำขัง 3/4 ของความจุถ้วย
5. เตรียมผ้าม่านกันพื้นที่กก โดยกันปิดหน้าและท้ายของพื้นที่กกตั้งแต่ระดับพื้นแกลบจนถึงเพดาน
6. ติดตั้ง Sensor อุณหภูมิ/RH อยู่ตรงกลางกก โดยใช้ Heater ควบคุมแยก Zone Sensor ความสูง 20 cm.
7. Preheat อุณหภูมิในโรงเรือน อุณหภูมิพื้น ก่อนนำไก่เข้าเลี้ยงอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก) เป้าหมาย อุณหภูมิในโรงเรือน 34-36 °C และอุณหภูมิแกลบ 32 °C อุณหภูมิพื้นซีเมนต์ >28 °C และความชื้นในกก 50-70 %
8. ตรวจสอบสภาพรถขนส่งลูกไก่ เวลา อุณหภูมิภายในรถ จำนวนไก่ เพศ กรณีพบปัญหาให้แจ้งโรงฟักไข่เพื่อดำเนินการแก้ไข
9. วัดอุณหภูมิตัวลูกไก่(Body Temperature) ขณะรับลูกไก่ต้องได้ประมาณ 39.7 °C
10. ต้องนำลูกไก่อลงพื้น ด้วยความนุ่มนวล ปล่อยให้กลืนอุปกรณ์ให้น้ำ/อาหาร พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพลูกไก่ ไม่มี Dehydrate ไม่นอนสุม ไม่หมอบ ไม่หอบ
11. อุณหภูมิกก ให้พิจารณาตั้งค่าใช้งานโดยยึดพฤติกรรมไก่ คือ ลูกไก่ต้องไม่นอนสุมกัน ไม่นอนหมอบ ไม่อ้าปากหอบ กินน้ำ กินอาหารปกติ กรณีลูกไก่อตัวเล็ก ให้ปรับอุณหภูมิกก เพิ่มขึ้น 1-2 °C ลูกไก่อต้องกระจายทั่วพื้นที่กก
12. ตรวจสอบ Crop Fill ในระยะฟัก(สุ่มโรงเรือนละ 100 ตัว : 3 จุด)ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่
2 ชม.= 75% , 4 ชม.= 80% , 8 ชม.= > 80% , 12 ชม.= > 85% , 24 ชม.= > 95% และ 48 ชม.= 100%
13. เป้าหมายน้ำหนักสัปดาห์แรก มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4.5-5 เท่า ของน้ำหนักเริ่มเลี้ยง
14. เป้าหมายอัตราการสูญเสีย ไม่เกิน 0.7 %



Profile การระบายอากาศ



แนวทางปฏิบัติ

- Profile : Target Temperature , Heat , Cooling

Temperature (อุณหภูมิ C)			
Day	Target	Heat	Cool
1	35.0	34.5	37.0
4	32.3	31.8	35.7
7	30.7	30.2	34.7
10	29.7	29.2	33.7
13	28.7	28.2	33.0
16	27.3	26.7	32.7
19	25.7	24.3	32.0
22	24.8	22.8	31.8
25	24.0	22.0	31.0
28	23.0	21.0	30.0
31	22.7	20.6	29.6
34	22.1	20.1	29.1
37	21.4	19.4	28.7
40	20.5	18.6	28.3
43	20.0	18.0	28.0

- ปรับ Target Temp./Cooling ให้เหมาะสม ให้ตรวจสอบการกระจายตัว และการกินน้ำกินอาหาร
- ตรวจสอบการระบายอากาศ เพื่อระบายแก๊ส CO₂ และแก๊สแอมโมเนีย ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน
- ตรวจสอบการระบายอากาศ เพื่อระบายแก๊สแอมโมเนีย ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน

**** Profile :** ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการผลิต สภาพแวดล้อม

หมายเหตุ : กรณีลูกไก่ตัวเล็ก(แม่ไก่สาว) ให้ปรับอุณหภูมิยก เพิ่มขึ้น 1-2 °C



Profile การระบายอากาศ



แนวทางปฏิบัติ

○ Profile : **Min-Max** พัดลม

MIN-MAX		
Day	From(ตัว)	To(ตัว)
1	on 0.5 off 4.5	1
4	on 1.0 off 4.0	1
7	on 2.5 off 2.5	2
10	on 3.5 off 1.5	3
13	1	4
16	1	5
19	2	6
22	3	7
25	5	8
28	6	9
31	7	9
34	7	10
37	8	10
40	9	10
43	10	10

Day	Target	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10	Cooling
1	35.0	36.0	36.9	37.9	38.9	39.8	40.8	41.8	42.7	43.7	44.7	37.0
4	32.3	33.5	34.7	35.8	37.0	38.2	39.3	40.5	41.7	42.8	44.0	35.7
7	30.7	31.7	32.8	33.9	35.0	36.0	37.1	38.2	39.3	40.4	41.4	34.7
10	29.7	30.7	31.6	32.6	33.6	34.6	35.6	36.6	37.5	38.5	39.5	33.7
13	28.7	29.5	30.4	31.3	32.1	33.0	33.9	34.7	35.6	36.4	37.3	33.0
16	27.3	28.1	29.0	29.8	30.6	31.4	32.2	33.0	33.8	34.6	35.4	32.7
19	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	32.9	32.0
22	24.8	25.3	25.9	26.5	27.1	27.7	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.8
25	24.0	24.5	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3	27.8	28.4	28.9	29.5	31.0
28	23.0	23.5	24.0	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.9	27.3	27.8	30.0
31	22.7	23.0	23.4	23.9	24.3	24.7	25.2	25.6	26.0	26.5	26.9	29.6
34	22.1	22.5	22.9	23.3	23.7	24.1	24.5	24.8	25.2	25.6	26.0	29.1
37	21.4	21.8	22.1	22.5	22.8	23.1	23.5	23.8	24.2	24.5	24.9	28.7
40	20.5	20.9	21.2	21.5	21.8	22.1	22.4	22.7	23.0	23.3	23.6	28.3
43	20.0	20.3	20.5	20.8	21.1	21.4	21.6	21.9	22.2	22.5	22.7	28.0



Profile การระบายอากาศ



แนวทางปฏิบัติ

- Profile : ตาราง Cooling

Num.	From Time	To Time	From Temp.	To % RH	On Min.	Off Min.
1	9:00	11:59	30.0	70	0.3	4
2	12:00	13:59	30.0	70	0.6	3
3	14:00	15:59	30.0	75	0.9	2
4	16:00	17:59	30.0	75	0.6	3
5	18:00	22:00	30.0	70	0.3	4

หมายเหตุ : พิจารณาตามฤดูกาลหรือสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้น



โปรแกรมแสงสว่าง



แนวทางปฏิบัติ

Day	From	To	Intensity(Lux)	ชั่วโมงปิด
1	20:01	20:00	40	0
3	22:00	20:00	40	2
5	00:00	20:00	40	4
11	02:00	20:00	40	6
15	02:00	20:00	20	6
29	00:00	20:00	7-10	4
36	22:00	20:00	7-10	2
วันปลด	20:01	20:00	7-10	0
ขณะปลด	20:01	20:00	< 5	0



สัดส่วนการใช้อาหาร



แนวทางปฏิบัติ

การให้อาหารไก่เนื้อ แบ่งเป็น 3 ระยะ : กรณีปลดไก่ อายุ 40 วัน น้ำหนักเฉลี่ย 2.75 กก. / FCR 1.510

เบอร์อาหาร	ระยะเวลา (วัน)	ปริมาณ (กก.)	สัดส่วนการใช้ (%)	หมายเหตุ
510	1-13	0.500-0.550	13	-
511	20- 7 วันก่อนปลด	2.15	52	-
513	7 วันก่อนปลด	1.50	35	ไม่ผสมยาต้านบิด
รวม		4.15	100	-

หมายเหตุ : ระบบการให้อาหารแบบ Full Feed



การจัดการรับลูกไก่

○ การตรวจสอบอุณหภูมิในรถบรรทุก



อุณหภูมิรถขนส่ง

อุณหภูมิกล่องลูกไก่

การตรวจสอบ :

- อุณหภูมิภายในรถขนส่ง จะต้องไม่เย็นหรือร้อนเกินไป (ระหว่าง 22-28 °C) ช่วงประมาณ 25-26 °C โดยตรวจสอบจาก Data logger
- ตรวจสอบสภาพลูกไก่ต้องไม่นอนสุม หมอบ หรือแสดงอาการอ้าปากหอบ
- การลงลูกไก่ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที/คิน
- อุณหภูมิตัวลูกไก่ 39.6-40.5 °C
- กรณีพบปัญหาเกิดขึ้น ให้ประสานงานกับโรงฟักไข่ และผู้รับผิดชอบทันที

○ การวัดอุณหภูมิตัวไก่(Body Temperature)



การวัดอุณหภูมิขณะรับลูกไก่

Standard อุณหภูมิร่างกายไก่

Age	Average body temperature
1 day	39.7 °C
2 day	40.1 °C
4 day	41.0 °C
5 day	41.4 °C
10 day	41.4 °C

○ การตรวจสอบ Crop Fill



การตรวจสอบ Crop Fill

Standard Crop Fill

Hours	Target Crop Fill (%)
2 hours	75
4 hours	80
8 hours	> 80
12 hours	> 85
24 hours	> 95
48 hours	100

Ross-Broiler Handbook 2018-EN

3. การจัดการอายุ 1-2 สัปดาห์ (Age 1-2 weeks Management)



3.การจัดการอายุ 1-2 สัปดาห์



แนวทางปฏิบัติ



1. การจัดการน้ำ

- ปรับระดับความสูงของหัว Nipple ให้พอดี ลูกไก่ยืนเต็มเท้า จิกกินท่ามุม 45 องศา
- อายุ 1-14 วัน ปรับ Flowrate น้ำในท่อ Nipple 30-40 ml/min
- อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม 18-21 °C (64-70 °F) กรณีที่น้ำอุ่นให้ Flush น้ำในท่อทิ้ง

2. การจัดการอาหาร

- อายุไก่ 1-13 วัน ใช้อาหารระยะแรก(Starter feed) 500 กรัม/ตัว ลูกไก่เข้า
- ปรับเบอร์จานอาหาร ไม่ให้อาหารลงมากเกินไป ป้องกันการหกหล่น และรักษาคุณภาพอาหาร
- ปรับระดับความสูงจานอาหารตามช่วงอายุไก่ อยู่ระดับหลังไก่ ให้ไก่กินสะดวก ไม่นอนกินหรือเขย่งเท้ากิน
- ตรวจสอบอาหารทางกายภาพ ต้องเป็นสีเหลือง น้ำตาล มีกลิ่นหอม % ฝุ่น < 15 %
- การใช้อาหารต้องเป็นแบบ First In First Out (FIFO) / ฝาถังไซโลต้องปิดมิดชิด

3. การขยายกก/อุปกรณ์การเลี้ยง(พิจารณาตามฤดูกาล)

อายุ(วัน)	พื้นที่กก(ตรม.)	Density(ตัว/ตรม.)	ตัว/Nipple	ตัว/Pan
1-3	612	30	35-37	110-120
4-7	765	24	22-23	75-80
8-11	1,116	16	14-15	45-50
12-ปลด	1,440	12	11-12	35-40



3.การจัดการอายุ 1-2 สัปดาห์



แนวทางปฏิบัติ



4. การจัดการวัสดุรองพื้น

- อายุ 1-14 วัน กลับบเกลบบบริเวณใต้ Nipple แผงกั้นไก่ และบริเวณที่เปียกชื้น
- ตรวจสอบและประเมินสภาพวัสดุรองพื้น โดยการให้คะแนนวัสดุรองพื้น/ดำเนินการแก้ไขวัสดุรองพื้นทันที
- กลับบเกลบบ/เสริมเกลบบ ใต้ Nipple บริเวณแผงกั้นไก่ และบริเวณพื้นที่เกลบบาง

5. การจัดการอุณหภูมิ และความชื้น

- จัดหาและตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้มีค่าที่ถูกต้องก่อนใช้งาน
- อุณหภูมิ ไก่อยู่สบาย ไม่อ้าปากหอบ กินน้ำกินอาหารปกติ
- ความชื้นที่เหมาะสม 50-70%
- กรณีความชื้นสัมพัทธ์(RH) ภายในโรงเรือนต่ำกว่า 50% ให้แก้ไขโดยการเพิ่มความชื้น เช่น ใช้น้ำราด Pad ในช่วงเวลา กลางวัน(13.00-16.00 น.) ผ่านระบบ Evap หรือ พ่นสเปรย์หมอก
- การใช้ Evap ต้องสัมพันธ์กับจำนวนการใช้พัดลม ซึ่งพฤติกรรมไก่ต้องไม่หอบ หลบลม หรืออ้าปากหายใจหอบ

6. การจัดการแสงสว่าง

- อายุ 1-2 สัปดาห์ ความเข้มแสง ไม่น้อยกว่า 40 Lux
- ตรวจสอบแสงสว่าง ประสิทธิภาพหลอดไฟ ให้มีความสม่ำเสมอตลอดพื้นที่การเลี้ยง

7. การจัดการการระบายอากาศ (ขึ้นกับสภาพอากาศและฤดูกาล)

Temperature (อุณหภูมิ C)			
Day	Target	Heat	Cool
1	35.0	34.5	36.0
3	32.0	31.5	34.0
6	30.0	29.5	33.0
9	29.0	28.5	32.0
12	28.0	27.5	31.5
15	26.5	26.0	32.0

Day	Target	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	Cooling
1	33.0	34.7	36.3	38.0	39.6	41.3	43.0	44.6	46.3	47.9	49.6	36.0
3	32.0	33.6	35.2	36.8	38.4	40.0	41.6	43.2	44.8	46.3	47.9	34.0
6	30.0	31.5	33.1	34.6	36.1	37.6	39.2	40.7	42.2	43.7	45.3	33.0
9	29.0	30.5	31.9	33.4	34.8	36.3	37.8	39.2	40.7	42.2	43.6	32.0
12	28.0	28.8	30.2	32.2	32.8	34.1	35.5	36.8	38.1	39.5	40.8	31.0
15	26.5	27.3	28.5	29.8	31.0	32.3	33.6	34.8	36.1	37.4	38.6	30.5

- ปรับ Target Temp./Cooling ให้เหมาะสม ให้ตรวจสอบการกระจายตัว และการกินน้ำกินอาหาร
- ตรวจสอบการระบายอากาศ เพื่อระบายแก๊ส CO₂ และแก๊สแอมโมเนีย ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน



3.การจัดการอายุ 1-2 สัปดาห์ : การขยายกก




แนวทางปฏิบัติ

ฤดูร้อน-ฝน

○ อายุ 1-2 วัน

พื้นที่กก = 612 ตรม.
Density = 30 ตัว/ตรม.
Nipple = 35-37 ตัว/หัว
Pan = 110-120 ตัว/pan




ฤดูหนาว

○ อายุ 1-3 วัน

○ อายุ 3-5 วัน


พื้นที่กก = 765 ตรม.
Density = 24 ตัว/ตรม.
Nipple = 22-23 ตัว/หัว
Pan = 75-80 ตัว/pan



○ อายุ 4-6 วัน

○ อายุ 6-8 วัน


พื้นที่กก = 1,116 ตรม.
Density = 16 ตัว/ตรม.
Nipple = 14-15 ตัว/หัว
Pan = 45-50 ตัว/pan



○ อายุ 7-11 วัน

○ อายุ 9 วัน-ปลด

พื้นที่กก = 1,440 ตรม.
Density = 12 ตัว/ตรม.
Nipple = 11-12 ตัว/หัว
Pan = 35-40 ตัว/pan



○ อายุ 12 วัน-ปลด

4. การจัดการอายุ 3-7 สัปดาห์ (Age 3-7 weeks Management)



4.การจัดการอายุ 3-7 สัปดาห์

1. การจัดการน้ำ

- ปรับระดับความสูงของหัว Nipple ให้พอดี ตามช่วงอายุของไก่
- อายุ 15 วัน -ปลด ปรับ Flowrate น้ำในหัว Nipple 60-70 ml/min
- อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม 18-21 °C (64-70 °F)

2. การจัดการอาหาร

- อายุไก่ 16-21 วัน ใช้อาหารระยะเจริญเติบโต(Grower feed) $511 = \% \text{ ฝุ่น} < 5-7 \% / \% \text{ PDI} = 95-96\%$
- อายุไก่ 22 วัน-ปลด ใช้อาหารระยะสุดท้าย(Finisher feed) กินก่อนจับ 7-10 วัน $513 = \% \text{ ฝุ่น} < 5-7 \% / \% \text{ PDI} 95-96\%$
- ปรับเบอร์จานอาหาร ไม่ให้อาหารลงมากเกินไป สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้
- ปรับระดับความสูงจานอาหารตามช่วงอายุไก่ อยู่ระดับหลังไก่ ให้ไก่กินสะดวก ไม่นอนกินหรือเขย่งเท้ากิน
- ตรวจสอบอาหารทางกายภาพ ต้องเป็นสีเหลือง น้ำตาล มีกลิ่นหอม
- การใช้อาหารต้องเป็นแบบ First In First Out (FIFO) / ฝาถังไซโลต้องปิดมิดชิด

3. การจัดการวัสดุรองพื้น

- อายุ 15-28 วัน กลับแกลบ/เสริมแกลบ บริเวณใต้ Nipple แผงกั้นไก่ และบริเวณที่เปี่ยกขึ้น
- อายุ 29 วัน เป็นต้นไปยกเลิกการกลับแกลบและเสริมแกลบ (ยกเว้นกรณีที่ใช้ถุงแกลบเป็นคอก(Perch))
- ตรวจสอบและประเมินสภาพวัสดุรองพื้น โดยการให้คะแนนวัสดุรองพื้น/ดำเนินการแก้ไขวัสดุรองพื้นที่



3.การจัดการอายุ 3-7 สัปดาห์



แนวทางปฏิบัติ

4. การจัดการอุณหภูมิ และ ความชื้น

- จัดหาและตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้มีค่าที่ถูกต้องก่อนใช้งาน
- อุณหภูมิ ไก่อยู่สบาย ไม่อ้าปากหอบ กินน้ำกินอาหารปกติ
- ความชื้นที่เหมาะสม 50-70%
- การใช้ Evap ต้องสัมพันธ์กับจำนวนการใช้พัดลม ซึ่งพฤติกรรมไก่ต้องไม่หอบ หลบลม หรืออ้าปากหายใจหอบ

5. การจัดการแสงสว่าง

- อายุ 3-4 สัปดาห์ ความเข้มแสง ไม่น้อยกว่า 20 Lux /
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลอด แสงต้องมีความเข้มสม่ำเสมอทั่วโรงเรือน

6. การจัดการการระบายอากาศ (ขึ้นกับสภาพอากาศและฤดูกาล)

Temperature (อุณหภูมิ C)			
Day	Taget	Heat	Cool
21	24.0	24.0	32.0
24	23.5	23.0	31.0
27	22.5	22.0	31.0
30	22.2	21.7	30.0
33	21.7	21.2	30.0
36	20.8	20.3	29.5
39	20.4	19.9	29.0
42	20.0	19.5	28.5
45	19.5	19.0	28.0

Day	Target	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	Cooling
21	24.0	25.1	26.1	27.2	28.3	29.3	30.4	31.4	32.5	33.6	34.6	30.0
24	23.5	24.6	25.8	26.9	28.0	29.1	30.3	31.4	32.5	33.7	34.8	29.5
27	22.5	23.6	24.6	25.7	26.8	27.8	28.9	29.9	31.0	32.1	33.1	29.0
30	22.2	23.2	24.2	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2	30.2	31.2	32.2	28.5
33	21.7	22.6	23.5	24.5	25.4	26.3	27.2	28.2	29.1	30.0	31.0	28.0
36	20.8	21.1	21.4	21.9	22.3	23.2	24.6	25.2	26.7	28.9	29.8	28.0
39	20.4	20.7	20.9	21.5	21.8	22.8	24.2	24.8	26.3	28.5	29.4	28.0
42	20.0	20.3	20.6	21.1	21.4	22.4	23.8	24.4	25.9	28.1	29.0	28.0
45	19.5	19.8	20.1	20.6	20.9	21.9	23.3	23.9	25.4	27.6	28.5	28.0

- ปรับ Target Temp./Cooling ให้เหมาะสม ให้ตรวจสอบการกระจายตัว และการกินน้ำกินอาหาร
- ตรวจสอบการระบายอากาศ เพื่อระบายแก๊สแอมโมเนีย ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน

7. การตรวจประเมินสุขภาพไก่/การปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

- ประเมินสุขภาพไก่ อัตราการตายประจำวัน และทำการผ่าซากกรณี % สุนัขเสีย 0.3 % หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- OJT คนงานเลี้ยงไก่และติดตามให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์



3.การจัดการอายุ 3-7 สัปดาห์ : การจัดการให้น้ำ



แนวทางปฏิบัติ

○ จำนวน Nipple ที่เหมาะสม

Age (day)	Nipple (bird/nipple)
1-4	≤ 30
5-21	≤ 20
22- Catch	≤ 14

○ การปรับแรงดันน้ำ


Age(day)	Rate flow(ml/min.)
1-14	20-30
15-34	40-50
35-catching	60-70

○ การวัด Flow rate



- การวัด Flow rate ของน้ำในท่อ Nipple ต้องสัมพันธ์กับการปรับระดับแรงดันของ Regulator ด้วย
- ควรวัดก่อนนำไก่เข้าเลี้ยง เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

○ ปรับระดับ Nipple ให้น้ำให้เหมาะสม



1-2 Weeks

3-4 Weeks

5-6 Weeks

7-8 Weeks

หมายเหตุ : ไก่ช่วงอายุ 3 wk. ขึ้นไป ต้องยืนเต็มเท้าและยึดคอทึน



ไก่เล็ก



ไก่รุ่น



ไก่ใหญ่



3.การจัดการอายุ 3-7 สัปดาห์ : การจัดการให้อาหาร



แนวทางปฏิบัติ

การให้อาหารไก่เนื้อ แบ่งเป็น 3 ระยะ กรณึปลดไก่ อายุ 42 วัน

น้ำหนักเฉลี่ย 2.7 กก. / FCR 1.60

เบอร์อาหาร	ระยะเวลา (วัน)	ปริมาณ (กก.)	สัดส่วนการใช้ (%)	หมายเหตุ
510	1-19	0.65	15	
511	20- 7 วันก่อนปลด	2.16	50	
513	7 วันก่อนปลด	1.51	35	ไม่ผสมยาเกินขีด
รวม		4.32		

- ตรวจสอบอุปกรณ์การให้อาหาร ต้องพร้อมใช้งานทุกวัน
- โปรแกรมอาหารต้องมี Stock อย่างน้อย 1-2 วัน
- การปรับเบอร์ Pan ควรปรับอาหารให้ลงปริมาณพอดี เพื่อลดการหกหล่น และ % การเป็นฝุ่น ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา

○ มาตรฐานของอาหารไก่เนื้อ

	% ฝุ่น	% PDI	% ความชื้น	% Protein	% FAT
ระยะแรก 510	20	88-96	11.5	23.1	6.5
ระยะสอง 511	15	88-96	11.5	22.5	8.5
ระยะสุดท้าย 513	15	88-96	11.5	20.0	8.5

Crumble feed



ระยะแรก 510

Pellet feed



ระยะสอง 511

Pellet feed



ระยะสอง 513

○ การปรับระดับความสูงให้เหมาะสม ไก่กินได้พอดี





3.การจัดการอายุ 3-7 สัปดาห์ : การจัดการวัสดุรองพื้น



แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ	โรงเรือน		ปริมาณวัสดุรองพื้น (แกลบ)			
	ขนาด ก x ย(เมตร)	พื้นที่(ตร.ม.)	แกลบ/เล้า(ตัน)	กรอกแกลบเสริม/เล้า		รวม (ตัน)
				(ตัน)	(ถุง)	
1	12 X 120	1,440	4.5 - 5.2	0.5	50	5.0 - 5.7
2	14 x 120	1,680	5.3 - 6.2	0.5	50	5.8 - 6.7
3	16 x 120	1,920	6.2 - 7.1	0.5	50	6.7 - 7.6
4	18 x 120	2,160	7.0 - 8.6	0.5	50	7.5 - 8.6

หมายเหตุ : ปริมาณแกลบ 3.5-4.0 กก./ตร.ม. (รวมแกลบเสริม) ความหนา ประมาณ 2.0-2.5 นิ้ว

ระดับ	การแก้ไข
ระดับที่ 1	เป็นปกติ ไม่ต้องแก้ไข
ระดับที่ 2	กลับแกลบ และ/หรือตักแกลบออกแล้วเสริมด้วยแกลบใหม่ที่สำรองเตรียมไว้
ระดับที่ 3	ตักแกลบที่เป็นแผ่นออกใส่ถุงนำไปทิ้งแล้วเสริมด้วยแกลบใหม่ที่สำรองเตรียมไว้
ระดับที่ 4	ตักแกลบที่เปื่อยขึ้นออกใส่ถุงนำไปทิ้งแล้วนำแกลบใหม่ที่สำรองเตรียมไว้เข้ามาใส่แทน



Litter Management

Causes of poor litter quality.



การแกลบเสริม

- การเสริมแกลบ อายุไม่เกิน 30 วัน
- การเก็บถุงแกลบ ให้ยกสูงจากพื้น เพื่อไม่เป็นที่อยู่อาศัยแมลงปีกแข็ง
- ต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่ตื่นตกใจ เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน
- ต้องเก็บถุงแกลบ ต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่ตื่นตกใจ



- กิจกรรมที่เกิดขึ้น ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง นุ่มนวล
 1. เก็บไก่ตาย/ไก่อัด
 2. กลับแกลบ/เสริมแกลบ
 3. ช่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย
 4. ตรวจสอบ/ติดตามสุขภาพไก่
 5. เก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
- การเดินเข้าโรงเรือน ต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่อั๊นตกใจ
- การเก็บไก่ตาย ห้ามโยนซากไก่อตายไปกลางเล้า ให้เก็บใส่ภาชนะหรือถุง โดยไม่ทำให้ไก่อั๊นตกใจ
- การคัดไก่ กรณีที่พบ ให้คัดในช่วงเก็บไก่ตาย/ตรวจสอบสุขภาพไก่
- กรณีที่มีการซ่อมแซม หากนำอุปกรณ์เข้าไปต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่อั๊นตกใจ

5. การจับไก่

(Catching Chicken Program)



แนวทางปฏิบัติ



5.การจับไก่(Catching Chicken Program)



1. วางแผนการจับไก่ กำหนดโรงเรือนที่จับ จำนวนไก่ต่อกล่อง ทีมจับไก่ สุขภาพไก่ การจัดอันดับไก่เกรด
2. ตรวจสอบคุณภาพ/สุขภาพไก่ รายหลังเพื่อวางแผนในการส่งมอบให้กับโรงงาน เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต/ลดปัญหาและผลกระทบต่างๆ ของโรงงาน
3. ติดตามโปรแกรมการสั่ง/Stock อาหาร เพื่อไม่ให้มีอาหารคงเหลือ/การโอนย้ายระหว่างโรงเรือน
4. สุ่มชั่งน้ำหนัก ประเมินการน้ำหนักก่อนปลด 3 วัน เป้าหมายน้ำหนักต้องแตกต่างกันไม่เกิน 50 กรัมจากการเฉลี่ย
5. ติดตาม ควบคุมการอดอาหารไก่ก่อนคิ้ว 10 ชั่วโมง และต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ก่อนคิ้ว
6. ปรับระดับอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารระหว่างจับไก่ ให้อยู่ในระดับที่คนงานจับไก่สามารถทำงานได้สะดวก บริเวณที่ยังไม่จับ ไก่สามารถกินน้ำได้ตลอดเวลา
7. จำนวนคนจับไก่ อย่างน้อย 25 คน/ทีม
8. ขณะจับไก่ปรับลดความเข้มแสงให้น้อยกว่า 5 Lux เพื่อให้ไก่สงบ และต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่ตื่นตกใจ
9. สัตวบาลต้องติดตาม ควบคุม ขณะจับไก่ต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่สุมทับกัน เพื่อป้องกันไก่ตายระหว่างจับ
10. วิธีการจับไก่ต้องจับอย่างถูกต้องและนุ่มนวล
11. ตรวจสอบเช็ค Stock ปริมาณอาหารคงเหลือ และดำเนินการ



5.การจับไก่(Catching Chicken Program)



แนวทางปฏิบัติ



- ติดตาม ควบคุมการให้อาหารไก่ก่อนคัก 10 ชั่วโมง และต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ก่อนคัก
- ปรับระดับอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารระหว่างจับไก่ ให้อยู่ในระดับที่คนงานจับไก่ สามารถทำงานได้สะดวก บริเวณที่ยังไม่จับ ไก่สามารถกินน้ำได้ตลอดเวลา



ขณะจับไก่ปรับลดความเข้มแสงให้น้อยกว่า 5 Lux เพื่อให้ไก่สงบ และต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่ตื่นตกใจ



- การนำอุปกรณ์ ราง กล่องโมดูล เข้าไปในโรงเรือน ต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่ตื่นตกใจ และทับไก่



- การกั้นไก่ขณะจับ ต้องระมัดระวังไม่ให้ไก่อัดทับกันตายระหว่างจับ
- การกั้นไก่และจับไก่ ต้องปฏิบัติตามหลัก Animal Welfare
- อัตราการบรรจุไก่ต่อพื้นที่กล่อง มากกว่า 160 ตร.ซม./ไก่ 1 ก.ก.
- หนีความเข้มแสง ช่วงจับไก่ 3-5 Lux
- OJT พนักงาน ติดตาม และประเมินผล



5.การจับไก่(Catching Chicken Program)



แนวทางปฏิบัติ



- การนำไก่ขึ้นรถบรรทุก ต้องมีพัดลม และสเปรย์หมอก เพื่อระบายความร้อน



- จุดซึ่งนำหนักไก่หน้าฟาร์ม ต้องมีพัดลมระบายอากาศ และสเปรย์หมอก


6. การส่งมอบไก่เป็น (Live Chicken Delivery)



6. การส่งมอบไก่เป็น(Live Chicken Delivery)

การขนส่งไก่เป็น

- ตรวจสอบความสะอาด รถขนส่ง โมดูล กล่องบรรจุไก่ ต้องสะอาดไม่มีเศษมูลไก่คั่งค้าง
- พนักงานขนส่ง ต้องผ่านการอบรมและการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ควบคุมรถขนส่ง ต้องขับตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด
- ควบคุมรถขนส่ง ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.
- รถขนส่งและคนขับรถ ต้องผ่านระบบ Biosecurity ของฟาร์มอย่างเคร่งครัด
- รถขนส่ง ต้องไปในเขตพื้นที่ ที่ฟาร์มกำหนดเท่านั้น
- เป้าหมายไก่ตายระหว่างขนส่ง(DOA) ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด 0.12 %
- กรณีที่อากาศร้อน ต้องมีระบบพัดลมและสเปรย์น้ำ เพื่อช่วยระบายความร้อนให้ไก่
- พื้นที่การบรรจุ ต้องไม่ต่ำกว่า $160 \text{ cm}^2 / \text{Kg}$.
- เอกสารประกอบการขนส่ง ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนออกจากฟาร์ม
- ล้างให้สะอาดและฆ่าเชื้อกล่องบรรจุไก่ รถขนส่ง ก่อนเข้าจับฟาร์มต่อไป





Thank You

