

L^AT_EX 排版示例

凌杰

2025 年 12 月 9 日

目录

1	正文样式示例	2
1.1	正文段落	2
1.2	引言文本	2
1.3	列表项目	2
1.4	注释说明	3
2	图表元素示例	4
2.1	插图元素	4
2.2	表格元素	5
3	专用环境示例	6
3.1	公式与定理	6
3.2	算法与代码	7

1 正文样式示例

1.1 正文段落

这是一段正文，它没有特殊的样式，我们只需直接写在章节标题下面即可。在这里继续添加文本，丰富一些内容以展示段落效果。

这是另一段正文，它也没有特殊的样式，它与上一段正文之间用空行分割即可。在这里继续添加文本，丰富一些内容以展示段落效果。

我们还可以在正文中插入一个能跳转到 [TeX Live 官方网站](#) 的超链接。

1.2 引言文本

下面将显示的是一段引言文本的示例：

“*L^AT_EX* 是一种排版系统，它使用 *T_EX* 排版引擎，并遵循一套文档类和宏包的规范，以实现文档的自动化排版。”

– 高德纳 (Donald E. Knuth)

下面是一个较长的引用文本示例：

“*Leslie Lamport* 在 1980 年代初期开发了 *L^AT_EX* 系统，以简化 *T_EX* 的使用。*L^AT_EX* 提供了一套宏和命令，使用户能够专注于文档内容，而无需过多关注排版细节。*L^AT_EX* 迅速成为学术界和技术文档撰写的标准工具，尤其在数学、计算机科学等领域得到了广泛应用。

L^AT_EX 的设计理念强调结构化文档和内容优先，这使得它在处理复杂文档时表现出色。通过使用各种宏包，用户可以轻松地扩展 *L^AT_EX* 的功能，以满足不同的排版需求。今天，*L^AT_EX* 已经发展成为一个庞大的生态系统，拥有丰富的资源和活跃的社区支持。”

– 节选自维基百科

1.3 列表项目

下面是一个有序列表的示例：

1. 第一个选项
2. 第二个选项
3. 第三个选项

下面是一个无序列表的示例：

- 第一个选项
- 第二个选项
- 第三个选项

下面是一个描述列表的示例：

第一个选项： 这是第一个选项的描述内容

第二个选项： 这是第二个选项的描述内容

第三个选项： 这是第三个选项的描述内容

下面是一个多层次列表的示例：

1. 第一个选项
2. 第二个选项
3. (a) 第一个选项
(b) 第二个选项
(c) i. 第一个选项
ii. 第二个选项
iii. 第三个选项

1.4 注释说明

这是一段要被脚注的文本。¹

这是一段要被边注的文本。

这是右侧
边注内容。

¹这是脚注的内容。

2 图表元素示例

2.1 插图元素

勾股定理，是一个基本的几何定理，指直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。中国古代称直角三角形为勾股形，并且直角边中较小者为勾，另一长直角边为股，斜边为弦，所以称这个定理为勾股定理，也有人称商高定理，其几何关系如图1所示。

在这里，我们使用了 `wrapfig` 宏包提供的 `wrapfigure` 环境，该环境会自动将图片元素放置在右侧，并让文字环绕在图片的左侧。




图 1: 勾股定理示意图

2.2 表格元素

勾股定理的公式有多种不同的表达形式，下面的表格1总结了一些常见的勾股定理公式。

表 1: 勾股定理公式汇总

公式名称	数学表达式
标准形式	$a^2 + b^2 = c^2$
求斜边 c	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$
求直角边 a	$a = \sqrt{c^2 - b^2}$
求直角边 b	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$
三角函数形式（正弦与余弦）	$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$
向量形式（二维空间）	$\ \mathbf{v}\ ^2 = v_x^2 + v_y^2$

表 2: 勾股定理公式汇总（单元格合并示例）

公式名称	数学表达式
标准形式	$a^2 + b^2 = c^2$
求边公式	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$
	$a = \sqrt{c^2 - b^2}$
	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$
三角函数形式（正弦与余弦）	$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$
向量形式（二维空间）	$\ \mathbf{v}\ ^2 = v_x^2 + v_y^2$

表 3: 单元格跨列合并示例

合并两列		单元格 3
单元格 1	单元格 2	单元格 3

3 专用环境示例

3.1 公式与定理

下面是一些数学公式的示例：

行内公式示例： $a^2 + b^2 = c^2$ 。

不带编号的行间公式：

$$E = mc^2$$

带编号的行间公式：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

下面是定理、引理和推论的示例：

定理 3.1 (勾股定理). 在直角三角形中，斜边的平方等于两条直角边的平方和。

$$c^2 = a^2 + b^2$$

引理 3.2 (辅助引理). 如果一个三角形的两条边的平方和等于第三条边的平方，那么这个三角形是直角三角形。

推论 3.3 (推论). 直角三角形的面积可以通过两条直角边的长度计算得出。

$$\text{面积} = \frac{1}{2}ab$$

接下来，我们可以这样引用这些定理和公式：

- 定理 3.1 表明了勾股定理。
- 引理 3.2 是勾股定理的一个辅助结论。
- 推论 3.3 则是勾股定理的一个直接应用。
- 勾股定理的公式 1 可以用来计算直角三角形的斜边长度。

3.2 算法与代码

下面是计算斐波那契数列的算法描述：

Algorithm 1: 计算斐波那契数列

Input: 一个非负整数 n

Output: 数组 F ，包含斐波那契数列的前 n 项 ($F[0] = 0, F[1] = 1, \dots$)

```
1 if  $n \leq 0$  then
2   | return [] ;                               // 返回空数组表示无效输入
3 end
4 if  $n = 1$  then
5   | return [0] ;                             // 基础情况：仅第 0 项
6 end
7  $F[0] \leftarrow 0$ ;
8  $F[1] \leftarrow 1$ ;
9 for  $i \leftarrow 2$  to  $n - 1$  do
10  |  $F[i] \leftarrow F[i - 1] + F[i - 2]$ ;
11 end
12 return  $F$ ;
```

在算法 1 中，我们描述了计算斐波那契数列的迭代方法。下面来看看上述算法的 Python 代码实现：

```
1         def fibonacci(n):
2             if n <= 0:
3                 return "Input error"
4             if n == 1:
5                 return [0]
6             if n == 2:
7                 return [0, 1]
8
9             f = [0, 1]
10            for i in range(2, n):
11                f.append(f[i-1] + f[i-2])
12            return f
```

Listing 1: 斐波那契数列的 Python 实现

上述代码实现了斐波那契数列的计算，并且使用了迭代的方法。你可以通过调用 ‘`fibonacci(n)`’ 来计算斐波那契数列的前 n 项。