新北市立永和國民中學 114 學年度第一學期 第二段定期評量 七年級生物科試題卷


範圍：3-2~4-4+實驗活動 3-2~4-1 **本卷所有試題皆為單選，每題 2 分，共 100 分。請選出最佳答案並依題號填入答案卡。**

一、單選題

01.下列有關酵素的敘述，何者**錯誤**？【3-2】
(A)主要成分為蛋白質
(B)與受質的結合具有專一性
(C)可於生物體外進行反應
(D)活性不受環境影響

02.下列何者反應無酵素參與反應，且不產生新的物質？【3-2】
(A)植物行光合作用合成葡萄糖
(B)植物可將葡萄糖合成澱粉
(C)脂質被膽汁乳化
(D)食物在消化系統中被分解成小分子養分

03.附圖為光合作用的流程圖，下列敘述何者正確？【3-3】




(A)甲可以是氧氣，由氣孔進出
(B)乙可以是水，由葉脈運輸
(C)丙可以是風，增加葉綠體與氣體的交換
(D)戊可以是二氧化碳，由葉綠體消耗能量而產生

04.阿德想知道某種植物在不同環境條件下，葉片行光合作用時速率的快慢，哪一組實驗設計較合理？【3-3, 108 會考改】

	植物的處理			檢測
	變因設計	甲植物	乙植物	
(A)	操作變因	正常光照	處於黑暗	產生氧氣的量，以及澱粉的產量
	控制變因	其餘條件皆相同		
(B)	操作變因	拔除葉子	處於黑暗	葉綠素以及水分的消耗量
	控制變因	其餘條件皆相同		
(C)	操作變因	正常光照	處於黑暗	二氧化碳及氧氣的消耗量
	控制變因	不須控制		
(D)	操作變因	無		產生澱粉及消耗葡萄糖的量
	控制變因	皆處於正常光照		

05.關於光合作用的敘述，何者正確？【3-3】
(A)光合作用所需光能，是由葉綠素負責吸收
(B)葉脈只運輸光合作用的原料，產物不由葉脈運輸
(C)光合作用 *原料*→**產物**：***葡萄糖+氧氣*→二氧化碳+水+能量**
(D)氧氣是植物光合作用的主要產物，葡萄糖並非主要產物

06.阿吉患了膽道閉鎖症，無法順利排出膽汁，因而造成膽汁逆流，此現象將會直接導致右圖中哪一種器官受損，並影響到哪種營養素的分解效率？【3-4, 91-2 基測改】



(A)胃，蛋白質
(B)肝臟，脂質
(C)胰臟，醣類
(D)小腸，水分

07.關於人體中消化系統的描述，何者最合理？【3-4】
(A)腸腺分泌腸液，與水分的吸收有關
(B)膽汁可以分解脂質，直接被消化道吸收
(C)口腔的唾液澱粉酶可以分解蛋白質
(D)食道可利用管壁肌肉蠕動，讓食物進到胃部


08.以下各**消化道名稱**與其內的**消化液名稱**之**配對**，下列何選項，完全正確？【3-4】

	消化道	**消化液名稱**
(A)	胃	胃酸
(B)	胰臟	胰液
(C)	肝臟	膽汁
(D)	口腔	唾液

09.小腸絨毛增加養分吸收的效率的原理，與下列何者最相似？
(A)植物根上的根毛
(B)消化道的蠕動運動
(C)植物細胞的角質層
(D)動物體內的脂肪層【3-4】


10.關於「光與光合作用實驗」的**步驟**與**目的**，下列何者皆正確？
(A)放入熱水中煮　→釋放葉子中的澱粉
(B)放入恆溫水槽　→讓本氏液充分反應
(C)放入熱水中漂洗 →溶解葉綠素
(D)將葉子滴入碘液 →檢測是否含有澱粉　【活動 3-3】

11.附圖為甲、乙和丙三種酵素在不同 pH 值下活性大小的測試結果，其中 pH 值一格為 1，總共 14 格。下列相關敘述，何者正確？



註:酸(PH＜7)；鹼(PH＞7)
【3-4,98-1 基測改】
(A)甲可以在口腔環境中進行反應，且 pH 值越高，活性越高
(B)乙可以在胃的環境中進行反應，且 pH 值越低，活性越低
(C)丙可以在腸道的環境中進行反應，但其最佳活性約在 10.5
(D)甲、乙、丙酵素的活性與環境因素無關


12.雨彤到朋友家作客，發現對方家裡有一塊原木的桌子，上面有粗細不同的線條（甲為淺色紋，乙為深色紋）。關於甲、乙兩部位的細胞所形成的條件，下列何者**錯誤**？【4-1】



選項	(ㄅ) 形成時間	(ㄆ) 細胞大小	(ㄇ) 生長速度	(ㄈ) 組成
甲線條	較早	較大	較快	木質部細胞
乙線條	較晚	較小	較慢	韌皮部細胞


(A)(ㄅ)　(B)(ㄆ)　(C)(ㄇ)　(D)(ㄈ)

13.將**玉米**的莖直立插於裝有黑色墨水的量筒中，1 小時之後將莖橫切，取一薄片置於顯微鏡下觀察，此時所見的情形，最可能為下列何者？【4-1+活動 4-1】

(A)  (B)  (C)  (D) 

14.取帶有等數量葉片的鴨跖草枝條，放入盛有等量水的 100 mL 量筒中，做下列選項中不同的處理，放置同一實驗室內 4 小時後，哪一個量筒水位最低？【4-2+活動 4-1】
註：鴨跖草的氣孔大多位於葉的下表皮；凡士林是一種油膏。
(A)吹風　(B)葉片上表面塗上凡士林
(C)置於暗處　(D)葉片下表面塗上凡士林


15.設計蒸散作用的實驗如附圖，取同種植物其中一組去除葉片，另一組保留，並調整成相同重量。【4-2+活動 4-1】請問在通風光照的環境中三小時後，實驗結果應該為何？



(A)甲組較輕
(B)乙組較輕
(C)維持等重
(D)無法預測

16.關於心臟的敘述，下列何者正確？【4-3】
(A)通常位於胸腔中央偏右
(B)內部有兩個腔室
(C)上為心室，下為心房
(D)心房接靜脈，心室接動脈

17.附圖為妍芯在複式顯微鏡下，觀察動物血液流動方向所繪，甲、乙、丙是三種不同血管，請根據圖判斷「甲」應為下列何者？【4-3】



(A)動脈　(B)靜脈　(C)微血管　(D)淋巴管


18.人體的血液循環中，哪些部位會具**有瓣膜**？
(甲)大靜脈、(乙)動脈、(丙)微血管、(丁)心房與心室間、(戊)心室與動脈間、(己)心房與靜脈間【4-3】
(A)甲丁戊　(B)乙丁己　(C)甲丙丁己　(D)乙丙丁戊

19.已知血管內的血液是由壓力高往壓力低的方向流動。附表為同一器官中甲、乙、丙、丁四種血管及其內的壓力值，若這些血管包含:**小動脈**、**較大的靜脈**、**小靜脈**和**微血管**，則下列**血管代號**與**血管**的配對，何者正確？

血管代號	血管內的壓力值（mmHg）
甲	60
乙	20
丙	10
丁	5


(A)甲──較大的靜脈　(B)乙──小動脈
(C)丙──小靜脈　(D)丁──微血管【4-3,100.基測I改】

20.如圖為人體循環系統圖，試問下列敘述何者**錯誤**？【4-4】
(A)a 含充氧血
(B)b 可防止血液倒流
(C)c 的搏動，屬於心搏
(D)d 的管壁由多層細胞組成



21.下列為人體循環系統部位：(甲)心臟；(乙)肺靜脈；(丙)下大靜脈；(丁)肺動脈；(戊)主動脈；(己)腦部動脈。詠絜喝了含咖啡因的提神飲料，若咖啡因被小腸吸收，到腦部時發生作用。請問其血液流動次序排列應為何？【4-4】
(A)戊→甲→乙→丁→甲→丙→己
(B)丁→甲→丙→乙→戊→己→甲
(C)丙→甲→丁→乙→甲→戊→己
(D)甲→丙→丁→乙→甲→己→戊

22.如圖表示某人體消化道中的微小構造剖面圖，**甲、乙的箭頭**分別對應**進入**和**離開**此微小構造的血管內的**血流方向**。關於**甲、乙兩箭頭**所**對應的血管**之比較，下列何者正確？【4-4】
(A)氧氣濃度：甲＜乙
(B)二氧化碳濃度：甲＞乙
(C)養分濃度：甲＞乙
(D)廢物濃度：甲＜乙



二、綜合題組

✱好奇的凱爾想要了解更多不同的酵素，於是他在網路上找到了一種叫做溶菌酶的酵素，該酵素出現在人體的唾液、眼淚、鼻涕等處，可藉由將細菌細胞壁中的肽聚醣分解而達到殺菌的作用。請回答 23~25 題：【3-2+3-4】

23.凱爾很好奇人體中溶菌酶的各種性質，以下是他找到的資料，已知溶菌酶的基本性質與一般的酵素無異，請依所學知識推論，下列資訊何者**錯誤**？
(A)人體製造的溶菌酶的活性最佳溫度約在 37℃左右
(B)人體中的溶菌酶即使離開體外，也能繼續反應
(C)人體中的溶菌酶會分解人體皮膚的細胞壁,皮膚會刺痛
(D)溶菌酶對肽聚醣具有專一性

24.凱爾發現資料中還提到溶菌酶也可以做為抗生素來使用，常用於治療喉嚨發炎、呼吸道感染、緩解眼部發炎及皮膚的輕度感染，如果凱爾想要利用溶菌酶治療腸道的細菌感染，已知溶菌酶的酵素活性 pH 值大約介於 5~6.5(偏酸性)，但在經過胃部的時候容易受胃酸影響而失去活性，同時假設溶菌酶不會受消化液影響。以下是凱爾在詢問 AI 後，AI 給出的幾個建議，請判斷用下列何者製作藥錠最合理？

	包裹藥錠的物質	必需添加物
(A)	不須包裹	無須添加物
(B)	包裹抗酸性(但遇到鹼性環境就融化)的化合物	添加酸性物質與溶菌酶做成膠囊→在腸胃道以最佳活性反應
(C)	包裹鹼性物質→抵抗胃酸的侵蝕	添加維生素 →幫助溶菌酶補充進行反應時消耗的能量
(D)	包裹脂質→抵抗胃酸的侵蝕	添加大量溶菌酶 →因為溶菌酶會在與肽聚醣的反應中被消耗

25.承上題，凱爾的室友提米，他的鞋子總是在夏天發出一股異味，經過凱爾檢查，這股異味來自於細菌，於是凱爾買了 3 雙一樣的新鞋，使用以下殺菌方式處理鞋子：

	殺菌方式	處理後，鞋子的狀態
第一雙：	穿一整天後，噴溶菌酶噴液	有明顯臭味，細菌殘留多
第二雙：	穿一整天後，噴 75%藥用酒精	無細菌殘留
第三雙：	直接用沐浴乳洗腳後，穿一整天	無臭味，細菌殘留較少

於是凱爾對此提出了幾個假設，試問下列推測何者**最不合理**？(**已知:**鞋子噴完溶菌酶噴液及藥用酒精後皆放於 20℃的冷氣房內，該溶菌酶來源於人體。)
(A)鞋子上殘留成分複雜(如:汗水或油脂)，影響酵素運作
(B)溶菌酶噴液原本就無殺菌效果
(C)洗腳後，腳上殘留的沐浴乳成分，有抗菌效果
(D)房間冷氣溫度過低，並非酵素的最佳活性溫度

✱伊森想了解酵素的特性，以下是伊森所準備的實驗器材與處理情形：(**已知:**澱粉酶均來自於人體，最佳活性溫度為 37℃，各試管的**反應時間**皆為 **20 分鐘**)

試管	酵素的處理	反應物	反應溫度
甲	在沸水中持續加熱 30 分鐘	X 物質+澱粉酶	37℃
乙	無加熱	葡萄糖+澱粉酶	37℃
丙	在沸水中持續加熱 30 分鐘	Y 物質+澱粉酶	4℃
丁	無加熱	米飯汁+澱粉酶	37℃


請依資料，回答 26~28 題：【3-2+活動 3-2】

26.伊森將本氏液加入甲試管隔水加熱後，發現甲試管變色了，為甚麼？
(A)因為澱粉酶經過長時間的 100℃高溫，仍可與受質反應
(B)37℃能夠讓酵素回到原狀，與受質反應
(C)X 物質可能含有葡萄糖，能夠與本氏液反應
(D)長時間的 100℃高溫，能將酵素分解成葡萄糖

27.如果伊森想要了解**酵素的專一性**。他要將本氏液加入哪兩根試管後，隔水加熱，以做為**實驗組**與**對照組**？
(A)甲乙
(B)甲丁
(C)乙丙
(D)乙丁

28.伊森想要讓反應後的丙試管加入本氏液並隔水加熱後，有機會變到橘紅色,下列在實驗步驟上的調整,何者**較不合理**？
(A)讓丙試管反應完後，改加入碘液即可
(B)丙試管的酵素在反應前，不能被加熱
(C)Y 物質要含有足量的澱粉
(D)丙試管的反應溫度從 4℃提高到 37℃

✱附圖是葉子的構造圖，試著回答 29~30 題：【3-3、活動 3-3】




29.當威廉取下經由七天充分光照的葉子，在顯微鏡下觀察葉子的構造。請問下列代號及其對應的構造，與光合作用關係的描述，何者正確？
(A)丁為氣孔，光合作用的主要產物會從此溢出
(B)甲為葉肉組織，是光合作用的主要場所
(C)戊為保衛細胞，無葉綠體，能行光合作用
(D)乙是表皮細胞，能運輸光合作用的產物

30.威廉想進一步檢測澱粉與光照的關係，於是進行了「光與光合作用」的實驗，他設計了以下實驗步驟:
(甲)滴入碘液；(乙)放入酒精隔水加熱；(丙)放入熱水中漂洗；(丁)加入本氏液；(戊)放到熱水中煮數分鐘；
(己) 放入 37°C 的恆溫槽 10 分鐘
請問操作步驟的順序，何者正確？
(A)丁己丙甲乙
(B)甲己乙丙
(C)戊乙丙甲
(D)丙丁乙甲己

✱貝瑞是個早午晚都只吃牛奶花生的國中生，已知牛奶花生的主要成分為:調味牛奶(含有水分、香料、奶精以及葡萄糖)、花生(含有蛋白質以及脂質及少量醣類)。但是貝瑞最近在網路上看到各個營養素如果攝取過多或過少，身體會有不同的疾病及影響
醣類:攝取過多可能產生過度的飽足感，影響身體對於各個營養素的攝取標準，長期如此，恐導致營養缺乏、發育障礙、肥胖等疾病，更有可能導致多種慢性疾病，如糖尿病及各種心血管疾病
蛋白質:攝取過多肉類等高蛋白食物，可能導致身體產生大量的代謝廢物，超過器官負擔，出現頭暈、噁心、腹脹、心悸等症狀，甚至有死亡的風險。
脂質:攝取過多恐導致血壓上升，增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的風險。請回答 31~33 題：【3-4】


31.當貝瑞吃下牛奶花生並進行消化，試問以下消化器官所對應進行的反應何者正確？
(A)當牛奶進入口中，口內唾液澱粉酶會對葡萄糖進行分解
(B)當花生進到消化道中，只受小腸腸液分解消化
(C)牛奶中的大量水分會被胃給吸收
(D)花生中的脂質會先被膽汁乳化，後被胰臟分泌到小腸的酵素給分解

32.附圖為人體器官圖以及對應代號，牛奶花生進入消化系統後，經過的消化道依序為何？
(A)甲→壬→辛→己→戊
(B)辛→丁→己→庚→乙
(C)丙→甲→己→壬→丁
(D)辛→丁→乙→壬→丙



33.父母針對貝瑞的飲食習慣提出了幾個看法，請問下列何者較合理？
(A)減少飲用牛奶花生，多吃水果補充微量元素，並均衡攝取各營養素
(B)不須改變飲食，過多糖分對身體無害，可作為能量來源
(C)減少飲用牛奶花生，但因其含鈣,可只靠它補充微量元素
(D)不須改變飲食，牛奶花生含所有需要的營養，可大量飲用作為主食。

✱附圖為植物莖的切面示意圖，如圖所示，並以甲、乙、丙及丁分別標示不同的構造。請參照附圖後，回答 34~37 題：【4-1,111 年會考改】



34.根據附圖，此植物通常大約幾歲？
(A)不到 1 歲 (B)約 3 歲 (C)約 4 歲 (D)約 5 歲

35.此植物的「樹皮」，應包含下列何者？
(A)僅甲 (B)甲+乙 (C)甲+丁 (D)甲+乙+丁

36.此植物將來形成的「木材」，是由哪個部位累積組成的？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

37.水稻之所以不能像此植物，將來能形成「木材」，是因為缺乏哪個部位的緣故？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁


✱請在閱讀下列敘述後，回答下列 38~39 題：
嫣諮與心羽同學在學校進行植物體內水分運輸的實驗，老師請同學到校園中採集不同植物進行試驗。老師要求兩位同學需採集**同種、大小相似的兩段植株**，然後依照課本的實驗步驟，**各摘去其中一株的所有葉片後**，將兩株分別放入量筒中，觀察水分蒸散的情形。嫣諮與心羽中的一位同學的植株們放在密閉的實驗室內，另一位放在通風晴朗的室外，觀察到的數據如下：

		實驗開始	10 分鐘	20 分鐘	30 分鐘	40 分鐘
嫣諮	甲（mL）	10mL	9.95mL	9.93mL	9.9mL	9.87mL
	乙（mL）	10mL	10mL	10mL	9.98mL	9.97mL
心羽	丙（mL）	10mL	9mL	8.1mL	6.9mL	5.5mL
	丁（mL）	10mL	9.90mL	9.71mL	9.62mL	9.53mL

根據兩人的實驗結果，請回答 35~36 題：【4-2+4-1 活動】

38.請由數據判斷，是哪兩棵植株剝除所有葉片？
(A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丁 (D)丙丁

39.哪兩棵植株是放在通風晴朗的室外？
(A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丁 (D)丙丁



✱如圖是人類血球模式圖，請根據所學，回答 40~41 題：

40.當加恩打球腿部受傷，流血的傷口，不久後就凝固，此為她體內的哪一種細胞發揮功能？【4-3】
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)甲、丙

41.丙細胞的主要生理功能為何？
(A)促進血液凝固 (B)抵抗病菌 (C)運輸 CO_2 (D)運輸氧氣

✱請閱讀下列敘述後，回答 42~43 題：【4-3】

七年級女生姝墀收到新生健康檢查報告單，其中血液檢驗部分結果如表所示。(單位符號：K／μL =千個／10^{-6} 公升；M／μL =百萬個／10^{-6} 公升)

檢驗名稱	正常值	檢驗結果
白血球（WBC）	7.5±3.5 K／μL	13.8 K／μL
紅血球數目（RBC）	女性 4.6±0.9 M／uL	4.7 M／uL
血小板（Platelet）	220 ± 100 K／μL	90 K／μL

42.依婓墀的血小板數目判斷，她可能會有下列哪一種症狀？
(A)容易血流不止，無法癒合傷口
(B)微血管易因膽固醇過高而阻塞
(C)抵抗疾病能力減弱，導致常常感冒
(D)攜帶氧氣能力降低，導致容易暈眩

43.在這份報告中，依據白血球數量來判斷，婓墀目前可能還需再做哪一種檢查？
(A)是否容易暈眩　(B)是否正受病原體侵襲感染
(C)是否功課壓力太大　(D)是否缺乏維生素

三、閱讀題組(請詳閱短文及附圖後,回答該題組各題)

住滿人體腸道的微生物們


人體腸道住滿無比巨量的微生物，包括細菌、病毒、黴菌、原蟲、寄生蟲。單就細菌而言，數目就高達百兆以上，種類千百種，重量達 1 公斤之上，細菌的代謝副產物還提供人體 10%熱能來源。腸道細菌對人而言，可分為好菌(益菌、共生菌)，占 10～20%。壞菌(害菌、致病菌)占 20%。以及中性菌(伺機菌、條件致病菌)占 60～70%。中性菌平時不好不壞，但會伺機變好變壞，端視何者佔優勢而靠攏。腸道菌依其停留生長在腸道的時間，分為長住(永久居留)及過客(外來)菌，過客菌停留數天即排出體外。

好菌如乳酸桿菌（Lactobacillus）能幫助代謝糖類，其分泌的乳酸也能使腸道形成有利於好菌生長的弱酸性環境，從而促進腸道菌叢平衡，強化消化功能；布拉氏酵母菌(Saccharomyces boulardii)能增加乳糖酶、蔗糖酶等雙糖酶的產量調節腸道菌群的作用，對乳酸桿菌、雙歧桿菌有促進增殖的作用，而對大腸桿菌、沙門氏菌等致病菌有抑制生長的作用。

壞菌如金黃色葡萄球菌，中毒症狀為主要症狀為嘔吐、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫、輕微發燒；病原性大腸桿菌主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒；霍亂弧菌會引起名為霍亂的急性腸道傳染病，可造成輕度或中度腹瀉，如果不及時治療，可能會迅速導致嚴重脫水、休克甚至死亡。

中性菌如非病原性大腸桿菌，大部分的大腸桿菌皆為非病原性，能合成人體所需及有益的維生素 B 和 K。

而在我們體內則有個常被人們忽略，並且常被認為毫無用處的構造 —**闌尾**，當遭遇腸道被清空的情況如服用抗生素、腹瀉，**闌尾**能夠作為這些益生菌的暫時儲存所，當身體恢復正常後，重新讓益生菌快速充滿於腸道，而且腸道微生物組的組成可能會在短期內或長期發生變化，**闌尾**亦有助於維持腸道微生物群的正常生長及穩定平衡。【3-4】



44.根據文章，下列對於「腸胃道及共生菌」的敘述何者正確？
(A)腸胃道中的細菌並不會對人體做出任何有益的貢獻
(B)大腸桿菌只會造成腹痛及噁心，對人體有害
(C)乳酸桿菌能強化人體的消化功能
(D)壞菌的占比不高，並不會影響人體

45.下列哪一項最符合文中關於腸道中「中性菌」的特性？
(A)數量最少，只會在腸道中短暫停留
(B)平時不會造成疾病，但在環境改變時可能變成好菌或壞菌
(C)一定會引起腸道疾病，例如腹瀉或發燒
(D)會分泌乳酸，使腸道形成弱酸性環境

46.根據本文，下列哪一項最能正確描述「人類的闌尾」？
(A)闌尾是沒有功能的退化器官，存在與否都不影響健康
(B)闌尾主要用來幫助分解食物中的纖維
(C)闌尾能暫存好菌，協助腸道在受破壞後快速恢復菌叢平衡
(D)闌尾會製造壞菌，幫助身體排除外來細菌

卵磷脂是血管清道夫

卵磷脂是人體不可或缺的重要營養素，存在於全身上下每顆細胞，是組成細胞膜的主要成分。營養師指出，卵磷脂堪稱專業的「血管清道夫」，能帶走囤積在血管和肝臟的脂肪，從而達到降低膽固醇的效果。至於食物來源，主要是大豆、蛋黃、動物肝臟，但爲了避免吃進更多脂肪膽固醇，選擇大豆尤佳。

卵磷脂是多功能的營養素，平常是細胞的守門員，負責鞏固細胞膜；又當神經系統的郵差，全身跑透透；還兼差做司機，參與膽固醇的運送；更是專業血管清道夫，去油功力一級棒。

營養師進一步說明，卵磷脂能協助血管壁上的脂肪乳化、分解，帶走囤積在血管和肝臟的脂肪；還可以抑制膽固醇吸收，促進體內膽固醇轉變成膽酸，加速膽固醇的代謝，進而降低血中總膽固醇，畢竟高膽固醇患者嚴重時，還會引發心肌梗塞！

營養師提到，曾有研究給高膽固醇患者每天服用 500 毫克大豆卵磷脂，1 個月後，總膽固醇降低了 40.66%，低密度膽固醇（LDL）降低了 42.05%，第 2 個月甚至降了 56.15%。

談及卵磷脂的食物來源，營養師說，主要是大豆、蛋黃、動物肝臟，但爲了避免吃進更多脂肪膽固醇，較推薦大豆來源的卵磷脂。並提醒，卵磷脂大約占大豆的 1～2%，要攝取 500 毫克卵磷脂大約要喝 500 毫升豆漿；另外，市面上也有大豆卵磷脂營養品，可自行選擇天然來源補充。【2-3+3-3+4-2】

47.關於文章所提及的「卵磷脂」的敘述，下列何者正確？
(A)是細胞質的主要成分
(B)是一種礦物質
(C)推薦從動物肝臟攝取
(D)喝 100 毫升的豆漿，約可吸收 100 毫克卵磷脂

48.文章提及「卵磷脂」的功能，下列何者**錯誤**？
(A)鞏固細胞質
(B)抑制膽固醇吸收
(C)參與膽固醇的運送
(D)能帶走囤積在血管和肝臟的脂肪

49.由文章可知，下列哪些人較需要多補充「卵磷脂」？
(甲)血壓高的人、(乙)膽固醇過高的人、(丙)得流感的人、(丁)發生過心肌梗塞的人
(A)甲乙
(B)甲丙
(C)甲乙丁
(D)乙丙丁

50.棠暄喝了豆漿之後，其中的卵磷脂被消化分解後，是由棠暄的何處吸收？又是由血液中的何部分運送？
(A)小腸的絨毛吸收，紅血球運送
(B)小腸的絨毛吸收，血漿運送
(C)大腸的絨毛吸收，紅血球運送
(D)大腸的絨毛吸收，血漿運送

試題結束，請詳細檢查。

新北市立永和國民中學 114 學年度第一學期 第二段定期評量 七年級生物科試題卷 解答

1. D	11. C	21. C	31. D	41. B
2. C	12. D	22. D	32. A	42. A
3. B	13. A	23. C	33. A	43. B
4. A	14. A	24. B	34. A	44. C
5. A	15. A	25. B	35. C	45. B
6. B	16. D	26. C	36. C	46. C
7. D	17. B	27. D	37. B	47. D
8. D	18. A	28. A	38. C	48. A
9. A	19. C	29. B	39. D	49. C
10. D	20. D	30. C	40. B	50. B

	A	B	C	D
題數	13	12	13	12