

Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

ИТМО

Студент Гребцов Александр Андреевич Преподаватель Ракшин Егор Александрович

Группа R4150 Отчет принят _____

Отчет по практической работе №1

Оглавление

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	3
1. Дифференциальное уравнение	3
2. Метод Эйлера и Рунге-Кутты.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

$$a = 6.26, \quad b = 9.7, \quad 2c = 5.4, \quad d = 4.17$$

1. Дифференциальное уравнение

$$a \cdot \ddot{x} + b \cdot \dot{x} + c \cdot x = d$$

$$6.26\ddot{x} + 9.72\dot{x} + 5.4x = 4.17$$

Найдем корни характеристического уравнения

$$6.26\ddot{x} + 9.72\dot{x} + 5.4x = 0$$

$$\ddot{x} + 1.552\dot{x} + 0.863x = 0$$

$$\lambda^2 + 1.552\lambda + 0.863 = 0$$

$$\lambda = \frac{-1.552 \pm \sqrt{-1.043}}{2} = -0.776 \pm 0.511i$$

Система является устойчивой, так как отрицательная действительная часть комплексных корней приводит к затухающим колебаниям.

Общее решение однородного уравнения

$$x_0(t) = e^{-0.776t}(C_1 \cos(0.511t) + C_2 \sin(0.511t))$$

Частное решение

$$cx_c = d$$

$$x_c = \frac{d}{c} = \frac{4.17}{5.4} = 0.772$$

Общее решение

$$x(t) = e^{-0.776t}(C_1 \cos(0.511t) + C_2 \sin(0.511t)) + 0.772$$

Начальные условия

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad t = 0$$

$$0 = C_1 + 0.772$$

$$C_1 = -0.772$$

$$0 = -0.776C_1 + 0.511C_2$$

$$C_2 = -1.171$$

Аналитическое решение

$$x(t) = e^{-0.776t}(-0.772 \cos(0.511t) - 1.171 \sin(0.511t)) + 0.772$$

2. Метод Эйлера и Рунге-Кутты

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  a = 6.26
5  b = 9.72
6  c = 5.4
7  d = 4.17
8
9  def linear(x):
10     x1, x2 = x
11     x1_dot = x2
12     x2_dot = (d - b*x2 - c*x1) / a
13     return np.array([x1_dot, x2_dot])
14
15  def forward_euler(fun, x0, Tf, h):
16     t = np.arange(0, Tf + h, h)
17     x_hist = np.zeros((len(x0), len(t)))
18     x_hist[:, 0] = x0
19     for k in range(len(t) - 1):
20         x_hist[:, k + 1] = x_hist[:, k] + h * fun(x_hist[:, k])
21     return x_hist, t
22
23  def backward_euler(fun, x0, Tf, h, tol=1e-8, max_iter=100):
24     t = np.arange(0, Tf + h, h)
25     x_hist = np.zeros((len(x0), len(t)))
26     x_hist[:, 0] = x0
27     for k in range(len(t) - 1):
28         x_hist[:, k + 1] = x_hist[:, k]
29         for i in range(max_iter):
30             x_next = x_hist[:, k] + h * fun(x_hist[:, k + 1])
31             error = np.linalg.norm(x_next - x_hist[:, k + 1])
32             x_hist[:, k + 1] = x_next
33             if error < tol:
34                 break
35     return x_hist, t
36
37  def runge_kutta4(fun, x0, Tf, h):
38     t = np.arange(0, Tf + h, h)
39     x_hist = np.zeros((len(x0), len(t)))
40     x_hist[:, 0] = x0
41     for k in range(len(t) - 1):
42         k1 = fun(x_hist[:, k])
43         k2 = fun(x_hist[:, k] + 0.5 * h * k1)
44         k3 = fun(x_hist[:, k] + 0.5 * h * k2)
45         k4 = fun(x_hist[:, k] + h * k3)
46         x_hist[:, k + 1] = x_hist[:, k] + (h / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
47     return x_hist, t
48
49  C1 = -0.772
50  C2 = -1.171
51  l1 = -0.776
52  l2 = 0.511
53  xp = 0.772
54
55  def equation(t):
56     return np.exp(l1 * t) * (C1 * np.cos(l2 * t) + C2 * np.sin(l2 * t)) + xp
57
58  x0 = np.array([0.0, 0.0])
59  Tf = 10
60  h = 0.1
61
62  x_fe, t_fe = forward_euler(linear, x0, Tf, h)
63  x_be, t_be = backward_euler(linear, x0, Tf, h)
64  x_rk4, t_rk4 = runge_kutta4(linear, x0, Tf, h)
65
```

```

66 x_an = equation(t_fe)
67
68 plt.figure(figsize=(24, 8))
69
70 plt.subplot(1, 3, 1)
71 plt.plot(t_fe, x_an, 'k', lw=2, label='Analytic')
72 plt.plot(t_fe, x_fe[0, :], '--', label='Forward Euler')
73 plt.plot(t_be, x_be[0, :], ':', label='Backward Euler')
74 plt.plot(t_rk4, x_rk4[0, :], '-.', label='RK4')
75 plt.xlabel('Time, t')
76 plt.ylabel('x(t)')
77 plt.title('x(t) vs Time')
78 plt.legend()
79 plt.grid(True)
80
81 plt.tight_layout()
82 plt.show()
83

```

График




Рисунок 1. График $x(t)$ для аналитического решения и численных методов: Forward Euler, Backward Euler, метода Рунге-Кутты 4-го порядка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы было произведено сравнение численных методов интегрирования линейного дифференциального уравнения второго порядка - Forward Euler, Backward Euler, метода Рунге-Кутты 4-го порядка. Также построено аналитическое решение.

Был построен график, на основе которого была подтверждена устойчивость системы. Было определено, что метод Рунге-Кутты достаточно точно совпадает с аналитическим решением, в то время как метод Forward Euler имеет расхождение с аналитическим решением, также чуть в меньшей степени расхождение имеет Backward Euler.