

# Migren Botoksu Nedir? Kimlere Uygulanır ve Etkisi Ne Kadar Sürer?

Migren botoksu, kronik migren hastalarında baş ağrısı sıklığını ve şiddetini azaltmak amacıyla uygulanan modern bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde Botulinum Toxin Type A adlı ilaç, baş ve boyun çevresindeki belirli kaslara küçük dozlarda enjekte edilir.

Migren botoksu özellikle kronik migren tanısı alan hastalarda kullanılan ve bilimsel çalışmalarla etkinliği gösterilmiş bir tedavi seçeneğidir.

Uygulama genellikle PREEMPT protokolüne göre yapılır. Bu protokole göre:

- Toplam yaklaşık 155 ünite botulinum toksini
- 31 enjeksiyon noktası
- Baş ve boyun bölgesine uygulanır
- Tedavi 12 haftada bir tekrarlanır.

## Migren Botoksu Kimlere Uygulanır?

Migren botoksu genellikle aşağıdaki durumlarda önerilir:

- Ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı yaşayan kişiler
- Migren atakları günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen hastalar
- Migren ilaçlarından yeterli fayda görmeyen kişiler
- Kronik migren tanısı alan hastalar

Doğru hasta seçimi tedavinin başarısı açısından oldukça önemlidir.

## Migren Botoksu Nasıl Uygulanır?

Migren botoksu işlemi sırasında botulinum toksini baş ve boyunda yaklaşık 30–40 farklı noktaya ince iğnelerle uygulanır.

Enjeksiyon yapılan başlıca bölgeler:

- Alın
- Şakak
- Başın arka kısmı

- Boyun
- Omuz üstü kasları

İşlem genellikle 10–15 dakika içinde tamamlanır ve hasta aynı gün normal yaşamına dönebilir.

## Migren Botoksunun Etkisi Ne Zaman Başlar?

Migren botoksunun etkisi genellikle kısa süre içinde ortaya çıkar.

- Etki genellikle 7–14 gün içinde başlar
- Maksimum etki 3–4 hafta içinde görülür
- Etkisi ortalama 3–4 ay devam eder

Bu nedenle tedavi çoğunlukla yılda 3–4 kez tekrarlanır.

Doğru uygulandığında migren botoksu migren ataklarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltabilir.

## Migren Botoksunun Olası Yan Etkileri

Migren botoksu genellikle güvenli bir tedavidir. Ancak bazı hafif yan etkiler görülebilir:

- Enjeksiyon yerinde hafif ağrı veya morarma
- Boyun ağrısı
- Geçici baş ağrısı
- Nadiren göz kapağında düşüklük

Bu yan etkiler genellikle geçici ve hafiftir.

## Migren Botoksu Kimlere Yapılmaz?

Migren botoksu bazı durumlarda önerilmez.

- Hamilelik ve emzirme döneminde
- Nöromüsküler hastalığı olan kişilerde
- Botulinum toksinine alerjisi olan kişilerde

Tedavi öncesinde mutlaka nöroloji uzmanı tarafından değerlendirme yapılmalıdır.

# Migren Botoksu Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Migren botoksu uygulaması genellikle deneyimli bir nöroloji veya baş ağrısı kliniğinde yapılmalıdır.

Tedavi sürecinde:

- PREEMPT protokolüne uygun uygulama yapılmalıdır
- Tedavi yanıtı düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir
- Gerekirse diğer migren tedavileriyle kombine edilebilir

Bu tedavi çoğu zaman ilaç tedavisi ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile birlikte planlanır.

## Nörolojide Botoks Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Botoks çoğu kişi tarafından kozmetik uygulamalarla bilinse de aslında birçok nörolojik hastalığın tedavisinde etkili şekilde kullanılmaktadır.

### 1. Spastisite (Kas Sertliği)

Spastisite, kasların istemsiz şekilde sertleşmesi ve kasılması ile ortaya çıkan bir durumdur.

En sık görüldüğü hastalıklar:

- İnme (felç)
- Multiple Skleroz
- Omurilik yaralanmaları
- Beyin hasarları
- Serebral palsi
- Spastik paraparezi
- Parkinsonizm

Botoks uygulaması spastik kasın içine yapılır ve şu faydaları sağlayabilir:

- Kas kasılmalarını azaltır

- Hareket kabiliyetini artırır
- Ağrıyı azaltır
- Fizik tedavinin etkinliğini artırır

Etkisi genellikle 3–4 ay sürer.

## 2. Distoni (İstemsiz Kas Kasılmaları)

Distoni, belirli kas gruplarında istemsiz ve sürekli kasılmaların görüldüğü bir hareket bozukluğudur.

En sık görülen distoni türleri:

- Servikal distoni (boyun distonisi)
- Blefarospazm (göz kapağı spazmı)
- Hemifasyal spazm
- Yazı yazarken oluşan el kasılmaları

Botoks tedavisi distoni için birinci basamak tedavilerden biri olarak kabul edilir.

## 3. Hipersalivasyon (Aşırı Tükürük Salgısı)

Botoks enjeksiyonu bazı hastalarda aşırı tükürük salgısını azaltmak için kullanılabilir.

Özellikle şu durumlarda uygulanabilir:

- Serebral palsi
- ALS
- Diğer nörolojik hastalıklar

Genellikle parotis ve submandibular tükürük bezlerine uygulanır ve etkisi 3–9 ay sürebilir.

## 4. Aşırı Terleme (Hiperhidrozis)

Botoks, ter bezlerini hedef alarak aşırı terlemeyi azaltabilir.

En sık uygulandığı bölgeler:

- Koltuk altı
- Avuç içi
- Ayak tabanı
- Yüz bölgesi

Etkisi genellikle 6–12 ay sürebilir.

## 5. Bruksizm (Diş Sıkma)

Botoks, çene kaslarına uygulanarak diş sıkma ve çene kaslarının aşırı kasılmasını azaltabilir.

Genellikle şu kaslara uygulanır:

- Masseter kası
- Temporalis kası

Etkisi yaklaşık 3–6 ay sürebilir.

## 6. Tremor (Titreme)

Botoks bazı durumlarda titreme tedavisinde de kullanılabilir.

Özellikle:

- Essential tremor
- İlaçlara dirençli bazı tremor tipleri

tedavisinde destekleyici olarak uygulanabilir.

## 7. Trigeminal Nevralji

Botoks bazı merkezlerde trigeminal nevralji ağrısını azaltmak amacıyla off-label (resmi onay dışı) olarak uygulanabilir.

Genellikle:

- İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda
- Ek ağrı kontrolü amacıyla

denenebilir.

Etkisi genellikle 1–2 hafta içinde başlar ve 3–6 ay sürebilir.

# Migren Botoksu Hakkında Özet

Migren botoksu, özellikle kronik migren hastalarında baş ağrısı sıklığını ve şiddetini azaltabilen etkili bir tedavi yöntemidir.

Doğru hasta seçimi ve deneyimli bir uzman tarafından uygulandığında:

- Migren atakları daha seyrek hale gelebilir

- Ağrı şiddeti azalabilir
- Hastanın yaşam kalitesi belirgin şekilde artabilir