

İnme (Felç) Belirtileri Nelerdir? İlk Saatler Neden Hayati Öneme Sahiptir?

İnme (felç), beynin bir bölgesine giden kan akışının ani şekilde azalması veya tamamen kesilmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir nörolojik acil durumdur. En sık nedeni beyin damar tıkanıklığıdır, daha nadiren beyin kanaması nedeniyle gelişir.

İnme belirtilerini erken fark etmek ve hızlı şekilde tıbbi müdahale etmek, kalıcı beyin hasarını önlemek açısından hayati önem taşır.

İnmenin En Sık Görülen Belirtileri

İnme belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar. En sık görülen belirtiler şunlardır:

1. Yüzde Kayma

Kişi gülmeye çalıştığında yüzünün bir tarafında düşüklük veya kayma fark edilebilir.

2. Kol veya Bacakta Gücsüzlük

Vücudun bir tarafında ani güç kaybı veya uyuşma oluşabilir. Kişi iki kolunu aynı anda kaldırmakta zorlanabilir.

3. Konuşma Bozukluğu

İnme sırasında:

- Konuşma peltekleşebilir
- Kelimeler yanlış söylenebilir
- Kişi konuşulanları anlamakta zorlanabilir

4. Ani Görme Problemleri

Bir veya iki gözde ani görme kaybı veya bulanık görme gelişebilir.

5. Ani Baş Dönmesi ve Denge Kaybı

İnme bazı durumlarda şu belirtilerle ortaya çıkabilir:

- Yürümede zorlanma
- Denge kaybı
- Koordinasyon bozukluğu

6. Şiddetli ve Ani Baş Ağrısı

Özellikle daha önce yaşanmamış çok şiddetli baş ağrısı, beyin kanamasının belirtisi olabilir.

İnmede İlk Saatler Neden Çok Önemlidir?

İnme tedavisinde zaman kritik bir faktördür. Çünkü kan akışı kesilen bölgede beyin hücreleri hızla zarar görür.

Bilimsel çalışmalar tedavi edilmediğinde:

- Her dakikada yaklaşık 1,9 milyon beyin hücresinin kaybedildiğini göstermektedir.

Bu nedenle nörolojide çok bilinen bir ifade vardır:

“Zaman beyindir.”

Ne kadar erken tedavi başlanırsa, beyin hasarı o kadar az olur.

Erken Tedavinin Sağladığı Avantajlar

İnme belirtileri başladıktan sonra hasta ilk saatlerde hastaneye ulaştırılırsa bazı etkili tedaviler uygulanabilir.

1. Damar Açıcı Tedavi (Trombolitik Tedavi)

Bu tedavi yöntemi pıhtıyı eriterek damar içindeki kan akışını yeniden sağlayabilir.

Genellikle:

- İlk 4,5 saat içinde uygulanabilir.

2. Mekanik Trombektomi

Büyük damar tıkanıklıklarında pıhtı özel cihazlarla damar içinden çıkarılabilir.

Bazı hastalarda:

- 6–24 saate kadar uygulanabilir.

Bu Tedavilerin Sağladığı Faydalar

Erken tedavi sayesinde:

- Felç kalıcı olmayabilir
- Engellilik riski azalabilir
- Hastanın tam iyileşme şansı artabilir

İnme Belirtisi Görüldüğünde Ne Yapılmalı?

İnme belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden harekete geçilmelidir.

Yapılması gerekenler:

- Hemen acil yardım çağrılmalı
- Hasta en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalı
- Belirtilerin başlama saati mutlaka not edilmelidir

Belirtilerin geçmesini beklemek hayati risk oluşturabilir.

Beyin Damar Tıkanıklığı Neden Olur?

Beyin damar tıkanıklığının en sık nedenleri şunlardır:

Kalp Kaynaklı Pıhtılar

Bazı kalp hastalıklarında kalpte oluşan pıhtılar beyne giderek damarları tıkayabilir.

Özellikle Atriyal Fibrilasyon önemli bir risk faktörüdür.

Yüksek Tansiyon

Hipertansiyon damar duvarına zarar vererek damar daralmasına ve pıhtı oluşumuna yol açabilir.

Diyabet

Diyabet damar yapısını bozarak damar sertliği (ateroskleroz) riskini artırır.

Yüksek Kolesterol

Kolesterol yüksekliği damar duvarlarında plak oluşumuna neden olabilir.

Boyun Damarı Darlığı

Karotis arter stenozu, beyne giden kan akımını azaltarak inme riskini artırır.

İnme İçin Risk Faktörleri

Aşağıdaki faktörler beyin damar tıkanıklığı riskini önemli ölçüde artırır:

- Sigara kullanımı
- Yüksek tansiyon
- Diyabet
- Yüksek kolesterol
- Obezite
- Hareketsiz yaşam tarzı
- Kalp ritim bozuklukları
- İleri yaş
- Ailede inme öyküsü

Beyin Damar Tıkanıklığından Korunma Yolları

İnme riskini azaltmak büyük ölçüde yaşam tarzı değişiklikleri ile mümkündür.

1. Tansiyon Kontrolü

Hipertansiyonun düzenli takip edilmesi inme riskini önemli ölçüde azaltır.

2. Sağlıklı Beslenme

Sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağlardan zengin bir beslenme damar sağlığını korur.

3. Düzenli Egzersiz

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite önerilir.

4. Sigaranın Bırakılması

Sigara damar yapısını bozarak pıhtı oluşumunu artırır.

5. Kolesterol ve Şeker Kontrolü

Diyabet ve kolesterol yüksekliği düzenli olarak takip edilmelidir.

6. Kalp Hastalıklarının Tedavisi

Özellikle atrial fibrilasyon gibi ritim bozukluklarında pıhtı önleyici tedavi gerekebilir.

Geçici İskemik Atak (TIA) Nedir?

Geçici İskemik Atak (TIA), beynin bir bölümüne giden kan akımının geçici olarak azalması veya kesilmesi sonucu ortaya çıkar.

Genellikle damar içinde oluşan küçük bir pıhtı nedeniyle gelişir.

Pıhtı kısa süre içinde çözülür veya yer değiştirirse belirtiler kısa sürede ortadan kalkabilir.

Ancak TIA:

- Çoğu zaman yaklaşan bir inmenin habercisidir
- Bu nedenle acil tıbbi değerlendirme gerektirir

TIA Belirtileri Nelerdir?

TIA belirtileri çoğu zaman inme belirtilerine çok benzer, ancak geçicidir.

En sık görülen belirtiler:

- Yüzün bir tarafında ani düşme veya uyuşma
- Kol veya bacakta güçsüzlük
- Konuşma bozukluğu
- Ani görme kaybı veya çift görme
- Baş dönmesi ve denge kaybı
- Ani bilinç bulanıklığı

Belirtiler genellikle dakikalar içinde düzelir, ancak risk devam eder.

TIA Neden Ciddiye Alınmalıdır?

TIA geiren kiřilerde:

- İlk 48 saat iinde inme riski olduka yksektir
- İlk 3 ay iinde ciddi inme riski %10–20 civarındadır

Bu nedenle TIA acil bir tıbbi durum olarak deęerlendirilmelidir.

TIA Sonrası Hangi Testler Yapılır?

TIA řphesi olan hastalarda genellikle řu tetkikler yapılır:

- Beyin MR veya BT
- Karotis Doppler ultrason
- Kalp ritim deęerlendirmesi
- Kan testleri

TIA Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavi genellikle ařaęıdaki yntemleri ierir:

- Kan sulandırıcı ilalar
- Kolesterol dřrc tedaviler
- Tansiyon ve řeker kontrol
- Gerekli durumlarda damar aıcı giriřimler