

Myasthenia Gravis Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Myasthenia Gravis, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kasları kontrol eden sinir–kas bağlantılarını hedef aldığı otoimmün bir kas hastalığıdır. Bu durum kasların yeterince güçlü çalışamamasına ve kolay yorulmasına neden olur.

Hastalığın en belirgin özelliği, kas güçsüzlüğünün gün içinde artması ve dinlenince düzelmesidir.

Myasthenia Gravis'te bağışıklık sistemi, kasların çalışmasını sağlayan asetilkolin reseptörlerine karşı antikör üretir. Bu nedenle sinirden kasa gelen uyarı zayıflar ve kaslar yeterince kasılamaz.

Myasthenia Gravis Neden Olur?

Myasthenia Gravis'in kesin nedeni her zaman bilinmeyebilir. Ancak hastalığın gelişiminde bazı faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

En sık nedenler:

- Bağışıklık sisteminin bozulması (otoimmün süreç)
- Timus bezinin büyümesi veya timus tümörü
- Genetik yatkınlık

Timus bezi bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan bir organdır. Myasthenia Gravis hastalarının bir kısmında timus bezinde büyüme veya tümör görülebilir.

Myasthenia Gravis Belirtileri Nelerdir?

Myasthenia Gravis belirtileri genellikle kaslarda kolay yorulma ve güçsüzlük şeklinde ortaya çıkar. Belirtiler gün içinde artabilir.

1. Göz Kaslarında Belirtiler (En Sık Görülen)

Hastalık çoğu zaman göz kaslarını etkileyerek başlar.

En sık görülen göz belirtileri:

- Göz kapağı düşüklüğü (ptozis)
- Çift görme (diplopi)
- Uzun süre bakınca bulanık görme
- Gün içinde göz kapağının giderek daha fazla düşmesi

Hastaların yaklaşık %50–70’inde ilk belirti göz kapağı düşüklüğüdür.

2. Yüz ve Konuşma Kaslarında Güçsüzlük

Bazı hastalarda yüz ve konuşma kasları etkilenebilir.

Belirtiler:

- Konuşurken sesin kısılması
- Sesin burundan gelmesi
- Çiğneme güçlüğü

3. Yutma Problemleri

- Yutarken zorlanma
- Sıvıların burundan gelmesi
- Boğulma hissi

4. Kol ve Bacak Kaslarında Güçsüzlük

- Merdiven çıkarken zorlanma
- Kolları kaldırmakta güçlük
- Gün sonunda artan kas yorgunluğu

Myasthenia Gravis’te Kas Güçsüzlüğü Neden Artar?

Myasthenia Gravis’te kaslar kullanıldıkça daha hızlı yorulur.

Kas güçsüzlüğünü artırabilen durumlar:

Kasların sürekli kullanılması

- Konuşma
- Çiğneme
- Merdiven çıkma

Günün ilerleyen saatleri

Sabah saatlerinde daha iyi olan kas gücü akşam saatlerinde belirgin şekilde azalabilir.

Enfeksiyonlar

Grip veya diğerk enfeksiyonlar kas güçsüzlüğünü artırabilir.

Bazı ilaçlar

Bazı ilaçlar Myasthenia belirtilerinin artmasına neden olabilir.

Myasthenia Gravis Tanısı Nasıl Konur?

Myasthenia Gravis tanısı için çeşitli testler kullanılabilir.

Tanı sürecinde genellikle şu yöntemler uygulanır:

- Kan testleri (antikör testleri)
- EMG (Elektromiyografi)
- Nörolojik muayene
- Gerekirse görüntüleme testleri

Bu deęerlendirmeler birlikte yapılarak tanı konur.

Myasthenia Gravis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Myasthenia Gravis tedavisi hastalığın şiddetine, antikör tipine, yaşa ve eşlik eden hastalıklara göre planlanır.

Tedavi genellikle dört ana başlıkta incelenir:

1. Semptomları azaltmaya yönelik tedaviler
2. Bağışıklık sistemini baskılayan tedaviler
3. Cerrahi tedavi
4. Akut durum tedavileri ve yeni biyolojik tedaviler

1. Semptomları Azaltmaya Yönelik Tedaviler

Bu tedaviler sinir ile kas arasındaki iletişimi güçlendirerek kasların daha iyi çalışmasını sağlar.

Faydaları:

- Kas güçsüzlüğünü azaltabilir

- Göz kapağı düşüklüğü ve çift görmede iyileşme sağlayabilir

Ancak bu tedaviler hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz, sadece belirtilerin kontrol edilmesine yardımcı olur.

2. Bağışıklık Sistemini Baskılayan Tedaviler

Myasthenia Gravis otoimmün bir hastalık olduğu için bazı tedaviler bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini azaltmayı amaçlar.

Bu tedaviler:

- Antikor üretimini azaltabilir
- Kas gücünde belirgin iyileşme sağlayabilir

Uzun süreli kullanımda bazı yan etkiler görülebileceği için doktor kontrolünde uygulanmalıdır.

3. Cerrahi Tedavi (Timektomi)

Timektomi, timus bezinin çıkarılması ameliyatıdır.

Kimlerde uygulanabilir?

- Timus bezinde tümör bulunan hastalarda
- Bazı antikor pozitif Myasthenia Gravis hastalarında

Bazı hastalarda bu ameliyat:

- Hastalığın tamamen düzelmesine
- İlaç ihtiyacının azalmasına

yardımcı olabilir.

4. Akut Durum Tedavileri

Şiddetli solunum kası zayıflığı gelişirse myastenik kriz ortaya çıkabilir.

Bu durumda hastanede uygulanabilen tedaviler:

- Bağışıklık sistemini hızlı şekilde düzenleyen tedaviler

- Kandaki zararlı antikörlerin temizlenmesini sağlayan yöntemler

Bu tedaviler hızlı etki gösterir ve kriz durumlarında kullanılır.

5. Güncel ve Yeni Tedaviler

Son yıllarda Myasthenia Gravis tedavisinde hedefe yönelik biyolojik tedaviler geliştirilmiştir.

Bu tedaviler:

- Hastalığa neden olan zararlı antikörleri azaltmayı hedefler
- Özellikle dirençli Myasthenia Gravis hastalarında etkili olabilir.

Myasthenia Gravis Tedavi ile Kontrol Edilebilir mi?

Günümüzde:

- Çoğu hastada belirtiler kontrol altına alınabilir
- Birçok hasta normal veya normale yakın yaşam süresi yaşayabilir

Erken tanı ve doğru tedavi, hastalığın gidişini önemli ölçüde iyileştirir.