

Baş Dönmesi (Vertigo) Neden Olur? Ne Zaman Ciddiye Alınmalı?

Baş dönmesi (vertigo), kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesiyle ortaya çıkan yaygın bir şikâyettir. Baş dönmesi çoğu zaman ciddi bir hastalığın belirtisi olmayabilir. Ancak bazı durumlarda iç kulak hastalıkları, dolaşım problemleri veya nörolojik hastalıklar gibi önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Bu nedenle baş dönmesinin nedenlerini ve hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini bilmek önemlidir.

Baş Dönmesi (Vertigo) Neden Olur?

Baş dönmesi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. En sık görülen nedenler aşağıdaki gruplarda incelenebilir.

1. İç Kulak Problemleri

Denge sisteminin büyük bir bölümü iç kulakta bulunduğu için iç kulak hastalıkları baş dönmesinin en yaygın nedenlerinden biridir.

En sık görülen iç kulak hastalıkları:

Benign Paroksizmal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

- Baş hareketleriyle ortaya çıkan kısa süreli ama şiddetli baş dönmesi
- Özellikle yatakta dönme veya başı kaldırma sırasında ortaya çıkabilir

Meniere Hastalığı

- Baş dönmesi atakları
- Kulakta dolgunluk hissi
- İşitme kaybı ve çınlama

Vestibüler Nörit

- Ani başlayan vertigo
- Saatler veya günler sürebilen baş dönmesi
- Genellikle viral enfeksiyon sonrası gelişebilir

2. Dolařım Problemleri

Beyne giden kan akımının azalması da bař d nmesine neden olabilir.

Bařlıca dolařım nedenleri:

- D ř k tansiyon
- Ani ayaęa kalkma (ortostatik hipotansiyon)
- Kalp ritim bozuklukları

3. N rolojik Hastalıklar

Bazı n rolojik hastalıklar da bař d nmesine yol a abilir.

 rneęin:

- Migren ( zellikle vestib ler migren)
- Multipl Skleroz
- Beyin t m r  (nadiren)

4. Metabolik ve Sistemik Nedenler

Bař d nmesi bazı metabolik veya sistemik hastalıklarla da iliřkili olabilir.

Bunlar arasında:

- Kansızlık (anemi)
- D ř k kan řekeri
- Susuz kalma
- Bazı ila ların yan etkileri

5. Psikolojik Nedenler

Psikolojik durumlar da bař d nmesi hissine yol a abilir.

 rneęin:

- Anksiyete
- Panik atak
- Yoęun stres

Baş Dönmesi Hangi Durumlarda Ciddiye Alınmalı?

Bazı durumlarda baş dönmesi ciddi bir nörolojik hastalığın belirtisi olabilir. Aşağıdaki belirtiler baş dönmesiyle birlikte görülüyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır:

- Konuşma bozukluğu
- Kol veya bacakta güçsüzlük
- Çift görme veya görme kaybı
- Yürüme bozukluğu
- Şiddetli baş ağrısı ile birlikte baş dönmesi
- Bayılma veya bilinç kaybı

Bu belirtiler inme (felç) gibi acil durumların habercisi olabilir.

Ani Baş Dönmesi ve Denge Kaybı: Ne Zaman Acile Gidilmeli?

Ani başlayan baş dönmesi çoğu zaman iç kulak problemlerinden kaynaklansa da bazı durumlarda acil tıbbi değerlendirme gerektirebilir.

Aşağıdaki durumlar varsa acil servise başvurulması önerilir.

Konuşma Bozukluğu veya Yüzde Kayma

Baş dönmesi ile birlikte konuşma bozukluğu veya yüzün bir tarafında kayma olması inme belirtisi olabilir.

Kol veya Bacakta Güçsüzlük

Vücudun bir tarafında güç kaybı olması beyin damar tıkanıklığını düşündürebilir.

Şiddetli ve Ani Baş Ağrısı

“Hayatımın en şiddetli baş ağrısı” şeklinde tarif edilen ağrı beyin kanaması belirtisi olabilir.

Yürüme ve Ayakta Duramama

Kişi destek olmadan yürüyemiyorsa veya sürekli düşecek gibi hissediyorsa beyincik veya beyin sapı problemleri olabilir.

Çift Görme veya Görme Kaybı

Yeni başlayan görme problemleri ciddi bir nörolojik hastalığın belirtisi olabilir.

Bilinç Bulanıklığı veya Bayılma

Baş dönmesi ile birlikte bilinç değişikliği varsa acil değerlendirme gerekir.

Daha Sık Görülen ve Genellikle İyi Huylu Nedenler

Baş dönmesinin çoğu zaman daha iyi huylu ve geçici nedenleri vardır.

Örneğin:

- Yataktan kalkınca kısa süreli dönme hissi
- Baş hareketleriyle artan vertigo
- Bulantı ve kusma ile birlikte birkaç gün süren baş dönmesi

Bu durumlar genellikle iç kulak kaynaklı vertigo ile ilişkilidir.

Baş Dönmesi İçin Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Aşağıdaki durumlarda bir nöroloji uzmanına başvurmak önemlidir:

- Baş dönmesi sık tekrarlıyorsa
- Uzun süre devam ediyorsa
- Denge kaybı ile birlikteyse
- Günlük yaşamı etkilemeye başladıysa

Doğru tanı için nörolojik muayene, denge testleri ve gerekli durumlarda MR veya diğer görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.