

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- **PLANO CARTESIANO**
 - Sistemas de Coordenadas
 - Distância entre dois pontos

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO


1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com


PLANO CARTESIANO

Eixo y

Eixo x



2

Sistemas de Coordenadas**Pontos Cartesiano (x,y)****A (1,2)****B (-2,4)****C (-3,-1)****D (0,3)****E (1,-3)****F (-4,0)**


3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com**DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS**

Dados dois pontos cartesianos A (X_1 , Y_1) e B (X_2 , Y_2), a distância entre eles é:

$$D_{AB} = \sqrt{(X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2}$$

4



5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

6

1. Calcule a distância entre os pontos A (0, 4) e B (3, 8).

- A) 7
- B) 6
- C) 5
- D) 4
- E) 3

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Para organizar o mapa da região central de uma cidade, foi utilizado como referência o plano cartesiano que tinha a praça central como origem. Dois postos de vigilância foram montados nas posições P_1 (–2, 4) P_2 (6, –2). Considerando que as unidades utilizadas são dadas em hectômetros (100 metros), é CORRETO afirmar que a distância entre os postos de vigilância é:

- A) 100 metros
- B) 500 metros
- C) 800 metros
- D) 1000 metros
- E) 1200 metros

8

3. Calcule o valor da coordenada x do ponto $A(x, 2)$ sabendo que a distância entre A e $B(4, 8)$ é 10.

- A) -4 ou 12
- B) 4 ou -12
- C) 2 ou 6
- D) -2 ou 6
- E) -2 ou -6

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. No plano cartesiano, um ponto do eixo x está a uma mesma distância dos pontos $(0,1)$ e $(2,1)$. A coordenada x desse ponto vale:

- A) 0,3
- B) 1
- C) 0,5
- D) 4
- E) 2

10

5. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A (1, 4) e B (-6, 3), a abscissa de P vale:

- A) -2
- B) -1
- C) 0
- D) 1
- E) 3

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

1. C
2. D
3. A
4. B
5. A

12