



זף מידע- הטיפול לאחר חבלות ראש

ילדכם נבדק במחלקה לרפואה דחופה בשל חבלת ראש והוחלט כי אין צורך באשפוז בבית- החולים. **לעיתים נדירות**, סימני החבלה מופיעים באיחור ויש להיות ערני להתפתחויות או לשינויים במצב.

במשך 24 השעות הראשונות לאחר החבלה, יש לשים לב להופעת הסימנים הבאים:

- שינה ממושכת מהרגיל או קושי בהתעוררות.
- הקאה חוזרת.
- שינוי בהתנהגות (כגון בלבול או ישנוניות) או שינוי במצב ההכרה.
- הופעת פרכוסים (התכווצויות).
- הופעה פתאומית של הליכה או עמידה לא יציבה.
- דימום מהאף או האוזן.
- חולשת יד או רגל.
- הופעה פתאומית של כאבי ראש עזים או טשטוש ראייה.

בכל אחת מההתפתחויות האלה יש לפנות מידית לבדיקה חוזרת במיון לצורך הערכה מחודשת.

בכל מקרה יש לפנות לרופא המטפל לבדיקה חוזרת 48 שעות מהשחרור.

בברכת החלמה מהירה

צוות מלר"ד ילדים