



Matemática Divertida!
Teoria de Grafos









Prefácio

Neste breve livro, tive como objetivo apresentar de uma forma divertida, um tema de pesquisa em matemática, a Teoria de Grafos, para crianças em idade de ensino fundamental (de 8 a 14 anos), mas que também possa ser aproveitado por jovens adultos, e adultos que tenham curiosidade pela matemática.
O livro trata de forma bem básica as definições primárias do assunto. Em nenhum momento tem a pretensão de ser um livro técnico, mas sim uma ponte entre o desconhecimento, e a vontade de aprender mais sobre algo interessante. O livro aborda a definição de grafos, vértices, arestas, característica de Euler, sólidos 3D, e número cromático.
O ensino da matemática pode ser um agente transformador, aumentar a auto estima, e transformar vidas, desenvolvendo habilidades cognitivas muito importantes. Qualquer sociedade deveria priorizar o ensino de matemática e ciências para crianças e jovens, se deseja ter uma nação desenvolvida no futuro.
Espero que com este despretensioso livro, possa somar, mesmo que seja um pouquinho!

Introdução

A teoria de grafos é um ramo da matemática que tem como objetivo modelar os tipos de relações entre objetos. Por exemplo, a melhor rota de visita entre cidades vizinhas, a conexão entre neurônios, circuitos eletrônicos, etc. Sendo assim, possui vasta aplicação em áreas como física, neurociência, ciências biológicas, computação, eletrônica, linguística, ciências sociais, e até mesmo no desenvolvimento e aperfeiçoamento de redes sociais. Um exemplo de aplicação em redes sociais seria o Facebook e o algoritmo de sugestão do Feed de Notícias, amigos, etc.


A teoria de grafos teve seu início em um artigo publicado em 1736, por Leonhard Euler, no qual resolve o famoso problema conhedico por "*As sete pontes de Konigsberg*".

A literatura sobre teoria de grafos é muito vasta, e em geral muito técnica. Este livro não tem como pretensão substituir, nem competir com esse tipo de literatura. O escopo é fazer um breve passeio nos primeiros princípios sobre este ramo fascinante da matemática.

Definindo grafos

Nesta parte do livro vamos introduzir a definição de grafos, e apresentar algumas definições.
Definiremos o que são vértices, arestas, e apresentaremos a característica de Euler.

Um grafo é uma coleção de vértices (V)
unidos por arestas (A), formando regiões (R)




Este grafo possui:

- 5 vértices (V = 5)
- 7 arestas (A = 7)
- 4 regiões (R = 4)

Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira (osvald23@gmail.com)

O matemático Leonhard Euler descobriu o seguinte número V – A + R, que hoje é conhecido como Característica de Euler.




Vamos analisar o grafo ao lado como exemplo?

Vamos calcular:


V **A** **R**

3 **–** **3** **+** **2** **=** **2**

Observe que a região exterior ao grafo também precisa ser contabilizada!




V	A	R	
4	4	2	2




V	A	R		
5	− 5	+ 2	=	2

Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira (osvald23@gmail.com)




V	A	R		
6	− 6	+ 2	=	2

Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira (osvald23@gmail.com)




V		A		R		
4	−	5	+	3	=	2



V **A** **R**

5 **–** **6** **+** **3** **=** **2**


Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira (osvald23@gmail.com)



V **A** **R**

5 **−** **7** **+** **4** **=** **2**

Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira (osvald23@gmail.com)




V	A	R	
5	− 7	+ 4	= 2

Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira (osvald23@gmail.com)

Podemos afirmar que sempre teremos a seguinte relação abaixo?

$$V - A + R = \frac{2}{\quad}$$

Será que é sempre verdade? Vamos observar o seguinte exemplo...




V A R

8 − 8 + 3 = 3


O que aconteceu?

O grafo abaixo não respeita uma propriedade chamada de conexidade, ou seja, é dito ser um grafo não conexo.



Mas podemos consertar isso?

Sim, podemos. Basta acrescentarmos um vértice conectando a parte interior com a parte exterior.



V		A		R		
8	−	9	+	3	=	2


Definição: **Grafo Conexo**

Um grafo é dito conexo se for possível estabelecer um caminho de qualquer vértice para qualquer outro vértice.
Podemos definir o grau de conexidade de um gráfico (k), bastando remover um número k-1 de vértices, e perceber se o grafo continua sendo conexo.
Para o nosso exemplo, o grau de conexidade é igual a 0. Pois se retirarmos uma aresta, o grafo deixa de ser conexo!

Definição: **Grafo Planar**

É aquele grafo que pode ser representado em um plano sem qualquer interseção entre arestas.

Exemplo:




Conclusão:

Todo gráfico planar e conexo tem sua Característica de Euler igual a dois.

$$V - A + R = 2$$

Um exemplo de gráfico não planar:




Nesse grafo temos duas arestas se cruzando. A característica de Euler não é igual a 2. Como podemos consertar esse grafo?

V **A** **R**

4 **−** **6** **+** **5** **=** **3**

Podemos acrescentar um vértice,




Agora que acrescentamos um vértice ao grafo, não temos mais arestas se cruzando, e a característica de Euler volta a ser igual a 2.

V **A** **R**

5 **−** **8** **+** **5** **=** **2**

Temos outra solução,



Nesse caso, fomos capazes de redesenhar o grafo sem conter arestas se cruzando, e a Característica de Euler é igual a 2.


V A R

4 − 6 + 4 = 2


Sólidos 3D

Nesta parte do livro vamos introduzir o conceito de característica de Euler generalizado a partir de grafos planares para sólidos 3D.

Será que conseguimos generalizar a Característica de Euler para outros objetos? Por exemplo sólidos tridimensionais? A resposta é sim!




No caso de sólidos tridimensionais usamos a quantidade de faces (F) ao invés da quantidade de regiões (R) como foi feito em grafos planares.



V		A		F		
8	−	12	+	6	=	2


Vamos tentar um outro sólido? Que tal o prisma triangular? Vamos calcular sua característica de Euler.



$$V - A + F = 2$$


$$6 - 9 + 5 = 2$$

Agora vamos calcular a característica de Euler para a pirâmide regular de base quadrada.




V		A		F		
5	−	8	+	5	=	2

Agora vamos calcular a característica de Euler para o Tetraedro.



V		A		F		
4	−	6	+	4	=	2

Agora vamos tentar com o Octaedro.



V		A		F		
6	−	12	+	8	=	2


Colorindo grafos

Nesta parte do livro vamos definir o que é o número cromático de um grafo, e como este número se relaciona com as possibilidades de cores com as quais podemos colorir os vértices de um grafo.

Autor: Osvaldo Luiz dos Santos Pereira (osvald23@gmail.com)


Colorindo Grafos

Vamos tentar colorir cada vértice dos grafos usando diferentes cores para vértices vizinhos.




Número Cromático

Quando usamos o menor número de cores possíveis, sem repetir a cor para vértices vizinhos, damos a essa quantidade de cores o nome de Número Cromático.





4 cores diferentes





2 cores diferentes (número cromático)

Encontre o número cromático para os seguintes grafos. Como exercício, crie seus próprios grafos, e encontre os seus números cromáticos.










Um pouco de história

Nesta parte do livro vamos abordar de forma histórica o famoso problema "*As sete pontes de Konigsberg*", e contar um pouco da vida de Leonhard Euler, e como foi um matemático que produziu muito para a humanidade.

As sete pontes de Konigsberg


Este é um problema histórico que foi resolvido por Leonhard Euler em 1736. A cidade de Konigsberg, Prussia (atualmente Kaliningrado, Russia) foi construída dos dois lados do Rio Pregel. Na cidade há duas ilhas que eram conectadas por sete pontes, como mostra a figura abaixo.



Fonte: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Bridges_of_K%C3%B6nigsberg#/media/File:Konigsberg_bridges.png)


As sete pontes de Konigsberg


Para deixar o problema mais fácil de visualizar, Euler reduziu o problema a um desenho bem simples das duas ilhas e das sete pontes.



As sete pontes de Konigsberg


Dessa forma, Euler deu início ao que seria então conhecido como a *Teoria de Grafos*. Repare que podemos representar as cidades por vértices, e as travessias das pontes por arestas!






As sete pontes de Konigsberg

O problema se resume na seguinte pergunta:
É possível atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma?
Euler provou matematicamente que da maneira que as pontes são distribuídas, não é possível atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma delas.
A solução se encontra na quantidade de arestas em cada um dos vértices.



As sete pontes de Konigsberg

A solução: Euler percebeu que este problema pode ser generalizado, e que teria solução no caso de nenhum dos vértices, ou apenas dois vértices terem uma quantidade ímpar de arestas. Uma das possíveis soluções seria acrescentar mais uma ponte. A figura ao lado mostra esta solução.



Leonhard Paul Euler

Nasceu na Basiléia, Suíça em 15 de abril de 1707, e faleceu em São Petesburgo em 18 de setembro de 1783. Foi um grande físico, matemático, astrônomo, lógico, engenheiro. Foi com certeza um dos cientistas mais prolíficos da história, tendo realizado grande parte de seus trabalhos depois de ter ficado cego devido à catarata. Se encontra ombro a ombro, ao lado de gigantes como Isaac Newton, e Carl Friedrich Gauss.



Leonhard Euler, quadro a óleo por Johann Georg Brucker

Leonhard Paul Euler

É creditado à Euler uma das mais famosas identidades da matemática,

$$e^{\pi i} + 1 = 0,$$

mas essa é uma história para um próximo livro...



Leonhard Euler, quadro a óleo por Johann Georg Brucker