

# Оглавление

[russian]

# Глава 1

## ТФКП

### 1.1. Теорема Коши для конечносвязной области, ограниченной кусочно-гладкой кривой

**Теорема 1.**  $G \subset \mathbb{C}$ ,  $\bar{D} \subset G$ ,  $\partial D = \bigcup_{k=1}^m \Gamma_k$ ,  $\Gamma_k$  кусочно-гладкие,  $f \in \mathcal{A}(G)$

$$\int_{\bigcup_{\partial D}} f(z) \, dz = 0$$

**Доказательство.** Пусть  $\Gamma_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ .

$$\exists \delta_0 > 0 : \quad \forall \zeta \in \partial D \quad \bar{B}(\zeta) = \{ z \mid |z - \zeta| \leq \delta_0 \} \subset G$$

$$T_{\delta_0} := \bigcup_{\zeta \in \partial D} \bar{B}_{\delta_0}(\zeta)$$

**Утверждение 1.**  $T_{\delta_0}$  — компакт

**Доказательство.** Упражнение. □

Значит, по теореме Кантора,  
 $f \in \mathcal{C}(T_{\delta_0}) \implies f$  равномерно непрерывна на  $T_{\delta_0}$ . То есть,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists 0 < \delta_1 \leq \delta_0 : \quad \forall z_1, z_2 \in T_{\delta_0} : |z_1 - z_2| < \delta_1 \quad |f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon \quad (1.1)$$

Обозначим  $P_k = \{ t_{kj} \}_{j=0}^{N_k}$ ,  $t_{k0} = a_k$ ,  $t_{kN_k} = b_k$ ,  $k = 1, \dots, m$ .  
Выберем его так, чтобы

$$\forall t \in [t_{kj}, t_{k \, j+1}] \quad |\Gamma(t) - \Gamma(t_{kj})| < \delta_1 \quad (1.2)$$

Такое разбиение можно выбрать в силу равномерной непрерывности.

Обозначим многоугольник  $S_k = \{ \Gamma(t_{kj}) \}_{j=0}^{N_k}$ .

Обозначим  $\tilde{D}$  так, что  $\partial \tilde{D} = \bigcup_{k=1}^m S_k$ . По определению  $\tilde{D} \subset G$ . Применим к  $\tilde{D}$  аналогичную теорему для многоугольников:

$$\int_{\bigcup_{\partial \tilde{D}}} f(z) \, dz = 0 \quad (1.3)$$

$$\implies \int_{\bigcup_{\partial \tilde{D}}} f(z) \, dz = 0 \quad (1.4)$$

$$\implies \int_{\bigcup_{\partial D}} f(z) \, dz = \int_{\bigcup_{\partial D}} f(z) \, dz + \int_{\bigcup_{\partial \tilde{D}}} f(z) \, dz \quad (1.5)$$

Рассмотрим некоторую кривую  $\Gamma_k$  (ориентация согласована с общей ориентацией границы). Обозначим  $\Gamma(t_{kj}) =: z_{kj}$ ,  $0 \leq j \leq N_k$ .

Рассмотрим случай, когда  $k = 1$  (остальные — аналогично). Это внешняя кривая. Т. к. кривая замкнутая,  $z_{k0} = z_{kN_k}$ .

Рассмотрим точки  $z_{1j}, z_{1j+1}, z_{1j+2}$ . Они обходятся в положительном направлении. Но, если рассматривать многоугольник  $S_1$ , то на нём эти же точки обходятся в противоположном направлении.

Обозначим  $\gamma_{1j} := \Gamma([t_{1j}, t_{1j+1}])$ . По одному из свойств,

$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz = \sum_{j=0}^{N_1-1} \int_{\gamma_{1j}} f(z) dz \quad (1.6)$$

Обозначим  $\sigma_{1j}$  — отрезок с концами  $z_{1j}, z_{1j+1}$ . Тогда

$$\int_{S_1} f(z) dz = \sum_{j=0}^{N_1-1} \int_{\sigma_{1j}} f(z) dz \quad (1.7)$$

Из последних двух выражений получаем, что

$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{S_1} f(z) dz = \sum_{j=0}^{N_1-1} \left( \int_{\gamma_{1j}} f(z) dz + \int_{\sigma_{1j}} f(z) dz \right) \quad (1.8)$$

Возьмём  $c \in \mathbb{C}$ .

$$\int_{\gamma_{1j}} c dz + \int_{\sigma_{1j}} c dz = c(z_{1j+1} - z_{1j}) + c(z_{1j} - z_{1j+1}) = 0 \quad \forall c \quad (1.9)$$

Возьмём в качестве  $c$  выражение  $f(z) - f(z_{1j})$

$$(1.8) = \sum_{j=0}^{N_1-1} \left( \int_{\gamma_{1j}} (f(z) - f(z_{1j})) dz + \int_{\sigma_{1j}} (f(z) - f(z_{1j})) dz \right) \quad (1.10)$$

Выберем разбиения такие, чтобы

$$\forall k \quad \forall j \quad \forall y \in [t_{kj}, t_{kj+1}] \quad |\Gamma_k(t) - \Gamma_k(t_{kj})| < \delta_1 \quad (1.11)$$

Тогда при  $z \in \gamma_{kj}$  выполнено

$$|z - z_{kj}| < \delta_1 \quad (1.12)$$

В частности,

$$|z_{kj+1} - z_{kj}| < \delta_1 \quad (1.13)$$

По одному из свойств криволинейных интегралов,

$$\left| \int_{\gamma_{1j}} f(z) - f(z_{1j}) dz \right| \leq \int_{\gamma_{1j}} |f(z) - f(z_{1j})| |dz| \stackrel{(1.1), (1.12)}{\leq} \int_{\gamma_{1j}} \varepsilon |dz| = \varepsilon \cdot l \gamma_{1j} \quad (1.14)$$

Если  $z \in \sigma_{1j}$ , то

$$|z - z_{1j}| \leq |z_{1j+1} - z_{1j}| \stackrel{(1.13)}{<} \delta_1$$

$$\Rightarrow \left| \int_{\sigma_{1j}} f(z) - f(z_{1j}) dz \right| \leq \int_{\sigma_{1j}} |f(z) - f(z_{1j})| |dz| < \varepsilon \cdot |z_{j+1} - z_{1j}| \leq \varepsilon \cdot l \gamma_{1j} \quad (1.15)$$

$$(1.10), (1.14), (1.15) \Rightarrow \left| \int_{\gamma_{1j}} f(z) dz + \int_{\sigma_{1j}} f(z) dz \right| < 2\varepsilon \cdot l \gamma_{1j} \quad (1.16)$$

$$\stackrel{(1.10)}{\implies} \left| \int_{\underbrace{\gamma_{1j}}_{\sigma_{1j}}} f(z) \, dz + \int_{\underbrace{\sigma_{1j}}_{\gamma_{1j}}} f(z) \, dz \right| < 2\varepsilon \sum_{j=0}^{N_1-1} l \, \gamma_{1j} = 2\varepsilon l \Gamma_1 \quad (1.17)$$

При остальных  $k$  — аналогично.

$$\begin{aligned} (1.5), (1.17) &\implies \left| \int_{\underbrace{\partial D}} f(z) \, dz \right| < 2\varepsilon \sum l \Gamma_k \\ &\implies \int_{\underbrace{\partial D}} f(z) \, dz = 0 \end{aligned}$$

□

## 1.2. Формула Коши

**Теорема 2.**  $G \subset \mathbb{C}$ ,  $D = B_r(z_0)$ ,  $\overline{D} \subset G$ ,  $f \in \mathcal{A}(G)$ ,  $z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\underbrace{\partial D}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta \quad (1.18)$$




Рис. 1.1: *Картинку надо дорисовать.*

**Доказательство.** Возьмём  $\delta > 0$  так, чтобы  $\delta < r - |z - z_0|$ . Рассмотрим  $B_\delta = \{ \zeta \mid |\zeta - z| < \delta \}$ . Понятно, что  $\overline{B}_\delta \subset D$ .

Рассмотрим

$$\varphi(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \quad (1.19)$$

Она аналитична в  $D \setminus \{z\}$ .

Рассмотрим область  $D_\delta = D \setminus \overline{B}_\delta$ .

$$\overline{D}_\delta \subset G \setminus \{z\}$$

По теореме Коши,

$$\int_{\underset{\curvearrowright}{\partial} D_\delta} \varphi(\zeta) d\zeta = 0 \quad (1.20)$$

Обозначим  $S = \{ \zeta \mid |\zeta - z| = r \}$ ,  $\sigma_\delta = \{ \zeta \mid |\zeta - z| = \delta \}$ .

$$(1.20) \implies \int_{\underset{\curvearrowright}{S}} \varphi(\zeta) d\zeta + \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} d\zeta = 0 \iff \int_{\underset{\curvearrowright}{S}} \varphi(\zeta) d\zeta = - \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \varphi(\zeta) d\zeta = \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \varphi(\zeta) d\zeta \quad (1.21)$$

$$\int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \varphi(\zeta) d\zeta \stackrel{(1.18)}{=} \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta \quad (1.22)$$

$$\int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta = f(z) \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta \quad (1.23)$$

$$\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta} = \{ \zeta \mid \zeta = z + \delta e^{i\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi] \}$$

$$\left( \delta e^{i\theta} \right)'_{\theta} = i\delta e^{i\theta}$$

$$\int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = \int_0^{2\pi} \frac{(\delta e^{i\theta})'}{\delta e^{i\theta}} d\theta = 2\pi i \quad (1.24)$$

$$(1.23), (1.24) \implies \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z) \quad (1.25)$$

$$(1.22), (1.25) \implies \int_{\underset{\curvearrowright}{S}} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{\underset{\curvearrowright}{\sigma_\delta}} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta + 2\pi i f(z) \quad (1.26)$$

□