

Mr. T., 32 ans (anxiété)

Mr. T., 32 ans, célibataire, vit seul dans un appartement en centre-ville. Il travaille comme technicien informatique dans une PME, poste qu'il occupe depuis six ans sans difficulté particulière jusqu'à récemment. Il consulte à la demande de sa sœur, inquiète de le voir « changer » depuis quelques mois.

Il rapporte un état de tension quasi permanent, avec l'impression d'être « sur le qui-vive ». Il dit redouter qu'« il arrive quelque chose », sans pouvoir préciser quoi. Cette inquiétude est présente la plupart du temps, y compris le soir et le week-end, et il dit avoir du mal à « faire le vide ». Il évoque des pensées qui tournent en boucle autour de son travail, de sa santé et de celle de ses proches. Il vérifie régulièrement qu'il a bien fermé la porte, éteint les appareils, et appelle sa mère presque tous les jours pour s'assurer qu'elle va bien.

Depuis deux mois, il décrit des épisodes brusques où il se sent envahi par une peur intense, avec une impression d'étouffement, des palpitations, des tremblements et la crainte de « perdre le contrôle » ou de faire un malaise. Ces épisodes surviennent sans prévenir, y compris dans des situations ordinaires (au supermarché, dans les transports). Depuis, il évite certains lieux trop fréquentés et limite ses sorties.

Le sommeil est perturbé, avec des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes. Il se sent fatigué au réveil, irritable dans la journée, et a du mal à se concentrer au travail.

Dans son histoire, il décrit un tempérament « inquiet » depuis l'enfance, dans un contexte familial marqué par une mère anxieuse et un père peu présent. Aucun antécédent médical notable, pas de consommation de substances. Il n'a jamais consulté auparavant pour des difficultés psychiques.