

2023년도 4교시 문항별 상세 해설


병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양·유전 (1~20)

[병리학 · 전이암]

1. 상행결장·폐 덩이 절제, 폐 조직 소견 — 진단은?




정답 ②

대장암 환자의 폐 병변이 대장샘암종과 같은 형태를 보이면 전이샘암종이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 전이암 vs 원발암: 병력·형태·면역표지(대장=CK20/CDX2, 폐=TTF-1/CK7). 폐는 전이 호발 장기.

[병리학 · 소세포폐암]

2. 중격 침범 폐종양, TTF1·CD56·chromogranin+ — 흔한 변이 유전자는?




정답 ①

신경내분비표지(CD56·chromogranin) 양성 소세포폐암은 RB1(및 TP53) 변이가 특징이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 소세포폐암: 신경내분비·중심성·흡연·조기전이, RB1/TP53 소실, SIADH·이튼램버트. 표지=CD56·synaptophysin.

[병리학 · 초승달신염]

3. MPO-ANCA+, 혈뇨·단백뇨, 신생검 — 병리 소견은?



정답 ①

ANCA 관련 급속진행사구체신염은 보먼공간에 초승달(crescent)을 형성한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 초승달신염(RPGN): 항GBM(I형)·면역복합체(II형)·펠시면역(III형·ANCA). 초승달=상피/섬유 증식.

[병리학 · 유전성 유방암]

4. 유방암+가족력(난소암·유방암) — 권유할 유전자 검사는?



정답 ②

유방암·난소암 가족력은 BRCA1(및 BRCA2) 변이를 시사한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: BRCA1/2: 유방·난소암 위험↑, DNA 이중가닥 수선(상동재조합). PARP억제제 표적. 상염색체 우성.

[병리학 · 사코이드증]

5. 양측 폐문림프절 비대·결절, 결핵/진균 음성 — 진단은?




정답 ③

양측 폐문림프절종대와 비건락 육아종(감염 음성)은 사코이드증(유육종증)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 사코이드증: 비건락 육아종·양측 폐문림프절종대·혈청 ACE↑·고칼슘. 결핵(건락)과 감별.

[병리학 · 이소종]

6. 위 점막하중양(이소성 조직) — 해당하는 것은?




정답 ③

정상 조직이 엉뚱한 위치에 있는 것(위 속 이소성 체장 등)은 이소종(choristoma)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 이소종=정상조직의 이소성 위치(예: 위 이소성 체장). 과오종=제자리 조직의 무질서 과성장.

[병리학 · 편평상피 이형성]

7. 흡연자·성대암 병력, 기관지 점막 발적 — 예견되는 소견은?



정답 ④

흡연에 의한 기관지 상피 손상은 편평상피세포 이형성(dysplasia)으로 진행하며 편평세포암의 전구 병변이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 편평세포암 발생: 화생→이형성→제자리암→침습. 흡연·중심성. 이형성=가역적 전암병변.

[병리학 · 종양표지자]

8. 난소 상피성 종양 재발 감시에 유용한 혈액검사는?

정답 ①

난소 상피암 재발 감시는 CA-125가 유용하다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 종양표지자: CA-125(난소)·CA19-9(췌장·담도)·CEA(대장)·AFP(간·난황낭)·칼시토닌(갑상샘수질암).

[병리학 · 장액염증]

9. 화상 물질 — 급성염증 형태학적 분류는?



정답 ③

화상 물질은 맑은 삼출액이 고이는 장액염증(serous inflammation)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 삼출염증: 장액성(맑은 액·화상물질)·섬유소성(피브린·심장막)·화농성(고름). 삼출물 성분으로 분류.

[병리학 · 로버트슨전위]

10. der(14;21) 다운증후군 — 염색체 구조 이상은?


정답 ②

14번·21번 긴팔이 융합한 로버트슨 전위(Robertsonian translocation)다. 사진 8-2, 정답 ②.

■ 관련 지식: 로버트슨 전위: 두 근단부 염색체 긴팔 융합. 전위형 다운증후군(유전 가능)=der(14;21). vs 21삼염색체(비분리).

[병리학 · MALT림프종]

11. 위 종양, Warthin-Starry(H.pylori)+ — 기원 세포는?



정답 ①

헬리코박터 연관 위 MALT림프종은 림프구(B세포) 기원이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 위 MALT림프종: H. pylori 만성감염→B세포 증식. 초기엔 제균으로 호전. t(11;18) 연관.

[병리학 · 콜레스테롤색전]

12. 관상동맥 스텐트 후 신기능 저하, 혈관 폐색 물질은?



정답 ⑤

혈관 시술 후 죽상판이 떨어져 나가 작은 동맥을 막는 콜레스테롤 색전(atheroembolism)이다(바늘모양 틈새). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 콜레스테롤색전: 혈관조작 후 죽종 파편이 공팔·피부·발가락 색전. 조직에 바늘모양 콜레스테롤 틈새.

[병리학 · HNPCC·불일치수선]

13. HNPCC, hMLH1/hPMS 변이 — 연관 발암 기전은?

정답 ②

린치증후군(HNPCC)은 DNA 불일치 수선(mismatch repair) 기능 상실로 미세부수체 불안정을 초래한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: HNPCC: MLH1·MSH2 등 불일치수선 유전자 변이→미세부수체 불안정(MSI). 대장·자궁내막암 위험↑.

[병리학 · 리-프라우메니]

14. 뇌종양·골육종·유방암 병력, 17p13.1 기능소실 변이 — 유전자는?


정답 ⑤

여러 장기 조기암(리-프라우메니증후군)에 17p13.1 = TP53이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 리-프라우메니: TP53 생식세포 변이→육종·유방암·뇌종양·부신결절암 조기 다발. p53=게놈수호자.

[병리학 · 신세포암]

15. 콩팥종양(옆구리통증·혈뇨) — 관련 유전자는?



정답 ③

투명세포 신세포암은 VHL 유전자 이상과 관련된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 투명세포 신세포암: VHL(3p) 소실→HIF·혈관신생. 삼징=옆구리통증·혈뇨·촉지 종괴. 폰히펠린다우.

[병리학 · 문맥고혈압·울혈]

16. 식도정맥류·치핵·메두사머리 공통 혈류역동 장애는?


정답 ④

세 소견 모두 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈(congestion)과 결순환 결과다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 울혈=정맥 유출 저하(수동). 문맥-체순환 결순환: 식도정맥류·치핵·메두사머리.

[병리학 · 모순색전증]

17. 폐색전+심방중격결손, 뇌경색 발생 — 설명하는 용어는?




정답 ①

정맥 혈전이 심방중격결손을 통해 동맥계로 넘어가 뇌경색을 일으킨 것은 모순색전증(paradoxical embolism)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 모순색전: 정맥 색전이 우→좌 단락(ASD·PFO)으로 동맥 순환 진입→전신 색전(뇌경색). 심부정맥혈전 동반.

[병리학 · 아스페르길루스]

18. 폐이식·면역억제, 반복 객혈, 결핵 음성 — 진단은?




정답 ③

면역억제 환자의 객혈·공동 병변에서 예각으로 분지하는 격벽 군사는 아스페르길루스증이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 아스페르길루스: 45° 예각 분지·격벽 군사. 아스페르길로마(공동 내 균구·객혈)·침습성(면역저하). GMS 염색.

[병리학 · 삼중음성 유방암]

19. 유방암, IHC(ER·PR·HER2 음성) — 분자병리 분류는?




정답 ③

ER·PR·HER2가 모두 음성이면 삼중음성형 유방암이다(예후 불량·표적 제한). 정답 ③.

■ 관련 지식: 유방암 분자아형: 내강A/B(ER+)·HER2형·삼중음성(ER/PR/HER2 ·BRCA 연관·기저양). 삼중음성=항암 위주.

[병리학 · 아메바 대장염]

20. 항암치료 중 장출혈, H&E/PAS 염색 — 감염체는?



정답 ①


PAS 양성인 영양형이 조직에 보이면 아메바(이질아메바) 감염이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 이질아메바: 플라스크 궤양·적혈구 포식 영양형(PAS+)·간농양. 면역저하에서 중증. 감별=CMV 대장염.

II. 병리학 — 전신·면역·순환 (21~45)

[병리학 · 폐 샘암종]

21. 비흡연 여성 폐종양, TTF-1+ — 흔한 변이 유전자는?




정답 ③

비흡연·TTF-1 양성 폐 샘암종은 EGFR 변이가 흔하다(표적치료 대상). 정답 ③.

■ 관련 지식: 폐 샘암종(비흡연·여성·동양인): EGFR·ALK·ROS1. 표적치료(게피티닙 등). 흡연 폐암=KRAS·소세포=RB1.

[병리학 · 화생]

22. 자궁경부·기관지에 공통된 세포적응 기전은?




정답 ④

두 조직 모두 원주상피가 편평상피로 바뀌는 화생(metaplasia)을 보인다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 세포적응: 비대·증식·위축·화생. 편평화생=자궁경부(HPV)·기관지(흡연). 가역적이나 이형성 위험.

[병리학 · 루푸스신염]

23. 부종·발열, ANA 1:1280·저보체, 신생검 — 진단은?




정답 ④

ANA 고역가·저보체(C3·C4-)·다장기 침범은 전신홍반루푸스신염이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 루푸스신염: 면역복합체·저보체·항dsDNA·폴하우스 면역형광. 여러 등급(WHO). 젊은 여성.

[병리학·중성구 주화]

24. 충수돌기(급성충수염) 중성구 침윤에 기여한 케모카인은?




정답 ④

중성구를 불러모으는 대표 케모카인은 인터루킨-8(IL-8/CXCL8)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 케모카인: IL-8(중성구)·MCP-1(단핵구)·에오타신(호산구). 급성염증=중성구(IL-8 주도).

[병리학·육아종·지연과민]

25. 폐 결절·폐문림프절, 육아종 — 발병 면역반응은?




정답 ②

육아종 형성은 T세포·대식세포 매개 지연형 과민반응(제Ⅳ형)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 육아종성 염증: Th1·IFN- γ →대식세포 활성화(상피모양세포). 결핵·사코이드. 제Ⅳ형 과민.

[병리학·폐포단백질증]

26. 만성 기침, 폐포에 PAS+ 물질 축적 — 진단은?




정답 ②

폐포 내에 PAS 양성 표면활성물질이 축적되는 것은 폐포단백질증이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 폐포단백질증: GM-CSF 신호 이상→표면활성물질 제거 실패, 폐포 내 PAS+ 물질. 치료=전폐세척.

[병리학 · 쇼그렌]

27. 안구·구강건조, 침샘 림프구 침윤 — 자가항체는?




정답 ⑤

쇼그렌증후군에서 항SS-A(Ro)/SS-B(La) 항체가 검출된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 쇼그렌: 외분비샘 림프구 침윤·건조증상. 항SS-A/B·류마티스인자. 림프종 위험↑.

[병리학 · 결핵]

28. 폐 침부 결절·침윤, 육아종 — 진단은?



정답 ①

폐 침부의 건락 육아종은 결핵이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 결핵: 건락육아종·랑한스거대세포·항산균. 침부(산소 풍부) 호발. 잠복→재활성.

[병리학 · 켈로이드]

29. 상처 복구 이상 후유증(사진) — 진단은?





정답 ④

상처 경계를 넘어 융기하는 콜라겐 과증식은 켈로이드다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 창상치유 이상: 켈로이드(경계 넘음·재발)·비후흉터(경계 내)·구축(반흔수축). 콜라겐 과잉.

[병리학 · 다카야스동맥염]

30. 상지 무맥·대동맥 협착, 부검 혈관 소견 — 진단은?



정답 ②

대동맥·큰가지의 육아종성 염증으로 상지 무맥을 보이는 것은 다카야스동맥염이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 다카야스(무맥병): 젊은 여성·대동맥궁 가지 협착·상지 혈압차. 거대세포동맥염=고령·측두동맥.

[병리학 · 위암 병기·위벽층]

31. 위암 병기 그림, (A)와 (B)에 들어갈 말은?

- TX: Primary tumor cannot be assessed
- T0: No evidence of primary tumor
- Tis: Carcinoma in situ: intraepithelial tumor without invasion of the (A); high grade dysplasia
- T1: Tumor invades the (A), (B) or submucosa
 - T1a: Tumor invades the (A), or (B)
 - T1b: Tumor invades the submucosa


정답 ②

위벽 점막층 구조상 (A)=고유판(lamina propria), (B)=점막근판(muscularis mucosae)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 위벽: 점막(상피·고유판·점막근판)·점막밑·근육층(muscularis propria)·장막. T1a=고유판/점막근판, T1b=점막밑.

[병리학 · 고형가유두상종양]

32. 젊은 여성, 췌장꼬리 낭종, β -catenin 핵양성·CTNNB1 변이 — 진단은?




정답 ④

젊은 여성 췌장의 고형 가유두상 종양(SPN)은 CTNNB1(β -catenin) 변이로 핵 β -catenin 양성을 보인다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 고형가유두상종양: 젊은 여성·췌장꼬리·저악성도· β -catenin 핵양성. 점액성/장액성 낭종과 감별.

[병리학 · 자궁경부 상피내병변]

33. HPV-16, 편치생검 소견 — 진단은?



정답 ④

편치생검에서 상피 전층에 가까운 이형성이 보이면 고등급편평상피내병변(HSIL)다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 자궁경부: LSIL(HPV·CIN1)→HSIL(CIN2/3)→침습암. 고위험 HPV(16·18). 원반세포(koilocyte).

[병리학 · 수두-헤르페스]

34. 소아, 피부분절 따라 발진 후 수포 — 조직 소견은?

정답 ⑤

수두-대상포진/단순포진 바이러스 감염은 상피세포 내 핵내봉입체(및 다핵거대세포)를 보인다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 헤르페스바이러스: 핵내봉입체(Cowdry A)·다핵거대세포(Tzanck). 수두=전신 발진→수포, 대상포진=피부분절.

[병리학 · 세포손상·칼슘]

35. 세포질 농도 증가 시 효소를 활성화해 세포막 손상을 일으키는 이온은?


정답 ③

세포질 칼슘(Ca^{2+}) 증가는 포스포리파아제·단백분해효소·핵산분해효소·ATPase를 활성화해 세포손상을 일으킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 세포손상: 세포내 Ca^{2+} ↑(정상 낮게 유지)→효소 활성화→막·단백·DNA 손상. 허혈·독성 손상의 공통 경로.

[병리학 · 피부경화증]

36. 레이노현상+입술 주위 피부 경화, 조직검사 — 진단은?




정답 ①

레이노현상과 피부 경화(콜라겐 침착)는 피부경화증(전신경화증)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 전신경화증: 항Scl-70(미만형)·항중심질(국한형·CREST). 레이노·피부경화·식도운동장애·폐섬유화.

[병리학 · 거대세포바이러스]

37. 심장이식 후 십이지장 미란, 병리 소견 — 감염원·염증 패턴은?



정답 ⑤

이식 후 CMV 감염은 바이러스에 의한 세포변성/세포증식 염증(올빼미눈 봉입체)을 보인다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: CMV: 이식·에이즈 기회감염, 올빼미눈 핵내봉입체·세포비대. 위장관·망막·폐 침범.

[병리학·보체·옵소닌]

38. 반복 감염, 환자 혈청에서 식균 안 됨 — 부족한 물질은?

정답 ②

정상 혈청에선 식균되나 환자 혈청에선 안 되는 것은 옵소닌 결핍으로, C3b(보체) 부족이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 옵소닌: C3b·IgG(Fc)→식균 촉진. C3 결핍=반복 화농감염. C3a/C5a=주화·아나필락시스독소.

[병리학·대식세포 활성화]

39. T세포 상충액이 대식세포 포식능을 높임 — 함유 물질은?

정답 ②

활성 T세포가 분비해 대식세포를 활성화하는 것은 인터페론- γ 다. 정답 ②.

■ 관련 지식: IFN- γ (Th1·NK): 대식세포 활성화(살균력↑)·MHC 발현↑. 육아종 형성·세포내균 방어에 핵심.

[병리학·FAP·APC]

40. 대장 수백 개 용종+가족력, 발암 초기 생식세포 변이는?

정답 ①


가족섬종폴립증(FAP)의 초기·생식세포 변이는 APC다. 정답 ①.

■ 관련 지식: FAP: APC 생식세포 변이→수백 개 용종→대장암. 대장암 경로: APC→KRAS→TP53(선종-암 연속).

III. 병리학 후반·기생충학 (41~60)

[병리학·막신병증·과민]

41. 신증후군(부종·단백뇨·고콜레스테롤), 일차성 사구체질환 발병 기전은?




정답 ②

막신병증 등 항체가 발세포 항원에 직접 결합하는 일차성 사구체질환은 제 II 형 과민반응이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 막신병증: 발세포 항원(PLA2R)에 대한 IgG in-situ 면역복합체(제 II 형)·상피밑 침착·spike. 신증후군.

[병리학·췌장샘암종]

42. 명치통증·황달·체중감소, CA19-9 2265, 췌장 저음영 병변 — 진단은?



정답 ①

CA19-9 상승과 췌장 종괴·폐쇄황달은 췌장샘암종이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 췌장샘암종: 췌장머리(폐쇄황달)·CA19-9↑·KRAS/p16/TP53/SMAD4·예후 불량. 무통성 황달(Courvoisier).

[병리학 · 급성췌장염·지방괴사]

43. 알코올중독 사망, 장간막 지방괴사 — 사인 질병은?



정답 ②

장간막의 지방괴사(효소성·칼슘비누)는 급성췌장염의 특징이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 급성췌장염: 효소성 지방괴사·출혈·칼슘비누. 알코올·담석. 아밀라아제·리파아제↑.

[병리학 · 그레이브스병]

44. 빈맥·안구돌출·갑상샘종대·저체중 — 수술 전 혈액검사 소견은?





정답 ⑤

안구돌출·갑상샘종대의 그레이브스병은 항TSH수용체 자가항체(TSI) 양성이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 그레이브스병: TSH수용체 자극항체→갑상샘항진·안구돌출·경골앞점액부종. TSH↓·유리T3/T4↑.

[병리학 · 자궁내막증]

45. 난임, 난소 초콜릿 낭종 — 진단은?




정답 ⑤

난소의 짙은 초콜릿색 낭(오래된 출혈)은 자궁내막증(자궁내막종)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 자궁내막증: 자궁 밖 자궁내막 조직(난소·복막). 초콜릿낭·월경통·난임. 조직=내막샘+기질+헤모시데린.

[기생충학 · 회선사상충]

46. 흑파리 매개, 피부염·시력 상실 유발 기생충은?



정답 ②

흑파리(먹파리)가 매개하고 피부염·실명(강변실명증)을 일으키는 것은 회선사상충(Onchocerca)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 회선사상충증(강변실명): 흑파리 매개·피부결절·미세사상충이 눈 침범→실명. 치료=이버멕틴.

[기생충학 · 흡충 치료]

47. 경미한 소화기 증상, 대변검사(흡충 충란) — 치료는?




정답 ④

흡충류 감염 치료는 프라지판텔이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 프라지판텔=흡충·조충 치료. 알벤다졸=선충. 흡충란은 난개(operculum)가 특징.

[기생충학 · 이소성 흡충]

48. 유방 낭 안의 벌레(위치 변함) — 진단은?




정답 ②

폐 외 조직(유방 등)으로 이소성 이동한 흡충 감염(폐흡충증)으로 진단되었다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 폐흡충(Paragonimus): 민물 게·가재 생식, 주로 폐(객혈)지만 뇌·피부·유방 등 이소성 침범 가능.

[기생충학 · 방광주혈흡충]

49. 아프리카 거주, 혈뇨·방광벽 비후·호산구↑ — 진단은?




정답 ④

아프리카 유행지에서 혈뇨·방광 병변은 방광주혈흡충에 의한 주혈흡충증(*Schistosoma haematobium*)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 방광주혈흡충: 혈뇨·방광 섬유화·방광암(편평세포암) 위험. 충란=말단 가시. 아프리카·중동.

[기생충학 · 작은와포자충]

50. 동남아 여행 후 수양성 설사, 변형항산염색 — 진단은?




정답 ⑤

변형항산염색 양성의 작은 난포낭은 작은와포자충증(*Cryptosporidium*)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 크립토스포리디움: 수인성·수양성 설사(면역저하에서 중증). 변형항산염색 양성 난포낭. 오시스트.

[기생충학 · 만손주혈흡충]

51. 아프리카 물놀이 후 혈변·결장 용종 — 진단은?




정답 ⑤

아프리카 담수 노출 후 혈변·장 병변은 만손주혈흡충증(*Schistosoma mansoni*)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 만손주혈흡충: 장·간(문맥 섬유화). 충란=측방 가시. 세르카리아 피부 침입(수영자 가려움).

[기생충학 · 질편모충]

52. 약취 나는 질분비물, 검사염색 — 감염형은?




정답 ③

질편모충은 포낭기가 없어 운동성 영양형(trophozoite)으로만 존재·전파된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 질편모충: 성매개, 영양형만(포낭 없음)·탈기자궁목·거품냉. 치료=메트로니다졸(파트너 동시).

[기생충학 · 리슈만편모충]

53. 중동 체류 후 안 닳는 얼굴 궤양, 2μm 총체 — 진단은?




정답 ⑤

중동에서 감염된 만성 피부궤양에 무편모체가 보이면 피부리슈만편모충증이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 리슈만편모충: 모래파리 매개. 피부형(궤양)·내장형(칼라아자르·간비대·발열). 무편모체(대식세포 내).

[기생충학 · 호산구·조직이행]

54. 기생충이 조직을 이행하는 시기에 증가하는 면역세포는?



정답 ③

기생충의 조직 침입·이행 시기에는 호산구가 특징적으로 증가한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 호산구: 기생충(특히 조직침입성 연충)·알레르기에서 증가. 주요염기성단백으로 유충 공격.

[기생충학 · 편충]

55. 대장내시경에서 적출한 약 4cm 충체 — 이 기생충은?




정답 ③

큰창자에 기생하는 채찍 모양(앞이 가는) 4cm 선충은 편충(Trichuris)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 편충: 채찍모양·맹장/대장 기생·대변·구강. 대량감염 시 직장탈·빈혈. 충란=술통형 양극마개.

[기생충학 · 스파르가눔]

56. 가랑이 부위 위치 변하는 덩이, 적출 충체 — 진단은?



정답 ①

피하를 이동하는 흰 끈 모양 충체(스파르가눔)는 스파르가눔증(고충증)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 스파르가눔증: 스피로메트라 조충 애벌레. 개구리·뱀 생식·물. 피하·안구 이동성 결절. 치료=적출.

[기생충학 · 요코가와흡충]

57. 은어회 섭취(섬진강) 후 설사·복통 — 진단은?



정답 ④

은어 생식으로 감염되는 장흡충 요코가와흡충증이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 요코가와흡충: 은어(제2중간숙주) 생식·소장 기생·설사. 충란은 간흡충과 유사(작고 난개).

[기생충학 · 선충 분류]

58. 자웅이체·체강 있음·가늘고 긴 원통형·완전소화관 — 분류는?


정답 ①

자웅이체이고 체강과 완전한 소화관(구강~항문)을 갖는 원통형 기생충은 선충류(nematode)다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 선충(원통·자웅이체·완전소화관·체강): 회충·편충·구충·요충. 흡충/조충=편형동물(자웅동체·불완전소화관).

[기생충학 · 옴진드기]

59. 요양원 생활, 손가락 사이 소양·0.3mm 살아있는 벌레 — 절지동물은?



정답 ③

손가락 사이에 굴을 파는 0.3mm 진드기는 옴진드기(*Sarcoptes scabiei*)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 옴: 손가락사이·손목 굴(burrow)·야간 소양·집단발생(요양원). 치료=퍼메트린·이버멕틴, 접촉자 동시치료.

[기생충학 · 말라리아 재발]

60. 삼일열·난형열 수면소체 활성 방지를 위한 약제는?

정답 ⑤

간의 수면소체(hypnozoite)를 제거해 재발을 막는 약은 프리마퀸이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 삼일열/난형열: 간 수면소체→재발. 급성기=클로로퀸, 재발방지(수면소체 근치)=프리마퀸(G6PD 확인).