

2024년도 1교시 문항별 상세 해설


해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

1. 혈액·심혈관·조직 (1~20)

[조직학 · 혈액 성분]

1. 항응고 후 원심분리한 혈액의 표시된 층에 포함된 성분은?




정답 ②

적혈구층과 혈장층 사이의 얇은 층(연막·buffy coat)에는 백혈구와 혈소판이 모인다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 원심분리 혈액: 위=혈장(55%)·중간 연막(백혈구·혈소판)·아래=적혈구(45%). 혈청=혈장 섬유소원.

[해부학 · 심장 청진]

2. 대동맥판막 소리를 청진하기 가장 적합한 부위는?



정답 ①

대동맥판막은 오른쪽 2번 갈비사이(복장뼈 오른가장자리)에서 청진한다. 사진의 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 판막 청진: 대동맥판(우2늑간)·폐동맥판(좌2늑간)·삼첨판(좌하 복장연)·승모판(심첨).

[해부학 · 손목뼈 골절]

3. 손 쥐고 넘어짐, 손목 가쪽 통증 — 골절된 뼈는?




정답 ③

손을 쥐고 넘어진 뒤 해부학코담배갑 압통은 손배뼈(scaphoid) 골절이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 손배뼈 골절: 무혈괴사·불유합 위험. 초기 방사선 음성 가능. 코담배갑 압통.

[해부학 · 간십이지장인대]

4. 쓸개절제 중 작은그물막 자유모서리에서 확장된 구조물은?




정답 ③

작은그물막(간십이지장인대) 자유모서리의 확장 구조는 온쓸개관(총담관)일 가능성이 높다(담석 폐쇄 등). 정답 ③.

■ 관련 지식: 간십이지장인대(포탈삼주): 간문맥(뒤)·간동맥(앞왼)·온쓸개관(앞오른). 그물막구멍 앞경계.

[조직학 · 호흡상피]

5. 사진의 상피(거짓중층섬모원주)를 관찰할 수 있는 곳은?




정답 ④

거짓중층섬모원주상피는 기관(trachea) 등 호흡기도에서 관찰된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 상피: 거짓중층섬모원주(기도·기관)·중층편평(인두·성대주름·식도)·단층편평(폐포). 위치로 감별.

[해부학 · 기관지폐구역]

6. 호흡음 감소 부위의 기관지폐구역은?



정답 ⑤

사진 위치에 해당하는 구역은 아래엽 위구역(superior segment)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 기관지폐구역: 폐엽이 구역으로 나뉘고 각 구역기관지·동맥. 아래엽 위구역=누운 자세 흡인 호발.

[발생학 · 수정·첨체]

7. 투명층을 뚫는 효소가 든 정자 구조물은?


정답 ⑤

정자의 첨단체(acrosome)에 든 효소(히알루로니다아제·아크로신)가 투명층을 뚫는다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 수정: 정자 첨체반응→효소로 투명층 통과→피질과립반응(다정자 차단). 첨체=골지체 유래 모자.

[해부학 · 요관 손상]

8. 자궁절제 시 자궁동맥 결찰 중 손상 의심 구조물은?



정답 ①

자궁동맥 아래를 지나는 요관이 손상되기 쉽다(소변량 감소). 사진의 1, 정답 ①.

■ 관련 지식: 요관-자궁동맥 교차: 자궁동맥이 요관 위를 지남(water under the bridge). 자궁절제 합병증=요관손상.

[해부학 · 팔 신경]

9. 자전거 낙상 후 저린 부위 — 손상된 신경은?




정답 ①

손 안쪽(넷째·다섯째손가락) 감각 이상은 자신경 손상이다. 사진 부위 기준 정답 ①.

■ 관련 지식: 자신경: 손 안쪽 감각·갈퀴손. 정중신경=엄지쪽·원숭이손, 노신경=손등·손목처짐.

[조직학 · 단핵구]

10. 혈관 밖으로 나가 대식세포로 분화하는 세포는?




정답 ③

조직으로 이동해 대식세포가 되는 것은 단핵구(monocyte)다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 단핵구=가장 큰 백혈구·공팔형 핵→조직 대식세포(쿠퍼세포·미세아교·파골세포).

[조직학 · 혈액뇌장벽]

11. 혈액뇌장벽 그림에서 세포 A는?




정답 ①

모세혈관을 종말발로 감싸 장벽을 유도·유지하는 세포 A는 별아교세포다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 혈액뇌장벽: 내피 밀착이음(실제 장벽)+별아교세포 종말발(유도). 미세아교=면역, 희소돌기=말이집.

[조직학 · 쓸개모세관]

12. 간 주사전자현미경, 화살표를 따라 전달되는 것은?



정답 ②

간세포 사이 작은 관(쓸개모세관)을 따라 쓸개즙이 흐른다(간세포→쓸개관, 혈류와 반대). 정답 ②.

■ 관련 지식: 간: 굴모양혈관(혈류 문맥→중심정맥)과 쓸개모세관(담즙 중심→문맥, 반대방향)이 교차.

[발생학 · 고환 분화]

13. 고환으로 분화 시 버팀질세포가 분비하는 물질은?


정답 ④

고환 버팀세포(Sertoli)가 밀러관억제인자(MIF/AMH)를 분비해 밀러관(여성관)을 퇴화시킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 남성 분화: SRY→고환. 버팀세포=AMH(밀러관 퇴화), 사이질세포=테스토스테론(볼프관 발달).

[해부학 · 척수신경 뿌리]

14. 몸운동섬유와 자율 신경절전섬유로 구성된 부분은?




정답 ④

몸운동섬유와 자율(교감) 신경절전섬유가 함께 나가는 곳은 앞뿌리(ventral root)다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 척수신경: 앞뿌리(운동+교감 절전)·뒤뿌리(감각·등쪽뿌리신경절). 앞·뒤뿌리 합쳐 척수신경.

[해부학 · 척수원뿔]

15. 허리 MRI에서 척수 구조 A는?



정답 ④

척수가 끝나는 원뿔 모양 하단은 척수원뿔(conus medullaris)이다. 사진의 A, 정답 ④.

■ 관련 지식: 척수원뿔(성인 L1~2)→말총(신경뿌리)→종말근. 허리천자는 원뿔 아래(L3~4)에서.

[조직학 · 부갑상샘·저칼슘]

16. 갑상샘절제 후 경련(저PTH), 의도치 않게 제거된 세포는?

정답 ②

갑상샘 절제 중 함께 제거되어 저칼슘·테타니를 일으킨 것은 PTH를 분비하는 부갑상샘 으뜸세포(chief cell)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 부갑상샘: 으뜸세포(PTH·혈칼슘↑)·호산세포. 갑상샘수술 합병증=부갑상샘저하(저칼슘·테타니)·되돌이후두신경.

[발생학 · 착상 시기]

17. 수정 후 착상이 시작되는 시기는?

정답 ②

주머니배가 자궁내막에 착상을 시작하는 것은 수정 후 약 6일경이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 발생: 수정(0일)→분할→주머니배(5일)→착상 시작(6일)→완료(약 10~12일). 자궁관 이동.

[발생학 · 신경능선]

18. 신경능선에서 유래한 것은?


정답 ④

신경능선 유래는 부신속질(및 감각·자율신경절·멜라닌세포·슈반세포)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 신경능선: 부신속질·신경절·멜라닌세포·슈반세포·머리뼈 일부. 망막·표피=외배엽, 심장막=중배엽.

[해부학 · 추간판탈출]

19. 다리 저림, MRI 추간판 탈출 위치는?




정답 ④

허리 추간판탈출이 가장 흔한 부위는 L4~L5 사이이다. 사진 기준 정답 ④.

■ 관련 지식: 추간판탈출: L4~5·L5~S1 호발. 신경뿌리 압박→피부분절 방사통(좌골신경통).

[해부학 · 자궁바깥구멍]

20. 질경 관찰 시 중양의 오목한 부분(화살표)의 이름은?



정답 ⑤


자궁경부 중양의 오목한 구멍은 자궁바깥구멍(external os)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 자궁경부: 질로 돌출·자궁바깥구멍(질경으로 관찰)·자궁경부관·자궁속구멍. 세포검사(Pap) 부위.

II. 세포·발생·머리목 (21~40)

[조직학 · 피부 구조]

21. 피부 조직에서 표시한 '가' 구조물을 모식도에서 고르면?



정답 ④

피부 조직의 표시 구조에 해당하는 모식도 부위는 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 피부: 표피(각질층~바닥층)·진피(유두층·그물층)·피부밑조직. 부속기=털집·기름샘·땀샘.

[해부학 · 자궁동맥 기원]

22. 자궁동맥이 직접 분지되는 동맥은?

정답 ③

자궁동맥은 속영덩동맥의 앞줄기에서 기시한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 속영덩동맥 앞줄기: 자궁·질·속음부·폐쇄·아래볼기동맥. 자궁동맥은 요관 위를 지남.

[해부학 · 아데노이드]

23. 소아 코골이·코막힘·입벌리고 잠 — 원인 구조물은?


정답 ⑤

코막힘·코골이·구강호흡은 인두편도(아데노이드) 비대가 원인이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 발다이어 편도고리: 인두편도(아데노이드·코인두)·귀관·입천장·혀편도. 아데노이드 비대=코골이·중이염.

[조직학 · 핵소체]

24. rRNA 합성·리보솜 조립 초기가 진행되는 구조는?




정답 ①

rRNA 합성과 리보솜 조립이 시작되는 곳은 핵 안의 핵소체(nucleolus)다. 사진의 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 핵소체: rRNA 전사·리보솜 소단위 조립. 막 없음. 단백질 합성 왕성한 세포에서 큼.

[조직학 · 세포분열]

25. 방추사 완성·염색체가 적도판에 배열되는 시기는?




정답 ②

방추사가 완성되고 염색체가 적도판(중기판)에 배열되는 것은 중기(metaphase)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 체세포분열: 전기(응축)·중기(적도판 배열)·후기(자매염색분체 분리)·말기(핵 재형성).

[해부학 · 코결굴 배출]

26. CT의 코결굴 염증, 이 굴이 열리는 위치는?




정답 ④

위턱굴 등 대부분의 큰 코결굴은 중간코굴로 열린다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 코결굴 배출: 위턱·이마·앞/중간별집→중간코굴, 뒤별집→위코굴, 나비굴→나비별집오목, 코눈물관→아래코굴.

[신경해부 · 대뇌동맥 영역]

27. 원다리 감각소실·운동마비, 뇌혈관조영 혈전 위치는?



정답 ②

원다리 마비는 반대쪽(오른) 앞대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 조영에서 해당 혈관(B)이 정답 ②.

■ 관련 지식: 대뇌동맥 영역: 앞대뇌(반대쪽 다리)·중간대뇌(반대쪽 얼굴·팔)·뒤대뇌(시각).

[조직학 · 버팀세포]

28. 혈액고환장벽 형성, 분열·이동 안 함, 핵소체 뚜렷한 세포는?

정답 ②

정세관 안에서 혈액고환장벽을 형성하고 지지하는 것은 세르톨리세포(버팀세포)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 세르톨리세포: 혈액고환장벽·영양·AMH/inhibin/ABP. 사이질세포(Leydig)=테스토스테론.

[해부학 · 전립샘관]

29. 전립샘관이 열리는 곳은?


정답 ①

전립샘관은 요도 뒷벽 양옆의 전립샘굴(prostatic sinus)로 열린다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 전립샘요도 뒷벽: 정구(seminal colliculus)에 전립샘소실·사정관 개구, 그 양옆 고랑(전립샘굴)에 전립샘관.

[조직학 · 이자섬]

30. 저·고배율 조직사진, 이 조직이 분비하는 호르몬은?



정답 ②

외분비 이자 사이에 흩어진 세포섬(이자섬)이므로 보기 중 이자섬 호르몬인 글루카곤이 정답이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 이자섬: β (인슐린)· α (글루카곤)· δ (소마토스타틴). 갑상샘(티록신·소포)·부신(알도스테론)과 조직으로 감별.

[해부학 · 심장동맥]

31. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색 — 막힌 동맥은?


정답 ①

원심방·원심실 가쪽·뒤벽은 회돌이가지가 공급하므로 이 부위 경색은 회돌이가지 폐색이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 심장동맥: 앞벽·중격=LAD, 가쪽·뒤벽=회돌이가지, 아래벽·결절=오른심장동맥.

[신경해부 · 시각교차]

32. 양측두반맹 — 손상된 부분은?



정답 ④

양귀쪽반맹은 시각교차(optic chiasm) 손상(뇌하수체종양 등)이다. 사진의 4, 정답 ④.

■ 관련 지식: 시각로: 시신경(동측 실명)·시각교차(양귀쪽반맹)·시각로/부챗살(반대쪽 동측반맹).

[해부학 · 손목굴증후군]

33. 손저림·엄지두덩 위축 — 원인은?




정답 ⑤

엄지두덩 위축과 손가락 저림은 손목굴에서 정중신경 압박(손목굴증후군)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 손목굴증후군: 정중신경 압박·엄지두덩 위축·야간 저림·Tinel/Phalen 징후. 반복사용·임신·갑상샘저하.

[조직학 · 동맥 vs 정맥]

34. 사진과 같은 특징(두꺼운 근육벽)을 보이는 혈관은?



정답 ②

두꺼운 민무늬근 중막을 가진 근육형 동맥은 자동맥(ulnar artery)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 동맥=두꺼운 중막·동근 내강 vs 정맥=얇은 벽·판막·넓은 내강. 근육형 동맥=사지 동맥.

[해부학 · 기관지연축·미주신경]

35. 천식 기관지연축과 관련된 신경은?


정답 ③

기관지 평활근의 수축(연축)은 미주신경(부교감)이 매개한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 기도: 부교감(미주)=기관지수축·점액분비, 교감(β_2)=기관지확장. 천식 치료= β_2 작용제·항콜린제.

[조직학·부신·쿠싱]

36. 쿠싱 소견(덱사메타손 억제 실패·코티솔↑), 관련 기관은?



정답 ④

덱사메타손 억제에도 코티솔↑은 쿠싱증후군으로, 코티솔을 분비하는 부신(겉질)이 관련 기관이다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 부신겉질(GFR): 토리층=알도스테론, 다발층=코티솔, 그물층=안드로젠. 속질=카테콜아민.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[해부학·요관결석]

37. 옆구리~아랫배 심한 통증, X선 결석 위치는?



정답 ①

옆구리에서 아랫배로 퍼지는 급성 통증과 결석은 요관 결석이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 요관결석: 옆구리~서혜부 방사통(산통). 협착부(신우요관이음부·골반가장자리·방광이음부)에 걸림.

[해부학·창자 혈액공급]

38. 공장 출혈 시 결찰한 혈관은?

정답 ④

공장(빈창자)은 위창자간막동맥(SMA)이 공급한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 창자 혈류: 복강동맥(전장·위~십이지장상부)·SMA(중장·십이지장하부~횡행결장)·IMA(후장·좌결장~직장).

[해부학 · 치아]

39. 정중앙 기준 4번째 이는?


정답 ③

앞니(1·2)·송곳니(3)·첫째작은어금니(4) 순이므로 4번째는 첫째작은어금니다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 치식(반쪽 8개): 안쪽앞니·가쪽앞니·송곳니·첫째/둘째작은어금니·첫째/둘째/셋째큰어금니.

[발생학 · 가로막 발생]

40. 신생아 가로막 발생 결함(호흡곤란) — 안 만들어진 구조물은?



정답 ④

선천 가로막탈장은 가슴막복막(pleuroperitoneal membrane)이 제대로 형성되지 않아 생긴다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 가로막 발생 4요소: 가로사이막·가슴막복막·식도간막·몸통벽. 가슴막복막 결함=선천가로막탈장(주로 좌후방).

Ⅲ. 신경·순환·통합 (41~60)

[신경해부 · 언어결질]

41. 뇌졸중, 시각 정상이나 글 이해 못함 — 병변 혈관은?

정답 ③

시각은 정상인데 글 이해가 안 되는 것은 언어이해 영역(모이랑·베르니케) 병변으로 중간대뇌동맥 영역이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 중간대뇌동맥=가쪽 대뇌(언어·얼굴/팔 운동감각). 베르니케(이해)·모이랑(읽기). 뒤대뇌=시각.

[해부학 · 가슴 방사선]

42. 가슴 방사선에서 화살표 구조물은?



정답 ④

원심장경계 위쪽의 돌출부(대동맥혹)는 대동맥활(aortic arch)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 가슴 방사선 원경계(위→아래): 대동맥활·폐동맥·원심방귀·원심실. 오른경계=위대정맥·오른심방.

[해부학 · 발목 인대]

43. 발목 안쪽번짐 손상 — 손상 예상 구조물은?


정답 ⑤

안쪽번짐 손상은 가쪽인대 중 가장 약한 앞목말종아리인대(ATFL)가 먼저 다친다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 발목 가쪽인대(ATFL 최다손상)=안쪽번짐. 세모인대(안쪽·강함)=가쪽번짐에서 손상.

[발생학 · 이차복막뒤장기]

44. 등쪽장간막이 사라져 성인에서 복막뒤에 있게 되는 부위는?



정답 ③

처음엔 장간막이 있다가 뒤벽에 융합되어 복막뒤가 되는 이차복막뒤장기에 해당하는 부위 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 이차복막뒤장기: 십이지장(2·3부)·이자·오름/내림장·췌장(췌장간막 융합). 일차=공팔·부신.

[해부학 · ADH 합성]

45. 삼투압↑ 시 분비되어 집합관 수분 재흡수를 촉진하는 호르몬의 생성 장소는?

정답 ③

항이노호르몬(ADH)은 시상하부에서 합성되어 뇌하수체 뒤엽에서 분비된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: ADH: 시상하부(시각위·뇌실결핵) 합성→뒤엽 저장·분비→집합관 수분 재흡수(아쿠아포린-2).

감별/오답: ⑤뒤엽은 분비 장소이지 합성 장소가 아니다.

[해부학 · 삼차신경·대상포진]

46. 얼굴 대상포진, 병변 부위 분포 신경은?



정답 ④

사진의 병변 분포에 해당하는 삼차신경 분지는 아래턱신경(V3)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 삼차신경 3분지: 눈신경(V1·이마)·위턱신경(V2·뺨)·아래턱신경(V3·턱). 대상포진=신경절 잠복 재활성.

[조직학 · 단백질 위치 검출]

47. Caveolin-2 단백질의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ⑤

조직 내 단백질의 위치를 항체로 검출하는 것은 면역조직화학염색이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 기법·표적: 서던(DNA)·노던(RNA)·웨스턴(단백질 정량)·면역조직화학(조직 내 단백질 위치)·ISH(핵산 위치).

[조직학 · 말이집]

48. 여러 축삭의 말이집을 만드는 세포는?


정답 ⑤

중추에서 하나의 세포가 여러 축삭을 말이집으로 감싸는 것은 희소돌기아교세포다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 말이집: 중추=희소돌기아교세포(하나가 여러 축삭), 말초=슈반세포(하나가 한 축삭·한 마디).

[조직학 · 2형 폐포세포]

49. 폐 조직에서 표면활성제를 분비하는 세포는?



정답 ③

표면활성제는 입방형 2형 폐포세포가 분비한다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 폐포: 1형(얇은 가스교환)·2형(표면활성제·재생). 신생아호흡곤란증후군=표면활성제 부족(미숙아).

[해부학 · 경막바깥혈중]

50. 머리 외상 후 혈종(CT) — 혈종 공간은?



정답 ②

볼록렌즈(lens) 모양 혈종은 경막바깥공간(중간뇌막동맥 손상)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 머리속출혈: 경막바깥(렌즈형·중간뇌막동맥·명료기)·경막밑(초승달형·다리정맥)·거미막밑(동맥류).

[해부학 · 겨드랑신경]

51. 위팔뚝 외과목 골절, 팔 벌림 불가 — 손상 신경은?


정답 ②

위팔뚝 외과목 골절은 겨드랑신경을 손상시켜 어깨세모근 마비(벌림 곤란)·어깨 감각소실을 일으킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 겨드랑신경: 위팔뚝 외과목 감싸 주행→골절/어깨탈구에 취약. 어깨세모근·작은원근·어깨 가쪽 감각.

[신경해부 · 외안근·뇌신경핵]

52. 복시·눈 정렬 이상, 기능이상 뇌신경핵의 위치는?




정답 ③

사진의 눈 정렬 이상에 해당하는 뇌신경(갓돌림/도르래)의 핵은 다리뇌(및 중간뇌)에 있다. 갓돌림신경핵=다리뇌. 정답 ③.

■ 관련 지식: 외안근 뇌신경핵: 눈돌림(III)·도르래(IV)=중간뇌, 갓돌림(VI)=다리뇌. LR6SO4.

[신경해부 · 꼬리핵]

53. 뇌 관상절단에서 꼬리핵에 해당하는 것은?



정답 ①

가쪽뇌실 벽을 따라 활처럼 굽은 회색질이 꼬리핵(caudate nucleus)이다. 사진의 1, 정답 ①.

■ 관련 지식: 바닥핵: 꼬리핵(가쪽뇌실 따라)·조각비핵·창백핵. 꼬리핵+조각비핵=줄무늬체.

[해부학 · 원심방·식도]

54. 식도조영에서 좁아진 부위, 커진 심장 부위는?




정답 ①

식도는 원심방 바로 뒤를 지나므로 원심방 확장 시 식도가 눌린다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 식도 후방 관계: 원심방·가슴대동맥·척주. 원심방 확장(승모판질환)→식도 압박·연하곤란.

[조직학 · 치밀반점]

55. 토리결장장치에서 소변 NaCl 농도를 감지하는 부분은?



정답 ③

먼쪽세관이 토리와 접하는 곳의 치밀반점(macula densa)이 세관액 NaCl을 감지한다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 토리결장치: 치밀반점(NaCl 감지)·토리결세포(레닌)·토리바깥사이질세포. 토리사구체되먹임·RAAS.

[해부학 · 정삭막]

56. 속정삭근막과 연결된 앞배벽 구조물은?


정답 ②

속정삭근막은 배가로근막(transversalis fascia)이 이어진 것이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 정삭막: 바깥정삭근막(배바깥빗근널힘줄)·고환올림근막(배속빗근)·속정삭근막(배가로근막).

[조직학 · 뼈파괴세포]

57. 뼈 조직에서 뼈 흡수와 관련된 세포는?



정답 ③

뼈를 흡수하는 다핵 세포는 뼈파괴세포(osteoclast)다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 뼈세포: 뼈모세포(형성)·뼈세포(유지)·뼈파괴세포(흡수·다핵·단핵구계). 재형성 균형=뼈량 유지.

[해부학 · 이자 혈액공급]

58. 이자머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리에 혈액 공급하는 동맥은?

정답 ①

이자 몸통·꼬리는 지라동맥의 이자가지가 공급한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 이자 혈류: 머리=위·아래이자십이지장동맥, 몸통·꼬리=지라동맥(큰이자동맥·이자가지).

[해부학 · 뒤십자인대]

59. 종아리가 과도하게 뒤로 빠짐(후방당김) — 손상 구조물은?




정답 ④

고정된 넓적다리에 대해 종아리가 뒤로 빠지는 것(후방당김검사 양성)은 뒤십자인대(PCL) 손상이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 무릎: 앞십자인대(정강뼈 앞이동 방지·전방당김)·뒤십자인대(뒤이동 방지·후방당김). 반달=충격흡수.

[발생학 · 율러관·자궁관]

60. 자궁관으로 발생하는 원기가 되는 구조물은?



정답 ①

자궁관은 율러관(중간콩팥결관)에서 발생한다. 사진의 1, 정답 ①.

■ 관련 지식: 율러관(중간콩팥결관): 자궁관·자궁·질 상부로 분화(여성). 볼프관(중간콩팥관)=부고환·정관(남성).