

2022년도 1교시 문항별 상세 해설


해부학·조직학·발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 발생·조직·순환 (1~20)

[해부학 · 가로막 발생]

1. 신생아가 심한 호흡곤란으로 사망, 부검에서 가로막 발생 결함 — 제대로 만들어지지 않은 구조물은?



정답 ④

가로막의 뒤가쪽 결손(선천가로막탈장)은 가슴막복막막(pleuroperitoneal membrane)이 닫히지 않아 생긴다. 정답 ④.

질환 개요: 선천가로막탈장(보크달레크형): 가슴막복막막이 닫히지 않아 배 장기가 가슴안으로 올라가 허파를 눌러 폐형성저하·호흡곤란을 일으킨다. 대부분 왼쪽 뒤가쪽에 생긴다.

■ 보기 해설

- ① 허파싹(lung bud) — 폐 발생 기원이지 가로막 결손 부위가 아니다.
- ② 가로사이막(septum transversum) — 가로막의 중심널힘줄이 되나 결손 호발부가 아니다.
- ③ 식도간막(mesentery of esophagus) — 가로막 다리 형성에 기여하나 뒤가쪽 결손과 무관하다.
- ④ 가슴막복막막(pleuroperitoneal membrane) — 닫히지 않으면 뒤가쪽 결손(선천가로막탈장)이 된다 ◀ 정답
- ⑤ 가슴막심장막(pleuropericardial membrane) — 심장막안 분리에 관여하지 가로막 결손 부위가 아니다.

■ 관련 지식: 가로막은 가로사이막(중심널힘줄), 가슴막복막막, 식도간막, 몸통벽 근육에서 만들어진다. 가슴막복막막이 닫히지 않으면 뒤가쪽 결손으로 배 장기가 가슴으로 탈출한다.

[조직학 · 근육형 동맥]

2. 혈관의 광학현미경 사진 — 두꺼운 민무늬근육 중막이 특징인 이 혈관은?




그림 판독

혈관 벽 — 속막 안쪽 물질 모양 속탄력판과 두꺼운 민무늬근육 중막.

두꺼운 근육 중막은 중간크기 근육형 동맥(노동맥)의 특징이다.

정답 ①

두꺼운 민무늬근육 중막을 가진 것은 근육형 동맥(노동맥)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 노동맥(radial artery) — 두꺼운 민무늬근 중막을 가진 근육형(분배) 동맥이다 ◀ 정답

② 넓다리정맥(femoral vein) — 정맥이라 중막이 얇다.

③ 허파동맥(pulmonary trunk) — 탄력형 동맥이다.

④ 오름대동맥(ascending aorta) — 탄력형 동맥이다.

⑤ 아래대정맥(inferior vena cava) — 큰 정맥이다.

■ 관련 지식: 동맥은 탄력형(대동맥·허파동맥)과 근육형(노동맥 등 중간동맥)으로 나뉜다. 근육형 동맥은 속탄력판이 뚜렷하고 두꺼운 민무늬근육 중막으로 혈류를 조절한다. 정맥은 같은 크기라도 벽이 얇고 근육이 적다.

[조직학 · 돌창자]

3. 소화관 현미경 사진 — 융모와 함께 점막밑에 림프소절(파이어판)이 보이는 이 장기는?



그림 판독

창자 벽 — 손가락 모양 융모와 함께 벽 속에 큰 림프소절 무리(파이어판).

융모 + 파이어판(집합림프소절)은 돌창자의 특징이다.

정답 ②

융모와 파이어판(집합림프소절)이 함께 보이는 것은 돌창자(ileum)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 위(stomach) — 위샘이 있고 융모가 없다.

② 돌창자(ileum) — 융모와 파이어판(집합림프소절)이 함께 보인다 ◀ 정답

③ 잘록창자(colon) — 융모가 없고 반달주름이 있다.


④ 빈창자(jejunum) — 융모는 있으나 파이어판이 두드러지지 않는다.

⑤ 샘창자(duodenum) — 브루너샘이 특징이다.

■ 관련 지식: 작은창자 중 돌창자는 점막밑에 집합림프소절인 파이어판이 발달한다. 빈창자는 융모가 길지만 파이어판이 드물고, 샘창자는 점막밑에 브루너샘이 있어 구별된다.

[해부학·가슴벽 층]

4. 거드랑정중선 다섯째 갈비사이공간으로 가슴안보개를 넣을 때 가장 마지막으로 뚫는 가슴벽 구조물은?



정답 ①

바깥에서 가슴안으로 들어갈 때 마지막으로 뚫는 것은 가슴막안 직전의 벽가슴막(pleural cavity)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 벽가슴막(pleural cavity) — 가슴막안 직전 마지막으로 뚫는 층이다 ◀ 정답
- ② 허파가슴막(visceral pleura) — 폐 표면을 덮어 벽쪽보다 안쪽이다.
- ③ 가슴속근막(endothoracic fascia) — 벽가슴막 바깥의 결합조직층이다.
- ④ 앞톱니근(serratus anterior muscle) — 가슴벽 바깥 근육이다.
- ⑤ 맨속갈비사이근(innermost intercostal muscle) — 가슴속근막 바깥의 근육층이다.

■ 관련 지식: 가슴벽은 바깥에서 안으로 피부→근육(앞톱니근·갈비사이근)→가슴속근막→벽가슴막 순이다. 가슴막안으로 진입하기 직전 마지막으로 뚫리는 막이 벽가슴막이다.

[해부학·쿠싱증후군·부신]

5. 달덩이얼굴·목뒤 지방 축적, 덱사메타손 억제검사에서 코티솔 미억제(10 µg/dL) — 원인 장기는?




그림 판독

사진5-1 = 달덩이얼굴·피부선조 등 쿠싱증후군 외형.

사진5-2 = 목·가슴·배의 내분비 장기를 A~E로 표시.

A = 부갑상샘, B = 갑상샘, C = 가슴샘, D = 부신(콩팥 위) — 코티솔 분비(정답), E = 콩팥.

정답 ④

코티솔이 억제되지 않는 쿠싱증후군의 원인 장기는 코티솔을 분비하는 부신(D)이다. 정답 ④.

질환 개요: 쿠싱증후군: 코티솔 과다로 중심비만·달덩이얼굴·목뒤 지방(버팔로 힙프)·피부선조·고혈당이 나타난다. 밤에 덱사메타손을 취도 다음날 코티솔이 억제되지 않으면 진단을 뒷받침한다.

■ 보기 해설

- ① A(부갑상샘) — 부갑상샘호르몬(칼슘조절)을 내며 코티솔과 무관하다.
- ② B(갑상샘) — 갑상샘호르몬을 내며 코티솔과 무관하다.
- ③ C(가슴샘) — T세포 성숙의 면역 장기로 코티솔과 무관하다.
- ④ D(부신) — 결절에서 코티솔을 분비. 쿠싱의 원인 장기 ◀ 정답
- ⑤ E(콩팥) — 소변을 만드는 장기로 코티솔을 분비하지 않는다.

■ 관련 지식: 부신결절은 코티솔·알도스테론·안드로젠을 분비한다. 쿠싱증후군은 코티솔 과다 상태로, 콩팥 위에 얹힌 부신이 원인 장기다. 덱사메타손 억제검사로 되먹임 이상을 확인한다.

[조직학 · 안구 바깥막]

6. 안구 조직 표본에서 가장 바깥쪽 A층의 이름은?




그림 판독

안구 벽 단면 — 바깥에서 안으로 A(섬유막)·포도막·망막.

A = 가장 바깥의 질긴 흰색 섬유막(공막).

정답 ②

안구의 가장 바깥층은 질긴 섬유막인 공막(sclera)이다(앞쪽에서는 각막으로 이어짐). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 망막(retina) — 가장 안쪽 감광층이다.
- ② 공막(sclera) — 가장 바깥의 질긴 섬유막이다(앞쪽은 각막) ◀ 정답
- ③ 각막(cornea) — 앞쪽 투명 섬유막으로 뒤쪽 바깥막은 공막이다.
- ④ 포도막(uvea) — 중간막(맥락막·섬모체·홍채)이다.
- ⑤ 맥락막(choroid) — 포도막의 일부인 중간막이다.

■ 관련 지식: 안구 벽은 바깥부터 섬유막(공막·각막)·혈관막(포도막=맥락막·섬모체·홍채)·신경막(망막)의 세 층이다. 뒤쪽 바깥층은 흰색의 질긴 공막이다.

[해부학 · 기관지연축 신경]

7. 천식발작과 기관지연축(bronchospasm)과 관련된 신경은?

정답 ①

기관지 민무늬근육을 수축시키는 것은 부교감 신경인 미주신경이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 미주신경(vagus nerve) — 부교감으로 기관지 민무늬근을 수축시킨다 ◀ 정답
- ② 가로막신경(phrenic nerve) — 가로막 운동신경이다.
- ③ 갈비사이신경(intercostal nerve) — 가슴벽 근육·피부 신경이다.
- ④ 큰내장신경(greater splanchnic nerve) — 교감(내장)신경이다.
- ⑤ 되돌이후두신경(recurrent laryngeal nerve) — 후두근 지배 신경이다.

■ 관련 지식: 기관지 민무늬근육은 부교감(미주신경)이 수축, 교감(β_2)이 이완시킨다. 천식의 기관지연축은 미주신경 매개 수축이 관여하며, β_2 작용제로 이완시켜 치료한다.

[조직학 · 면역조직화학]

8. 타이로신수산화효소(단백질)의 신경조직 내 분포를 확인하려면 시행할 실험기법은?

정답 ⑤

특정 단백질의 조직 내 위치를 항체로 보는 것은 면역조직화학염색법이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 니슬염색(Nissl stain) — 신경세포 rER를 보는 염색이다.
- ② 은염색(silver staining) — 신경섬유·세망섬유 염색이다.
- ③ 노던블롯법(Northern blot) — RNA 검출법이다.
- ④ 웨스턴블롯법(Western blot) — 단백을 검출하나 조직 내 위치는 못 본다.
- ⑤ 면역조직화학염색법(immunohistochemistry) — 항체로 단백질의 조직 내 위치를 본다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 면역조직화학염색은 표적 단백질에 특이 항체를 붙여 조직 절편에서 그 위치와 분포를 시각화한다. 웨스턴블롯은 단백질 유무·양은 알지만 조직 내 위치는 알 수 없다.

[해부학 · 위후두신경]

9. 갑상샘 수술 후 쉼 목소리, 위갑상동맥과 함께 지나는 신경 손상으로 성대 긴장저하 — 어느 신경의 가지인가?

정답 ②

위갑상동맥과 함께 달리는 위후두신경 바깥가지는 미주신경의 가지다(반지방폐근 마비→성대 긴장저하). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve) — 표정근·미각 신경이다.
- ② 미주신경(vagus nerve) — 위후두신경(반지방폐근)은 미주의 가지다 ◀ 정답
- ③ 더부신경(accessory nerve) — 목빗근·등세모근 지배다.
- ④ 혀밑신경(hypoglossal nerve) — 혀 근육 운동신경이다.
- ⑤ 혀인두신경(glossopharyngeal nerve) — 혀 뒤 1/3 미각·인두 신경이다.

■ 관련 지식: 후두는 미주신경의 위후두신경과 되돌이후두신경이 지배한다. 위후두신경 바깥가지는 위갑상동맥과 함께 달리며 반지방폐근(성대 긴장)을 지배해, 손상되면 성대 긴장이 떨어져 목소리에 힘이 없어진다.

[조직학 · 토리결세포·레닌]

10. 콩팥단위 모식도에서 혈압을 조절하고 단백질분해효소(레닌)를 분비해 안지오텐신 I을 만들게 하는 세포는?




그림 판독

콩팥 토리결장치 모식도 — A~E로 표시.

A = 토리결세포(들세동맥 벽의 과립세포) — 레닌을 분비(정답).

B = 토리 내 메산지움세포, C = 치밀반(macula densa, 먼쪽세관·NaCl 감지), D = 사구체외 메산지움세포, E = 발세포(podocyte).

정답 ①

레닌을 분비하는 것은 들세동맥 벽의 토리결세포(방사구체세포, A)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A(토리결세포) — 레닌 분비, 혈압 조절 ◀ 정답
- ② B — 레닌 분비 세포가 아니다.
- ③ C — 토리주머니 공간 등으로 세포가 아니다.
- ④ D — 세동맥 부위로 레닌 분비 과립세포가 아니다.
- ⑤ E — 주변 조직으로 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 들세동맥 벽의 토리결세포(레닌 분비)와 먼쪽세관의 치밀반으로 이뤄진다. 혈압·나트륨이 낮으면 토리결세포가 레닌을 분비해 안지오텐신 I을 만들고, 이어 레닌-안지오텐신계가 혈압을 올린다.

[신경해부 · 청각경로·사이뇌]

11. 소리가 청각겉질로 전달되는 경로 구조물 중 사이뇌(diencephalon)에 있는 것은?

정답 ④

청각경로에서 사이뇌(시상)에 속한 중계핵은 안쪽무릎체(medial geniculate body)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 위둔덕(superior colliculus) — 시각반사 중계핵이다.
- ② 아래둔덕(inferior colliculus) — 청각 중간뇌 중계핵으로 사이뇌가 아니다.
- ③ 가쪽무릎체(lateral geniculate body) — 시각 시상 중계핵이다.
- ④ 안쪽무릎체(medial geniculate body) — 청각 시상(사이뇌) 중계핵이다 ◀ 정답
- ⑤ 위올리브핵(superior olivary nucleus) — 뇌줄기 청각핵이다.

■ 관련 지식: 청각경로는 달팽이핵→위올리브핵→아래둔덕(중간뇌)→안쪽무릎체(시상)→청각겉질로 이어진다. 이 중 사이뇌(시상)에 속한 것은 안쪽무릎체다. 시각의 가쪽무릎체와 짝을 이뤄 기억하면 좋다.

12. 가정주부의 만성 손 저림, 엄지두덩 위축 — 원인은?



그림 판독

손바닥 사진 — 엄지두덩(무지구) 근육이 위축되어 납작함.
엄지두덩 위축은 정중신경 압박(손목굴증후군)의 소견이다.

정답 ⑤

엄지두덩 위축과 손가락 저림은 손목굴에서 정중신경 압박(손목굴증후군)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 손목굴증후군: 손목굴에서 정중신경이 눌러 엄지·검지·중지의 저림과 통증이 생기고, 오래되면 엄지두덩 근육이 위축된다.
반복 손목 사용·임신·갑상샘저하 등이 위험 인자다.

■ 보기 해설

- ① 목뼈의 뼈관절염 — 이 국소 증상의 원인이 아니다.
- ② 자신경(ulnar nerve)의 반복손상 — 넷째·다섯째 손가락 증상이다.
- ③ 안쪽위관절염기에서 자신경 압박 — 자신경 영역 증상이다.
- ④ 위팔세갈래근 비대로 인한 노신경(radial nerve) 압박 — 손목처짐 등 노신경 증상이다.
- ⑤ 손목굴(carpal tunnel)에서 정중신경(median nerve) 압박 — 엄지두덩 위축·손가락 저림(손목굴증후군)이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 정중신경은 손목굴을 지나 엄지두덩 근육과 가쪽 세 손가락 반의 감각을 담당한다. 손목굴에서 눌리면 그 영역의 저림과 엄지두덩 위축이 나타난다.

13. 약물로 ADH 분비가 저하되어 고나트륨혈증·희석뇨(요붕증 양상) — ADH가 주로 작용하는 부위는?




그림 판독

공팔단위 모식도 — A(토리)·B(토리쪽급슬세관=근위세관)·C(헨레고리)·D(먼쪽급슬세관)·E(집합관).
E = 집합관 — ADH가 물 재흡수(아쿠아포린)를 늘리는 부위(정답).

정답 ⑤

ADH는 집합관(E)에 작용해 물 재흡수를 늘린다. 정답 ⑤.

질한 개요: 요붕증: ADH가 부족(중추성)하거나 공팔이 반응하지 않으면(신성) 집합관에서 물을 재흡수하지 못해 다량의 묽은 소변과 갈증·고나트륨혈증이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① A(토리) — 여과가 일어나는 곳으로 ADH 작용부위가 아니다.
- ② B(토리결세포) — 레닌 분비 세포다.
- ③ C(헨레고리) — 농도기울기 형성 부위다.
- ④ D(먼쪽세관) — 알도스테론 등이 작용하나 ADH 주 작용부는 집합관이다.
- ⑤ E(집합관) — ADH가 아쿠아포린을 늘려 물 재흡수 ◀ 정답

■ 관련 지식: ADH(바소프레신)는 집합관 주세포의 아쿠아포린-2를 세포막으로 이동시켜 물 재흡수를 늘린다. 분비가 저하되면 물을 붙잡지 못해 희석뇨와 고나트륨혈증이 생긴다.

[조직학 · 토리기저막]

14. 콩팥소체 투과전자현미경에서 IV형 아교섬유·라미닌·헤파란황산이 풍부하고 음전하로 선택여과하는 부분은?




그림 판독

토리 여과장벽 전자현미경 — A(발돌기)·B(여과틈새)·C(기저막GBM)·D(내피 창)·E(내피세포).

C = 토리기저막(GBM) — IV형 콜라겐·라미닌·음전하 헤파란황산으로 선택여과(정답).

정답 ③

IV형 콜라겐·라미닌·음전하 헤파란황산으로 선택여과하는 것은 토리기저막(C)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① A(발돌기) — 발세포 돌기로 여과틈새를 만드나 이 성분의 층은 아니다.
- ② B — 해당 성분의 층이 아니다.
- ③ C(토리기저막) — IV형 콜라겐·라미닌·헤파란황산·음전하 ◀ 정답
- ④ D(내피) — 창을 가진 내피로 큰 혈구를 거른다.
- ⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽은 창내피·토리기저막·발세포 여과틈새의 세 층이다. 기저막은 IV형 콜라겐·라미닌과 음전하 헤파란황산으로 이뤄져 크기와 전하로 단백질을 선택적으로 거른다. 손상되면 단백뇨가 생긴다.

[해부학 · 배뇨 신경]

15. 배뇨 시 방광배뇨근을 수축시키는 신경은?

정답 ④

방광배뇨근 수축은 부교감인 골반내장신경이 담당한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 미주신경(vagus nerve) — 골반 장기 배뇨근을 지배하지 않는다.
- ② 음부신경(pudendal nerve) — 바깥요도조임근(수의) 신경이다.
- ③ 아래볼기신경(inferior gluteal nerve) — 큰볼기근 운동신경이다.
- ④ 골반내장신경(pelvic splanchnic nerve) — 부교감으로 방광배뇨근을 수축시킨다 ◀ 정답
- ⑤ 영치내장신경(sacral splanchnic nerve) — 교감신경으로 배뇨근 이완 쪽이다.

■ 관련 지식: 배뇨는 부교감(골반내장신경, S2-4)이 배뇨근을 수축시키고 속요도조임근을 이완시켜 일어난다. 교감(영치·아랫배내장신경)은 저장을, 음부신경은 바깥조임근(수의 조절)을 담당한다.

[해부학 · 뒤십자인대]

16. 태클 후 무릎통증, 고정된 넓적다리에 대해 종아리가 뒤로 과도하게 빠짐(뒤당김 양성) — 손상 구조물은?



그림 판독

무릎 MRI(시상면) — 원 안 십자인대 부위.

종아리가 뒤로 빠지는 뒤당김검사 양성은 뒤십자인대 손상을 시사한다.

정답 ⑤

종아리가 뒤로 빠지는 뒤당김검사 양성은 뒤십자인대(PCL) 손상이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 가쪽반달(lateral meniscus) — 반월연골 손상이다.
- ② 안쪽반달(medial meniscus) — 반월연골 손상이다.
- ③ 앞십자인대(anterior cruciate ligament) — 앞당김검사(정강뼈 앞이동) 양성이다.
- ④ 안쪽결인대(medial collateral ligament) — 밸구스 부하에서 벌어진다.
- ⑤ 뒤십자인대(posterior cruciate ligament) — 종아리가 뒤로 빠지는 뒤당김검사 양성이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 앞십자인대는 정강뼈가 앞으로 빠지는 것을, 뒤십자인대는 뒤로 빠지는 것을 막는다. 종아리가 뒤로 밀리는 뒤당김검사 양성은 뒤십자인대 손상을 뜻한다.

[해부학 · 대뇌동맥고리 동맥류]

17. 심한 두통, 3차원 재구성 영상에서 대뇌동맥고리의 동맥류가 확인된 혈관은?




그림 판독

대뇌동맥고리 3차원 혈관조영 — 위쪽에 주머니 모양 동맥류(aneurysm).

앞교통·앞대뇌동맥 부위의 동맥류를 보여준다.

정답 ②

영상에서 동맥류가 있는 혈관은 앞대뇌동맥(앞교통동맥 부위)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 속목동맥(internal carotid artery) — 동맥류 부위이나 이 영상 소견은 앞대뇌동맥이다.
- ② 앞대뇌동맥(anterior cerebral artery) — 앞교통동맥 부위 동맥류 호발이다 ◀ 정답
- ③ 중간대뇌동맥(middle cerebral artery) — 다른 호발부이나 이 소견이 아니다.
- ④ 뒤대뇌동맥(posterior cerebral artery) — 이 부위가 아니다.
- ⑤ 뒤교통동맥(posterior communicating artery) — 동맥류 호발부이나 이 소견이 아니다.

■ 관련 지식: 대뇌동맥고리(윌리스고리)의 동맥류는 앞교통동맥·뒤교통동맥·중간대뇌동맥 갈림에서 흔하다. 파열 시 거미막밑출혈로 뇌막두통을 일으킨다.

[해부학 · 노신경·손목처짐]

18. 위팔뚝 골절 후 손목을 젖히지(펴) 못함(손목처짐) — 손상 신경은?

정답 ②

위팔뚝 몸통 골절로 손목펴근을 지배하는 노신경이 손상되면 손목처짐이 온다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 자신경(ulnar nerve) — 갈퀴손(넷째·다섯째)과 관련된다.
- ② 노신경(radial nerve) — 위팔뚝 몸통 골절로 손상돼 손목펴근 마비(손목처짐)가 온다 ◀ 정답
- ③ 정중신경(median nerve) — 원숭이손·엄지대립 장애다.
- ④ 겨드랑신경(axillary nerve) — 어깨세모근 마비다.
- ⑤ 근육피부신경(musculocutaneous nerve) — 팔꿈치굽힘근 신경이다.

■ 관련 지식: 노신경은 위팔뚝 몸통의 노신경고랑을 지나 아래팔 펴근을 지배한다. 위팔뚝 몸통 골절로 손상되면 손목과 손가락을 펴지 못하는 손목처짐이 생긴다.

[조직학 · 윤활막]

19. 무릎관절 모식도에서 활액을 분비해 뼈(연골)를 보호하고 양분을 공급하는 구조물은?




그림 판독

윤활관절 모식도 — A·B(관절연골 등)·C(윤활막)·D(관절안).

C = 윤활막(활막) — 활액을 분비해 연골을 윤활·영양(정답).

정답 ③

활액을 분비해 관절을 윤활·영양하는 것은 윤활막(활막, C)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① A — 관절주머니 바깥층 등으로 활액 분비부가 아니다.
- ② B — 관절연골로 활액을 분비하지 않는다.
- ③ C(윤활막) — 활액을 분비해 연골을 윤활·영양 ◀ 정답
- ④ D — 관절안(활액이 차는 공간)으로 분비 구조가 아니다.
- ⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 윤활관절은 관절주머니 속면을 윤활막이 덮어 활액을 분비한다. 활액은 관절을 매끄럽게 하고 무혈관인 관절연골에 영양을 공급한다.

[신경해부 · 뇌활]

20. 대뇌 수평절단에서 B(관자엽·가쪽뇌실 아래쪽에 접함)에서 시상하부로 이어지는 C자로 굽은 A 구조물은?




그림 판독

대뇌 수평절단 — A(굽은 섬유다발)·B(관자엽 구조).

B = 해마, A = 뇌활(fornix) — 해마에서 시상하부(유두체)로 가는 C자 섬유다발(정답).

정답 ①

해마(B)에서 나와 시상하부로 가는 C자 섬유다발은 뇌활(fornix)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 뇌활(fornix) — 해마에서 유두체로 가는 C자 섬유다발이다 ◀ 정답

② 분계섬유줄(stria terminalis) — 편도체에서 나오는 다발이다.

③ 활꼴다발(arcuate fasciculus) — 브로카·베르니케 연결다발이다.

④ 갈고리다발(uncinate fasciculus) — 이마·관자엽 연결다발이다.

⑤ 시상섬유줄(stria medullaris of thalamus) — 시상 위 다발이다.

■ 관련 지식: 뇌활은 해마의 주 출력섬유로, 해마에서 나와 C자로 굽어 시상하부의 유두체로 간다. 파페츠회로의 일부로 기억에 관여한다.

II. 신경·내분비·소화·순환 (21~40)

[조작학 · 난자 감수분열]

21. 기초체온표에서 화살표 시기(배란 직전)의 정상적인 난자 상태는?




그림 판독

기초체온 그래프 — 화살표는 체온이 오르기 직전(배란기).

배란 시 난자는 제2감수분열 중기에서 멈춘 상태로 배출된다.

정답 ⑤

배란되는 난자는 이차난모세포 중기(제2감수분열 중기)에서 정지해 있다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 일차난모세포 전기 — 태생기에 정지하는 단계다.

② 일차난모세포 중기 — 이 정지 단계가 아니다.

③ 이차난모세포 전기 — 배란 시 정지 단계가 아니다.

④ 이차난모세포 전기 — 배란 정지 단계가 아니다.

⑤ 이차난모세포 중기 — 제2감수분열 중기에 정지한 채 배란된다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난자는 태아기에 제1감수분열 전기에서 멈췄다가, 배란 직전 제1감수분열을 마치고 이차난모세포가 되어 제2감수분열 중기에서 다시 멈춘 채 배란된다. 수정이 되어야 제2감수분열을 완료한다.

[조직학 · 귀밀샘관 개구부]

22. 침샘 현미경(장액샘)에서 이 침샘의 침샘관 구멍이 열리는 곳은?




그림 판독

침샘 조직 — 진한 장액파리 위주(장액샘).

순수 장액샘은 귀밀샘으로, 관(스텐센관)이 위턱 큰어금니 맞은편 볼점막에 열린다.

정답 ④

순수 장액샘(귀밀샘)의 관은 위턱 큰어금니 근처 입안뜰(볼점막)에 열린다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 성곽유두 옆 — 혀뒤 미각유두 부위다.
- ② 물렁입천장 주변 — 귀밀샘관 개구부가 아니다.
- ③ 혀주름띠 옆 혀밑공간 — 턱밑샘·혀밑샘관 개구부다.
- ④ 위턱 큰어금니 근처 입안뜰 — 귀밀샘관(Stensen)이 볼점막에 열린다 ◀ 정답
- ⑤ 아래턱 앞니 안쪽 고유입공간 — 귀밀샘관 개구부가 아니다.

■ 관련 지식: 귀밀샘은 순수 장액샘으로 관이 위턱 둘째 큰어금니 맞은편 볼점막에 열린다. 턱밑샘·혀밑샘(장액·점액 혼합)은 혀 밑 바닥에 열린다.

[조직학 · 니슬소체(rER)]

23. 신경조직 염색에서 화살표가 가리키는(신경세포체의 진한 반점) 세포소기관은?




그림 판독

신경세포체 — 화살표는 세포질의 진한 호염기성 반점(니슬소체).

니슬소체는 리보솜이 붙은 과립세포질그물(rER)이다.

정답 ④

신경세포의 니슬소체는 과립세포질그물(rER)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 핵소체(nucleolus) — 리보솜 소단위 합성 부위다.
- ② 골지체(Golgi apparatus) — 분비물 가공·포장이다.
- ③ 미토콘드리아(mitochondria) — ATP 생산이다.
- ④ 과립세포질그물(rough endoplasmic reticulum) — 신경세포의 니슬소체다 ◀ 정답
- ⑤ 무과립세포질그물(smooth endoplasmic reticulum) — 지질 합성·해독이다.

■ 관련 지식: 니슬소체는 신경세포체에 풍부한 리보솜 부착 rER과 유리 리보솜의 무리로, 호염기성으로 진하게 물든다. 단백질 합성이 왕성한 신경세포의 특징이다.

[조직학 · 위 벽세포]

24. 위식도역류 치료의 양성자펌프억제제(PPI)가 작용하는 세포는?

정답 ②

PPI는 위산(H^+)을 분비하는 벽세포(parietal cell)의 양성자펌프를 억제한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 으뜸세포(chief cell) — 펩시노겐을 분비한다.

② 벽세포(parietal cell) — 양성자펌프로 위산(H^+)을 분비하는 PPI 표적이다 ◀ 정답

③ 목점액세포(mucous neck cell) — 점액을 분비한다.

④ 장내분비세포(enteroendocrine cell) — 호르몬을 분비한다.

⑤ 장크롬친화세포(enterochromaffin cell) — 세로토닌·히스타민을 분비한다.

■ 관련 지식: 위 벽세포는 $H^+/K^+-ATPase$ (양성자펌프)로 위산을 분비하고 내인자도 만든다. PPI는 이 펌프를 비가역 억제해 위산 분비를 크게 줄인다.

[해부학 · 첫째갈비뼈·빗장밑정맥(이상 문항)]

25. 빗장밑정맥에 중심정맥카테터를 삽입하려 한다. 이때 빗장뼈 안쪽 부분 아래쪽에서 만져지는 뼈 구조물은?

정답 ⑤

정답이 이상한 문항. 공식 정답지는 ⑤(둘째 갈비뼈)로 되어 있으나, 빗장밑정맥은 해부학적으로 첫째 갈비뼈 위(앞목갈비근 앞쪽 고랑)를 지나 첫째 갈비뼈(④)가 지표로 맞아 서로 어긋난다.

■ 보기 해설

① 고리뼈(atlas) — 이 구조와 관련이 없다.

② 어깨뼈봉우리(acromion) — 관련이 없다.

③ 복장뼈자루(manubrium) — 관련이 없다.

④ 첫째 갈비뼈(first rib) — 빗장밑정맥이 실제로 첫째 갈비뼈 위를 지나 해부학적으로는 더 맞으나, 공식 정답지는 ⑤로 표기한 이상 문항이다.

⑤ 둘째 갈비뼈(second rib) — 공식 정답지 기준 정답(단, 정답 논란이 있는 이상 문항)이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 빗장밑정맥은 첫째 갈비뼈 위 고랑을 앞목갈비근 앞쪽으로 지나며, 카테터 삽입 시 첫째 갈비뼈가 뒤·아래 지표가 되어 가슴막(허파) 손상을 피하는 데 참고된다.

감별/오답: 이상 문항 — 공식 정답지(⑤ 둘째 갈비뼈)와 해부학적 지표(첫째 갈비뼈 ④)가 서로 맞지 않는다.

[발생학 · 음순음낭주름]

26. 선천부신과다형성 여아의 커진 대음순은 남자의 어떤 기관에 해당하는가?

정답 ③

대음순은 남자의 음낭(scrotum)과 같은 음순음낭주름에서 발생한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① 음경(penis) — 남자 생식결절(음핵에 대응)이다.

② 고환(testis) — 여성 난소에 대응한다.

③ 음낭(scrotum) — 대음순과 같은 음순음낭주름에서 발생한다 ◀ 정답

④ 전립샘(prostate) — 여성 요도결샘에 대응한다.

⑤ 정낭(seminal vesicle) — 대음순 상동 구조가 아니다.

■ 관련 지식: 바깥생식기관은 같은 원기에서 남녀로 분화한다. 생식결절→음경/음핵, 요도주름→음경요도/소음순, 음순음낭주름→음낭/대음순이다. 안드로젠 과다(선천부신과다형성)면 여아의 음순음낭주름이 융합·비대해 음낭처럼 보인다.

[해부학 · 대동맥판막 청진]

27. 심장을 청진에서 대동맥판막 소리를 듣기에 가장 적절한 위치는?




그림 판독

앞가슴 청진 부위 A~E.

A = 오른쪽 복장뼈 옆 둘째 갈비사이공간 — 대동맥판막 청진부위(정답).

정답 ①

대동맥판막 청진부위는 오른쪽 둘째 갈비사이(A)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A — 오른쪽 둘째 갈비사이(대동맥판막 청진부위) ◀ 정답
- ② B — 왼쪽 둘째 갈비사이(허파동맥판막)다.
- ③ C — 왼쪽 복장뼈 아래(삼첨판) 쪽이다.
- ④ D — 심장꼭대기(승모판) 쪽이다.
- ⑤ E — 대동맥판막 청진부위가 아니다.

■ 관련 지식: 판막 청진부위는 대동맥판막(오른쪽 2번째 갈비사이), 허파동맥판막(왼쪽 2번째), 삼첨판(왼쪽 복장뼈 아래), 승모판(심장꼭대기)이다. 대동맥판막은 오른쪽 위쪽에서 가장 잘 들린다.

[해부학 · 척수원뿔]

28. 등 MRI에서 첫째허리뼈 수준에서 척수가 끝나는 부분(A)은?



그림 판독

허리 MRI(시상면) — 화살표 A는 척수가 원뿔처럼 가늘어지며 끝나는 부위.

A = 척수원뿔(대개 L1~L2 수준에서 끝남).

정답 ④

척수가 원뿔처럼 가늘어지며 끝나는 부분은 척수원뿔(conus medullaris)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 말총(cauda equina) — 원뿔 아래 신경뿌리 다발이다.
- ② 종말끈(filum terminale) — 원뿔에서 이어지는 실 모양 구조다.
- ③ 척수 앞뿔(anterior horn) — 운동신경세포가 있는 부위다.
- ④ 척수원뿔(conus medullaris) — 척수가 원뿔처럼 가늘어지며 끝나는 부분이다 ◀ 정답
- ⑤ 허리팽대(lumbar enlargement) — 다리 신경총 부위로 굵어진 척수다.

■ 관련 지식: 척수는 성인에서 대개 L1~L2 수준에서 척수원뿔로 끝나고, 그 아래로는 말총(신경뿌리 다발)과 종말끈이 이어진다. 허리천자는 척수 손상을 피해 원뿔보다 아래(L3~L4)에서 한다.

[해부학 · 대동맥활]

29. 가슴 X선에서 화살표가 가리키는(왼쪽 위 세로칸 경계의 돌출) 구조물은?




그림 판독

가슴 X선 — 화살표는 왼쪽 위 세로칸 경계의 볼록한 그림자.

이 위치의 돌출(대동맥손잡이)은 대동맥활이다.

정답 ④

왼쪽 위 세로칸 경계의 돌출(대동맥손잡이)은 대동맥활이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가슴샘(thymus) — 앞세로칸 구조다.
- ② 식도(esophagus) — 뒤세로칸 구조다.
- ③ 원심방(left atrium) — 이 돌출 소견이 아니다.
- ④ 대동맥활(aorta arch) — 왼쪽 위세로칸 경계의 돌출(대동맥손잡이)이다 ◀ 정답
- ⑤ 허파동맥(pulmonary artery) — 대동맥손잡이 아래의 돌출이다.

■ 관련 지식: 가슴 X선의 왼쪽 심장·세로칸 경계는 위에서부터 대동맥활(대동맥손잡이)·허파동맥토막·원심방귀·원심실 순이다. 가장 위 볼록한 손잡이가 대동맥활이다.

[조직학 · 갑상샘]

30. 피로·부종·체중증가·빈혈·소리·느린말(갑상샘저하) 환자에서 감소한 호르몬을 분비하는 장기는?




그림 판독

내분비 장기 조직 A~E.

B = 갑상샘 — 콜로이드가 찬 소포 구조(정답).

정답 ②

갑상샘저하 증상의 원인 장기는 콜로이드 소포로 이뤄진 갑상샘(B)이다. 정답 ②.

질한 개요: 갑상샘저하증: 갑상샘호르몬이 부족해 피로·추위·무력·체중증가·부종(점액부종)·서맥·빈혈·소리·느린 사고가 나타난다. 하시모토갑상샘염이 흔한 원인이다.

■ 보기 해설

- ① A — 갑상샘 소포 구조가 아니다.
- ② B(갑상샘) — 콜로이드가 찬 소포로 갑상샘호르몬 분비 ◀ 정답
- ③ C — 해당 조직이 아니다.
- ④ D — 해당 조직이 아니다.
- ⑤ E — 해당 조직이 아니다.

■ 관련 지식: 갑상샘은 콜로이드(갑상샘글로불린)를 담은 소포로 이뤄져 조직학적으로 특징적이다. 호르몬이 부족하면 전신 대사가 느려져 부종·체중증가·느린 말투가 나타난다.

[해부학 · 유방 림프배출]

31. 오른쪽 유방 위가쪽 유방암 — 일차적으로 전이되는 림프절은?

정답 ①

유방 림프의 대부분(특히 위가쪽)은 가슴근림프절(앞겨드랑림프절)로 먼저 흐른다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 가슴근림프절(pectoral node) — 유방(특히 위가쪽) 림프가 먼저 흐르는 곳이다 ◀ 정답
- ② 복장옆림프절(parasternal node) — 안쪽 사분면 일부가 배출된다.
- ③ 빗장위림프절(supraclavicular node) — 후기 전이 부위다.
- ④ 아래가로막림프절(inferior phrenic node) — 유방 주 배출로가 아니다.
- ⑤ 기관지허파림프절(bronchopulmonary node) — 폐 림프절이다.

■ 관련 지식: 유방 림프의 약 75%는 겨드랑림프절(가슴근·앞무리)로 배출되고, 안쪽 부분 일부는 복장옆림프절로 간다. 위가쪽 유방암은 겨드랑의 가슴근림프절로 먼저 전이되는 경우가 많다.

[해부학 · 오른심방 구조]

32. 오른심방에서 관찰할 수 있는 구조물은?

정답 ⑤

오른심방에는 심장정맥굴구멍(coronary sinus opening)이 열린다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 이첨판(mitral valve) — 왼심방-왼심실 판막이다.
- ② 대동맥판막(aortic valve) — 왼심실 유출로다.
- ③ 꼭지근(papillary muscle) — 심실의 구조다.
- ④ 동맥원뿔(conus arteriosus) — 오른심실 유출로다.
- ⑤ 심장정맥굴구멍(opening of coronary sinus) — 오른심방에 열린다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 오른심방에는 위·아래대정맥과 심장정맥굴이 열리고, 타원오목·빗살근·경계능선이 있다. 이첨판·대동맥판막·꼭지근은 왼심장/심실 구조라 오른심방에서 볼 수 없다.

[해부학 · 위샘창자동맥]

33. 만성 샘창자궤양, 샘창자 뒤벽 천공·출혈 — 손상되었을 동맥은?

정답 ⑤

샘창자 뒤벽(첫째부분 뒤)을 지나는 위샘창자동맥(gastroduodenal artery)이 궤양으로 손상된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 복강동맥(celiac trunk) — 상위 줄기로 궤양 부위 동맥이 아니다.
- ② 오른위동맥(right gastric artery) — 위 작은굽이 동맥이다.
- ③ 고유간동맥(hepatic artery proper) — 간으로 가는 동맥이다.
- ④ 온간동맥(common hepatic artery) — 복강동맥 가지의 근위부다.
- ⑤ 위샘창자동맥(gastroduodenal artery) — 샘창자 첫째부분 뒤를 지나 궤양으로 손상된다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 샘창자 첫째부분 뒤벽에는 위샘창자동맥이 지난다. 이 부위의 뒤벽 궤양이 깊어지면 동맥을 침식해 대량 출혈을 일으킨다. 앞벽 궤양은 대신 유리 천공을 잘 만든다.

34. 멍이 잘 들고 지혈이 안 되는 환자의 혈액퍼바른표본 — 정상보다 수가 적을 것으로 예상되는 것은?




그림 판독

혈액도말 A~E — A·B·C(백혈구), D(적혈구), E(작은 점 = 혈소판).

쉽게 멍들고 출혈이 잦으면 E(혈소판) 수가 감소한다(정답).

정답 ⑤

출혈 경향은 혈소판(E) 감소를 시사한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A(백혈구) — 출혈 경향의 직접 원인이 아니다.
- ② B(백혈구) — 해당되지 않는다.
- ③ C(백혈구) — 해당되지 않는다.
- ④ D(적혈구) — 감소하면 빈혈이나 출혈 경향의 주 원인은 아니다.
- ⑤ E(혈소판) — 감소 시 멍·출혈 경향 ◀ 정답

■ 관련 지식: 혈소판은 일차 지혈을 담당한다. 수가 줄면(혈소판감소증) 점상출혈·자은 멍·지혈 지연이 생긴다. 도말에서 가장 작은 조각으로 보인다.

35. A(간십이지장인대)를 지나는 구조물 중 내용물이 흐르는 방향이 다른 하나는?




그림 판독

간·위 부위 그림 — A는 간과 샘창자를 잇는 간십이지장인대(문맥삼조 포함).

A 속의 간문맥·간동맥은 혈액을 간으로 들이고, 쓸개관은 담즙을 간에서 내보낸다.

정답 ①

간십이지장인대에서 간문맥·간동맥은 간으로 들어가지만 쓸개관은 담즙을 간에서 내보내 방향이 반대다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 쓸개관(bile duct) — 담즙을 간에서 내보내 간문맥·간동맥과 방향이 반대다 ◀ 정답
- ② 간문맥(portal vein) — 간으로 들어간다.
- ③ 간정맥(hepatic vein) — 간십이지장인대에 있지 않다(아래대정맥으로 유출).
- ④ 간동맥(hepatic artery) — 간으로 들어간다.
- ⑤ 쓸개동맥(cystic artery) — 쓸개주머니로 가는 동맥이다.

■ 관련 지식: 간십이지장인대에는 문맥삼조(간문맥·고유간동맥·쓸개관)가 지난다. 간문맥·간동맥은 피를 간으로 들이는데, 쓸개관은 담즙을 간에서 밖(샘창자)으로 내보내므로 흐름 방향이 반대다.

[발생학 · hCG·태반]

36. 임신 초기 황체를 유지하는 hCG를 생산해 소변 임신검사 양성(+)이 되게 하는 장기는?



그림 판독

소변 임신검사 키트 — hCG 양성(두 줄).

hCG는 태반(융모막 융합영양막세포)이 분비한다.

정답 ③

hCG를 생산하는 것은 태반(융합영양막세포)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 난소 — 황체를 유지하나 hCG를 만들지 않는다.
- ② 콩팥 — 에리트로포이에틴을 만든다.
- ③ 태반 — 융합영양막세포가 hCG를 분비한다 ◀ 정답
- ④ 갑상샘 — 갑상샘호르몬을 만든다.
- ⑤ 뇌하수체 — LH-FSH를 만든다.

■ 관련 지식: hCG는 착상 후 태반의 융합영양막세포가 분비해 황체를 유지시켜 프로게스테론 분비를 이어가게 한다. 소변·혈액 hCG로 임신을 진단한다.

[조직학 · 뇌하수체 앞엽]

37. 뇌하수체 현미경에서 A 부위(산호성세포)의 세포가 분비하는 호르몬은?




그림 판독

뇌하수체 조직 — A는 앞엽의 산호성세포(호산성)로 물든 부위.

앞엽 산호성세포는 프로락틴·성장호르몬을 분비한다.

정답 ②

뇌하수체 앞엽 산호성세포가 분비하는 것은 프로락틴(및 성장호르몬)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 옥시토신(oxytocin) — 뒤엽에서 방출된다.
- ② 프로락틴(prolactin) — 앞엽 산호성세포가 분비한다 ◀ 정답
- ③ 칼시토닌(calcitonin) — 갑상샘 C세포에서 나온다.
- ④ 멜라토닌(melatonin) — 송방울샘에서 나온다.
- ⑤ 글루코코티코이드(glucocorticoid) — 부신겉질에서 나온다.

■ 관련 지식: 뇌하수체 앞엽은 산호성세포(프로락틴·성장호르몬)와 호염기성세포(ACTH·TSH·FSH·LH)로 나뉜다. 뒤엽은 시상하부가 만든 옥시토신·ADH를 저장·분비한다.

[해부학 · 자궁목 통증신경]

38. 자궁목·질천장 염증에 의한 아랫배 통증과 관련된 신경은?

정답 ③

자궁목·질위부의 통증은 골반내장신경(S2-4 부교감·내장구심)을 따라 전달된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 음부신경(pudendal nerve) — 회음부 체성신경이다.
- ② 꼬리신경(coccygeal nerve) — 이 통증 경로가 아니다.
- ③ 골반내장신경(pelvic splanchnic nerve) — S2-4 부교감·내장구심으로 자궁목 통증을 전달한다 ◀ 정답
- ④ 영치내장신경(sacral splanchnic nerve) — 교감신경이다.
- ⑤ 허리내장신경(lumbar splanchnic nerve) — 자궁바닥 통증 경로 쪽이다.

■ 관련 지식: 골반 내장통증은 골반가로선을 기준으로 경로가 갈린다. 자궁목·질위부처럼 아래 구조는 골반내장신경(S2-4)을 따라, 자궁바닥 등 위 구조는 아랫배·허리내장신경(교감)을 따라 전달된다.

[해부학 · 난소걸이인대]

39. 난소적출술에서 난소혈관의 혈류를 차단하려면 묶어야 할 인대는?

정답 ⑤

난소 동·정맥은 난소걸이인대(suspensory ligament) 속을 지나므로 이를 결찰한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 난소인대(ovarian ligament) — 난소를 자궁에 잇는 인대다.
- ② 자궁원인대(round ligament) — 자궁을 큰음순으로 잇는다.
- ③ 기본인대(cardinal ligament) — 자궁목 지지인대(자궁동맥 통과)다.
- ④ 자궁넓은인대(broad ligament) — 복막주름이다.
- ⑤ 난소걸이인대(suspensory ligament) — 난소 동·정맥이 지나 결찰 대상이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소걸이인대(갈때기골반인대)는 난소에서 골반벽으로 이어지며 난소 동·정맥이 지난다. 난소절제 때 이 인대를 결찰해 출혈을 막는다. 근처를 지나는 요관 손상에 주의한다.

[신경해부 · 앞결질척수로]

40. 오른목 척수손상으로 오른쪽 반신마비인데 어깨 근위부(몸통 가까운) 움직임이 일부 남음 — 관여 신경로는?

정답 ②

몸통·근위부 축성 근육은 양쪽 지배를 받는 앞결질척수로가 담당해 한쪽 손상에도 일부 보존된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 적색척수로(rubrospinal tract) — 굽힘근 긴장 관련이다.
- ② 앞결질척수로(anterior corticospinal tract) — 몸통·근위 축성근을 양쪽 지배해 한쪽 손상에도 보존된다 ◀ 정답
- ③ 가쪽결질척수로(lateral corticospinal tract) — 원위부 정교운동으로 교차·한쪽 지배다.
- ④ 앞소뇌척수로(anterior cerebellospinal tract) — 소뇌로 가는 감각로다.
- ⑤ 뒤소뇌척수로(posterior cerebellospinal tract) — 소뇌로 가는 감각로다.

■ 관련 지식: 가쪽결질척수로는 대부분 교차해 반대쪽 원위부(손발) 운동을 지배하므로 손상 시 마비된다. 반면 앞결질척수로는 양쪽성으로 몸통·근위부 축성근을 지배해 한쪽 손상에도 근위부 움직임이 일부 남는다.

Ⅲ. 근골격·비뇨생식·통합 (41~60)

[해부학 · 중간볼기근·트렌델렌부르크]

41. 한다리로 서게 하면 골반이 반대편으로 심하게 기울(트렌델렌부르크 징후) — 관련 근육은?

정답 ④

디딤다리 쪽 골반을 수평으로 유지하는 것은 중간볼기근이라 약해지면 반대편 골반이 처진다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 넓다리빗근(sartorius muscle) — 넓다리 굽힘·가쪽돌림 보조근이다.
- ② 궁둥구멍근(piriformis muscle) — 가쪽돌림근이다.
- ③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle) — 펴·가쪽돌림 주동근이다.
- ④ 중간볼기근(gluteus medius muscle) — 벌림으로 디딤다리 골반을 수평 유지(트렌델렌부르크)한다 ◀ 정답
- ⑤ 넓다리네갈래근(quadriceps femoris muscle) — 무릎펴기근이다.

■ 관련 지식: 중간볼기근(과 작은볼기근)은 한다리 지지 때 디딤다리 쪽 골반을 들어 수평을 유지한다. 위볼기신경 손상이나 근약화로 기능이 떨어지면 반대편 골반이 처지는 트렌델렌부르크 징후가 나타난다.

[해부학 · 쓸개이자관팽대]

42. 이자머리 종양이 주변을 눌러 황달 발생 — 증상과 관련이 깊은 구조물은?

정답 ⑤

이자머리 종양은 그곳을 지나는 쓸개이자관팽대(온쓸개관 원위부)를 눌러 담즙 배출을 막아 황달을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 쓸개주머니관(cystic duct) — 쓸개주머니로 이어지는 관이다.
- ② 온간관(common hepatic duct) — 담즙 상부 통로다.
- ③ 주이자관(main pancreatic duct) — 이자액 배출관이다.
- ④ 덧이자관(accessory pancreatic duct) — 부이자관이다.
- ⑤ 쓸개이자관팽대(hepatopancreatic ampulla) — 이자머리를 지나며 종양에 눌러 담즙 폐색·황달을 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 온쓸개관은 이자머리를 지나 쓸개이자관팽대(파터팽대)에서 주이자관과 만나 샘창자로 열린다. 이자머리암이 이 부위를 누르면 담즙이 막혀 폐쇄황달과 무통성 쓸개주머니 팽창이 나타난다.

[조직학 · 유전성 구상적혈구증]

43. 5세 남아, 창백·지라비대·빈혈, 혈액도말에 공 모양 적혈구 — 원인은?




그림 판독

혈액도말 — 화살표는 중심 창백이 없는 작은 공 모양 적혈구(구상적혈구).

구상적혈구는 적혈구 막단백질(스펙트린 등) 결함의 특징이다.

정답 ③

공 모양 적혈구와 지라비대는 적혈구 막단백질 유전 결함(유전성 구상적혈구증)이다. 정답 ③.

질환 개요: 유전성 구상적혈구증: 스펙트린·안키린 등 적혈구 막골격 단백질 결함으로 적혈구가 공 모양이 되어 지라에서 잘 파괴된다. 용혈성 빈혈·황달·지라비대·쓸개돌이 나타나며 지라절제로 호전된다.

■ 보기 해설

- ① 혈액 중 철이온 부족 — 철결핍빈혈(작은적혈구)이다.
- ② 헴(heme) 변환효소 결핍 — 포르피린증 등으로 이 소견이 아니다.
- ③ 적혈구 막단백질 유전 결함 — 유전성 구상적혈구증(공모양·지라비대)이다 ◀ 정답
- ④ 헤모글로빈 구성 아미노산 돌연변이 — 낫적혈구·지중해빈혈이다.
- ⑤ 과다한 혈구 생성으로 인한 미성숙 적혈구 배출 — 이 소견의 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 적혈구 막골격 단백질(스펙트린·안키린)의 유전 결함으로 세포가 표면적을 잃고 공 모양이 된다. 이 세포는 지라를 통과하지 못해 파괴되어 용혈·지라비대를 일으킨다.

[해부학 · 갓돌림신경]

44. 정면·좌우 주시 검사에서 왼쪽 눈이 왼쪽(가쪽)으로 벌어지지 못함 — 손상 신경은?



그림 판독

27-1 정면: 왼쪽 눈이 약간 안쪽으로 치우침(안쪽결눈).

27-2 오른쪽 주시: 양쪽 정상. 27-3 왼쪽 주시: 왼쪽 눈이 가쪽으로 못 감.

왼쪽 가쪽곧은근 마비 → 왼쪽 갓돌림신경 손상(정답).

정답 ④

왼쪽 눈이 가쪽으로 벌어지지 못하는 것은 왼쪽 갓돌림신경(가쪽곧은근 마비)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 왼쪽 눈돌림신경(left oculomotor nerve) — 안쪽·위·아래곧은근 지배다.

② 오른쪽 눈돌림신경(right oculomotor nerve) — 오른눈 관련이다.

③ 오른쪽 도르레신경(right trochlear nerve) — 위빋근(아래안쪽 주시) 관련이다.

④ 왼쪽 갓돌림신경(left abducens nerve) — 왼 가쪽곧은근 마비로 가쪽 주시가 안 된다 ◀ 정답

⑤ 오른쪽 갓돌림신경(right abducens nerve) — 오른눈 가쪽곧은근이다.

■ 관련 지식: 갓돌림신경(제6뇌신경)은 가쪽곧은근을 지배해 눈을 가쪽으로 벌린다. 마비되면 그쪽 눈이 안쪽으로 치우치고 가쪽 주시가 안 돼 복시가 생긴다. 왼쪽 눈이 왼쪽을 못 보면 왼쪽 갓돌림신경 손상이다.

[조직학 · 미토콘드리아]

45. 세포 전자현미경에서 세포 활동에 필요한 에너지(ATP)를 생산하는 세포소기관은?




그림 판독

세포질 전자현미경 A~E.

C = 미토콘드리아 — 두 겹막·크리스타 구조로 ATP를 생산(정답).

정답 ③

ATP를 생산하는 세포소기관은 미토콘드리아(C)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① A — 에너지 생산 소기관이 아니다.

② B — 에너지 생산 소기관이 아니다.

③ C(미토콘드리아) — 크리스타에서 산화인산화로 ATP 생산 ◀ 정답

④ D — 해당되지 않는다.

⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 미토콘드리아는 두 겹의 막과 안쪽막이 접힌 크리스타를 가지며, 전자전달계와 산화인산화로 ATP를 만든다. 세포의 에너지 발전소로 불린다.

[조직학 · 버팀세포]

46. 정세관에 있고 혈액-고환 장벽을 형성하며 분열·이동하지 않고 핵염색이 약하고 핵소체가 뚜렷한 세포는?

정답 ②

혈액-고환 장벽을 만들고 분열하지 않는 지지세포는 버팀세포(Sertoli cell)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 정자세포(spermatid) — 분화 중인 생식세포다.
- ② 버팀세포(Sertoli cell) — 혈액-고환장벽을 만드는 지지세포다 ◀ 정답
- ③ 사이질세포(Leydig's cell) — 테스토스테론을 분비한다.
- ④ 정조세포(spermatogonium) — 분열하는 생식모세포다.
- ⑤ 일차정모세포(primary spermatocyte) — 감수분열 중인 생식세포다.

■ 관련 지식: 버팀세포(Sertoli)는 정세관 상피의 지지세포로, 인접 버팀세포와 치밀이음으로 혈액-고환 장벽을 만들어 생식세포를 보호하고 영양·조절한다. 분열하지 않으며 FSH·안드로젠에 반응한다.

[조직학 · 창모세혈관]

47. 모세혈관 전자현미경에서 내피에 창(fenestra)이 보이는 유형이 관찰되는 장기는?



그림 판독

모세혈관 전자현미경 — 화살표는 내피의 얇은 창(fenestrae).

창모세혈관은 공팔·토리·내분비샘·창자 등에서 보인다.

정답 ④

창(구멍)이 있는 창모세혈관이 대표적으로 관찰되는 장기는 공팔(토리)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 뇌 — 연속모세혈관(혈액뇌장벽)이다.
- ② 근육 — 연속모세혈관이다.
- ③ 심장 — 연속모세혈관이다.
- ④ 공팔 — 토리의 창모세혈관이 여과를 담당한다 ◀ 정답
- ⑤ 허파 — 연속모세혈관이다.

■ 관련 지식: 모세혈관은 연속형(뇌·근육·허파), 창형(공팔·토리·내분비샘·창자), 굴모양(간·지라·골수)으로 나뉜다. 여과가 활발한 공팔 토리는 내피에 창이 많은 창모세혈관이다.

[해부학 · 왼팔머리정맥]

48. 가슴샘 종양이 복장뼈 뒤에서 압박할 수 있는 정맥은?

정답 ④

가슴샘 뒤·아래를 가로지르는 왼팔머리정맥이 눌리기 쉽다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 오른빗장밑정맥(right subclavian vein) — 이 부위를 가로지르지 않는다.
- ② 왼속목정맥(left internal jugular vein) — 목의 정맥이다.
- ③ 오른속목정맥(right internal jugular vein) — 목의 정맥이다.
- ④ 왼팔머리정맥(left brachiocephalic vein) — 가슴샘 뒤·아래를 가로질러 눌리기 쉽다 ◀ 정답
- ⑤ 오른팔머리정맥(right brachiocephalic vein) — 짧고 수직으로 이 경로가 아니다.

■ 관련 지식: 왼팔머리정맥은 왼쪽에서 오른쪽으로 세로칸을 비스듬히 가로질러 위대정맥으로 합류한다. 복장뼈 뒤 가슴샘 바로 뒤를 지나므로 앞세로칸 종양(가슴샘종)에 눌리기 쉽다.

[조직학 · 땀샘]

49. 피부 그림에서 땀을 분비하는 구조물은?




그림 판독

피부 단면 A~E.

E = 땀샘의 분비부(진피 깊은 곳의 코일) — 땀 분비(정답).

정답 ⑤

땀을 분비하는 것은 진피 깊은 곳의 땀샘 분비부(E)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① A — 땀 분비부가 아니다(표피 쪽 구조).

② B — 땀 분비부가 아니다.

③ C — 관 등으로 분비부가 아니다.

④ D — 혈관·신경 등으로 분비부가 아니다.

⑤ E(땀샘 분비부) — 진피 깊은 곳의 코일에서 땀 분비 ◀ 정답

■ 관련 지식: 에크린땀샘은 진피 깊은 곳(또는 피부밑조직 경계)의 코일 모양 분비부에서 땀을 만들어 관을 통해 표피로 내보낸다. 체온조절을 담당하며 교감신경(아세틸콜린) 지배를 받는다.

[해부학 · 고실곤신경·미각]

50. 만성중이염으로 A(뇌신경)의 B(가지) 기능에 이상 — 생길 수 있는 기능 이상은?




그림 판독

중이 그림 — A(얼굴신경 줄기)·B(고실곤신경 가지).

고실곤신경은 혀 앞 2/3의 미각·침샘 분비를 담당한다.

정답 ②

얼굴신경(A)의 고실곤신경(B)이 상하면 혀 앞 2/3의 미각 이상이 생긴다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 동공 확장 — 교감신경 손상 증상이다.

② 미각 이상 — 고실곤신경(얼굴신경) 손상으로 혀 앞 2/3 미각 이상이 생긴다 ◀ 정답

③ 청각 저하 — 속귀신경 증상이다.

④ 목소리가 쉼 — 미주(되돌이후두) 증상이다.

⑤ 침분비 증가 — 이 신경 손상 증상이 아니다(오히려 감소).

■ 관련 지식: 고실곤신경은 얼굴신경의 가지로 중이(고실)를 지나며 혀 앞 2/3의 미각과 턱밑·혀밑샘 분비를 담당한다. 중이 병변에 침범되면 미각 이상과 침 분비 저하가 생긴다.

[해부학 · 속정삭근막]

51. 앞배벽 구조물 중 속정삭근막(internal spermatic fascia)과 연결된 것은?

정답 ④

속정삭근막은 배가로근막이 정삭을 따라 이어진 것이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 피부밑조직 — 정삭 근막층이 아니다.
- ② 배바깥빗근 널힘줄 — 바깥정삭근막의 기원이다.
- ③ 배속빗근 널힘줄 — 고환올림근막의 기원이다.
- ④ 배가로근막 — 배가로근막이 정삭을 따라 이어진 것이다 ◀ 정답
- ⑤ 복막 — 정삭근막이 아니다(초상돌기 관련).

■ 관련 지식: 정삭의 층은 배벽에서 유래한다. 바깥정삭근막(배바깥빗근 널힘줄)·고환올림근막(배속빗근)·속정삭근막(배가로근막) 순으로, 속정삭근막은 배가로근막이 깊은살굴구멍에서 이어진 것이다.

[조직학 · 신경집세포]

52. 말초신경 현미경에서 빨간 화살표가 가리키는(축삭을 감싸 말이집을 만드는) 세포는?



그림 판독

말초신경 단면 — 화살표는 축삭을 감싼 말이집과 그 세포.
말초에서 말이집을 만드는 것은 신경집세포(슈반세포)다.

정답 ③

말초신경에서 말이집을 만드는 것은 신경집세포(Schwann cell)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 별아교세포(astrocyte) — 중추 지지세포다.
- ② 미세아교세포(microglia) — 중추 면역세포다.
- ③ 신경집세포(Schwann cell) — 말초신경 말이집을 만든다 ◀ 정답
- ④ 뇌실막세포(ependymal cell) — 뇌실 상피세포다.
- ⑤ 희소돌기아교세포(oligodendrocyte) — 중추 말이집을 만든다.

■ 관련 지식: 말초신경의 말이집은 신경집세포(슈반세포)가, 중추신경의 말이집은 희소돌기아교세포가 만든다. 신경집세포 하나가 축삭 한 마디의 말이집을 감싼다.

[조직학 · 근육원섬유마디]

53. 근육원섬유 전자현미경에서 근육원섬유마디(sarcomere)에 해당하는 구간은?




그림 판독

가로무늬근 근육원섬유 전자현미경 — A~E 구간 표시.

A = Z선에서 Z선까지의 반복 단위(근육원섬유마디)(정답).

정답 ①

근육원섬유마디는 Z선에서 Z선까지의 반복 단위(A)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A — Z선~Z선의 근육원섬유마디 ◀ 정답

② B — Z선 등 경계 구조로 마디 전체가 아니다.

③ C — H띠·M선 부위로 마디 전체가 아니다.

④ D — 부분 구간이다.

⑤ E — 부분 구간이다.

■ 관련 지식: 근육원섬유마디는 인접한 두 Z선 사이 구간으로 근수축의 기본 단위다. 가운데 어두운 A대(마이오신)와 양쪽 밝은 I대(액틴)로 이뤄지고, 수축 시 Z선이 가까워진다.

[조직학 · 제2형 폐포세포]

54. 허파파리 현미경에서 표면활성물질 분비 이상으로 신생아호흡곤란증후군을 일으키는 세포는?




그림 판독

허파파리 벽 A~E — A(제1형 폐포세포, 얇음) 등.

C = 제2형 폐포세포 — 표면활성물질(surfactant) 분비(정답).

정답 ③

표면활성물질을 분비하는 것은 제2형 폐포세포(C)다. 정답 ③.

질환 개요: 신생아호흡곤란증후군: 미숙아에서 제2형 폐포세포가 표면활성물질을 충분히 만들지 못해 허파파리가 쉽게 허탈되어 호흡곤란이 생긴다. 산전 스테로이드·표면활성물질 보충으로 치료·예방한다.

■ 보기 해설

① A(제1형 폐포세포) — 가스교환용 얇은 세포로 표면활성물질을 만들지 않는다.

② B — 해당되지 않는다.

③ C(제2형 폐포세포) — 표면활성물질 분비 ◀ 정답

④ D — 큰포식세포(먼지세포) 등이다.

⑤ E — 해당되지 않는다.

■ 관련 지식: 허파파리 상피는 가스교환을 하는 얇은 제1형 폐포세포와, 표면활성물질을 분비하는 통통한 제2형 폐포세포로 이뤄진다. 표면활성물질은 표면장력을 낮춰 허파파리 허탈을 막는다.

[해부학 · 사정관]

55. 요도를 통해 정낭으로 내시경을 넣을 때 지나가는 구조물은?

정답 ⑤

요도(전립샘요도)에서 정낭으로 이어지는 통로는 사정관이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 고환(testis) — 정자 생성 장기다.
- ② 부고환(epididymis) — 정자 성숙·저장 부위다.
- ③ 고살굴(inguinal canal) — 정삭이 지나는 관이다.
- ④ 정관(ductus deferens) — 부고환에서 사정관까지의 관이다.
- ⑤ 사정관(ejaculatory duct) — 정관+정낭관이 합쳐져 전립샘요도로 열린다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 정낭과 정관팽대가 만나 사정관을 이루고, 사정관은 전립샘을 지나 전립샘요도의 정구에 열린다. 요도경으로 정낭에 접근할 때 이 사정관을 통해 들어간다.

[발생학 · 척삭·속질핵]

56. 척삭(notochord)에서 유래한 성인의 구조물은?

정답 ④

척삭은 퇴화하고 그 잔재가 척추사이원반의 속질핵으로 남는다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 갈비돌기 — 척추뼈 돌기다.
- ② 척추뼈고리 — 척수를 감싸는 뼈고리다.
- ③ 척추뼈몸통 — 경절에서 발생하는 뼈다.
- ④ 척추사이원반 속질핵 — 척삭의 잔재다 ◀ 정답
- ⑤ 척추사이원반 섬유테 — 사이엽 중간세포에서 유래한다.

■ 관련 지식: 척삭은 배아의 세로축을 만들고 척추 형성을 유도한 뒤 대부분 퇴화한다. 그 잔재가 척추사이원반 가운데의 젤리 같은 속질핵으로 남는다. 척추뼈 자체는 체절의 경화절에서 만들어진다.

[해부학 · 거미막과립·수두증]

57. 뇌수막염 후 모든 뇌실·거미막밑공간이 커진 교통수두증 — 관계된 구조물은?

정답 ③

뇌척수액 흡수를 담당하는 거미막과립 손상으로 흡수가 안 돼 교통수두증이 생긴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 맥락열기(choroid plexus) — 뇌척수액을 생산한다.
- ② 정중구멍(median aperture) — 넷째뇌실에서 지주막밑공간으로의 통로다.
- ③ 거미막과립(arachnoid granulation) — 뇌척수액을 정맥굴로 흡수하며 손상 시 교통수두증이 생긴다 ◀ 정답
- ④ 뇌실사이구멍(interventricular foramen) — 가쪽·셋째뇌실 통로다.
- ⑤ 중간뇌수도관(mesencephalic aqueduct) — 셋째·넷째뇌실 통로(폐쇄수두증)다.

■ 관련 지식: 뇌척수액은 맥락열기에서 만들어져 뇌실을 돌아 거미막밑공간으로 나가 거미막과립에서 정맥굴로 흡수된다. 수막염 후 거미막과립이 손상되면 흡수가 막혀 뇌실·거미막밑공간이 모두 커지는 교통수두증이 된다.

[해부학 · 배꼽 정맥류]

58. 간경화 환자의 배꼽부위 정맥류(메두사머리) — 변형된 정맥은?



그림 판독

배 사진 — 배꼽 주위로 뻗은 확장 정맥(메두사머리).

문맥고혈압으로 배꼽결정맥→배벽 얇은정맥이 확장된 것.

정답 ③

배꼽 정맥류(메두사머리)에서 확장되는 것은 배벽의 얇은배벽정맥(과 얇은정맥망)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 큰두렁정맥(great saphenous vein) — 다리 얇은정맥이다.
- ② 아래배벽정맥(inferior epigastric vein) — 깊은정맥이다.
- ③ 얇은배벽정맥(superficial epigastric vein) — 배벽 얇은정맥망으로 메두사머리를 형성한다 ◀ 정답
- ④ 얇은엉덩회돌이정맥(superficial circumflex iliac vein) — 다른 얇은정맥이다.
- ⑤ 얇은바깥음부정맥(superficial external pudendal vein) — 다른 얇은정맥이다.

■ 관련 지식: 간경화의 문맥고혈압에서는 배꼽결정맥을 통해 문맥혈이 배벽 얇은정맥(얇은배벽정맥 등)으로 우회해 배꼽 주위 정맥이 확장된다. 이 방사상 확장 정맥을 메두사머리라고 한다.

[해부학 · 넓적다리뒤근육]

59. 달리기 중 넓적다리 뒤부위를 잡고 쓰러져 무릎을 굽히지 못함 — 손상 근육은?

정답 ③

무릎을 굽히는 넓적다리 뒤부위 근육은 넓적다리뒤근육(햄스트링)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 장딴지근(gastrocnemius muscle) — 무릎굽힘 보조이나 주로 발바닥굽힘근이다.
- ② 앞정강근(tibialis anterior muscle) — 발등굽힘근이다.
- ③ 넓적다리뒤근육(hamstring muscles) — 무릎을 굽히는 넓적다리 뒤부위 근육이다 ◀ 정답
- ④ 중간볼기근(gluteus medius muscle) — 벌림근이다.
- ⑤ 넓다리네갈래근(quadriceps femoris muscle) — 무릎펴기근이다.

■ 관련 지식: 넓적다리뒤근육(넓다리두갈래근·반힘줄근·반막근)은 궁둥뼈결절에서 시작해 무릎을 굽히고 엉덩관절을 편다. 전력 질주 중 갑작스러운 신전으로 잘 파열된다.

[해부학 · 아래창자간막동맥 영역]

60. 아래창자간막동맥(IMA)이 막혔을 때 혈액 공급에 장애가 생기는 부위는?

정답 ⑤

IMA는 뒤창자를 공급하므로 막히면 내림잘록창자 등이 허혈된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 돌창자(ileum) — 위창자간막동맥(SMA) 영역이다.
- ② 빈창자(jejunum) — SMA 영역이다.
- ③ 막창자꼬리(appendix) — SMA 영역이다.
- ④ 오름잘록창자(ascending colon) — SMA 영역이다.
- ⑤ 내림잘록창자(descending colon) — 아래창자간막동맥(뒤창자) 영역으로 IMA 폐색 시 허혈된다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아래창자간막동맥은 뒤창자(가로잘록창자 왼쪽 1/3~내림·구불잘록창자·곧창자 위부)를 공급한다. 막히면 내림·구불잘록창자가 허혈되며, 지라공급은 SMA·IMA 경계라 특히 취약하다.