

2023년도 1교시 문항별 상세 해설


해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 머리목·신경·조직 (1~20)

[해부학 · 침샘]

1. 입안 건조, 화살표가 가리키는 개구부로 열리는 샘은?




정답 ②

위쪽 어금니 맞은편 볼점막으로 열리는 관(귀밑샘관, Stensen관)의 주인은 귀밑샘(parotid)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 침샘 개구: 귀밑샘관=위 둘째어금니 맞은편 볼, 턱밑샘관(Wharton)·혀밑샘=혀밑. 귀밑샘=장액샘.

[조직학 · 감각소체]

2. 촉각소체(Meissner corpuscle)가 위치하는 곳은?



정답 ④

촉각소체는 표피 바로 아래 진피유두에 위치해 가벼운 촉각을 감지한다. 사진의 라, 정답 ④.

■ 관련 지식: 기계수용기: 촉각소체(진피유두·가벼운촉각)·파치니소체(깊은진피·진동)·메르켈(표피바닥·압각)·루피니(신장).

[해부학 · 척수 하단]

3. 신생아 허리천자에서 손상 주의해야 할 구조물은?

정답 ③

신생아는 척수 끝(척수원뿔)이 성인(L1~2)보다 아래(L3)에 있어 허리천자 시 손상 위험이 크다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 척수원뿔: 성인 L1~2, 신생아 L3. 허리천자는 L3~4/L4~5(말총 부위)에서 시행해 척수 손상 회피.

[해부학 · 남성 요도]

4. 전립샘 요도 뒷벽에서 사정관이 열리는 부위는?



정답 ②

사정관은 전립샘요도 뒷벽의 정구(seminal colliculus) 부위로 열린다. 사진의 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 전립샘요도 뒷벽: 정구(정중용기)에 전립샘소실, 그 양옆에 사정관 개구. 전립샘관은 요도고랑으로.

[해부학 · 뇌척수액·수두증]

5. 뇌수막염 후 모든 뇌실·거미막밑공간 확장(CSF 흡수장애) — 관련 구조물은?


정답 ③

모든 뇌실이 함께 커진 교통수두증은 뇌척수액 흡수 장애로, 거미막과립(arachnoid granulation)이 관계된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: CSF 순환: 맥락알기(생성)→뇌실→정중/가쪽구멍→거미막밑공간→거미막과립(정맥동 흡수). 폐쇄수두증(수도관)=일부 뇌실만 확장.

[조직학 · 허파꽂리 세포]

6. 허파꽂리에서 표면활성물질을 분비하는 세포는?



정답 ③

표면활성물질은 입방형 2형 폐포세포가 분비한다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 폐포: 1형(얇은 가스교환)·2형(표면활성물질·재생)·먼지세포(포식). 표면활성물질=표면장력↓·허탈 방지.

[해부학 · ADH·요붕증]

7. 다뇨·땀은소변, 수분제한에도 소변 농축 안 됨(호르몬 A) — A의 합성 부위는?

정답 ①


중추요붕증으로 부족한 호르몬 A는 항이뇨호르몬(ADH)이며, 시상하부(시각위·뇌실결핵)에서 합성되어 뒤엽에서 분비된다. 정답 ①.

■ 관련 지식: ADH: 시상하부 합성→뇌하수체 뒤엽 저장·분비. 중추요붕증=합성/분비 저하(줄기병변), 신성=콩팥 반응저하.

감별/오답: ⑤뒤엽은 저장·분비 장소이지 합성 장소가 아니다.

[해부학 · 넓적다리 동맥]

8. CT 혈관조영, 화살표 동맥이 공급하는 근육은?



정답 ④

화살표 동맥(깊은넙다리동맥의 관통가지)은 넓적다리 뒤편에 혈액을 공급하므로 대상 근육은 넙다리두갈래근이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 넙다리동맥→깊은넙다리동맥(관통가지=뒤칸 햄스트링)+가쪽/안쪽넙다리회돌이동맥(넙다리네갈래근 등).

[신경해부 · 청각겉질]

9. 청력 저하, 대뇌겉질 손상 부위는?


정답 ②

일차 청각겉질은 위관자이랑(superior temporal gyrus)의 가로관자이랑(Heschl)에 있다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 감각겉질: 청각=위관자이랑, 시각=뒤통수엽, 몸감각=중심뒤이랑, 운동=중심앞이랑.

[해부학 · 세로칸]

10. 앞세로칸(A)과 성인에서 주로 있는 조직(B)은?




정답 ③

앞세로칸(사진의 나)에는 소아기 가슴샘이 성인에서 퇴화해 지방조직으로 대체된다. 정답 ③(나·지방조직).

■ 관련 지식: 세로칸: 앞(가슴샘·지방)·중간(심장·큰혈관)·뒤(식도·가슴대동맥). 가슴샘=사춘기 후 지방 퇴화.

[해부학 · 눈·황반변성]

11. 글자 휘어짐·시력/색·명암 저하, 검안경 소견 — 문제 부위는?




정답 ③

중심시력·색각을 담당하는 황반(macula lutea) 병변(황반변성)에서 변시증(글자 휘어짐)이 나타난다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 황반=중심오목·원뿔세포 밀집(중심시력·색각). 황반변성=중심암점·변시증. 시각신경원반=맹점(시각X).

[조직학 · 지라 붉은속질]

12. 지라에서 적혈구가 파괴되는 곳은?



정답 ④

노화 적혈구는 지라 붉은속질(red pulp)에서 큰포식세포에 의해 파괴된다. 사진의 라, 정답 ④.

■ 관련 지식: 지라: 붉은속질(적혈구 제거·비장곤/정맥굴)·흰속질(림프·면역). 지라절제→표적세포·하울-줄리소체.

[해부학 · 문맥고혈압 결순환]

13. 간경화, 배꼽 정맥류(caput medusae) — 변형된 정맥은?



정답 ③

문맥고혈압에서 배꼽결정맥을 통해 얇은배벽정맥(superficial epigastric vein) 등이 확장되어 메두사머리를 만든다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 문맥-체순환 결순환: 식도정맥류(원위정맥)·치핵(중간/아래공창자)·메두사머리(배꼽결→배벽정맥).

[신경해부 · 마루엽·시공간]

14. 뇌출혈 후 시계그림 이상 — 손상 부위는?


정답 ④

시계그리기(시공간 구성) 장애는 뒤마루엽결질(posterior parietal cortex) 손상에서 나타난다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 마루연합영역: 시공간·주의·무시증후군(오른마루). 이마연합=집행기능, 관자연합=기억·언어이해.

[해부학 · 심장 청진 위치]

15. 오른심방 확장·삼첨판역류 — 적절한 청진 위치는?



정답 ⑤

삼첨판 청진은 복장뼈 아래 왼쪽 가장자리(4~5번 갈비사이)에서 한다. 사진의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 판막 청진: 대동맥판(우2늑간)·폐동맥판(좌2늑간)·삼첨판(좌하 복장연)·승모판(심첨).

[발생학 · 신경능선]

16. 신경고랑에서 떨어져 나온 세포(신경능선)에서 유래한 것은?


정답 ⑤

신경능선세포에서 척수신경절(등쪽뿌리신경절)이 유래한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 신경능선 유래: 감각신경절·자율신경절·부신속질·멜라닌세포·슈반세포·머리뼈 일부. 표피=표면외배엽, 부신겉질=중배엽.

[해부학 · 편도]

17. 소아 인후염·턱밑 림프절, 사진에서 커진 부위는?



정답 ②

인후염으로 커진 구조물은 목구멍(입천장)편도에 해당한다. 사진의 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 발다이어 편도고리: 인두편도(아데노이드)·귀관편도·입천장편도·혀편도. 감염 시 종대.

[발생학 · 태아 발생 시기]

18. 태아기 현상 중 가장 먼저 나타나는 것은?


정답 ②

보기 중 가장 이른 것은 약 12주경의 바깥생식기관 남녀 구분이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 태아 발생: 외생식기 분화(~12주) < 태동감지(~16~20주) < 표면활성물질(~24주+) < 동공반사(~30주) < 태아기름막.

[해부학 · 요관 손상]

19. 자궁절제 후 소변량 감소 — 손상된 구조물은?



정답 ①

자궁동맥 절찰 시 그 아래를 지나는 요관이 손상되기 쉽다. 사진의 ①, 정답 ①.

■ 관련 지식: 요관-자궁동맥 교차: 자궁동맥이 요관 위를 가로지름(water under the bridge). 자궁절제 합병증=요관손상.

[해부학 · 엉덩관절 벌림근]

20. 걸을 때 골반을 기울여 반대쪽 다리를 들어올리는 근육은?

정답 ④

디딤다리쪽 중간볼기근이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들어 전진시킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 중간·작은볼기근(위볼기신경)=엉덩관절 벌림·골반 안정. 마비→Trendelenburg·오리걸음.

II. 조직·발생·팔다리 (21~40)

[조직학 · 토리결세포]

21. 레닌을 분비해 안지오텐신 I 생산에 관여하는 세포는?




정답 ①

들세동맥 벽의 토리결세포(juxtaglomerular cell)가 단백분해효소 레닌을 분비해 안지오텐신 I 생성을 시작한다. 사진의 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 토리결장치: 토리결세포(레닌)·치밀반점(NaCl 감지)·토리바깥사이질세포. RAAS로 혈압 조절.

[조직학 · 난포 발달]

22. 태아 3개월째 관찰, 생식샘자극호르몬과 무관하게 발달하는 난포는?



정답 ⑤

가장 초기 단계인 원시난포(primitive follicle)는 태아기에 형성되며 성선자극호르몬과 무관하다. 사진의 마, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 난포 발달: 원시난포(호르몬 무관)→일차→이차(FSH 의존)→그라프난포→배란. 원시난포는 태생기 완성.

[해부학 · 팔 신경]

23. 위팔 앞쪽 상처 후 아래팔 가쪽 감각 저하 — 손상 신경은?

정답 ⑤

아래팔 가쪽 피부감각은 근육피부신경의 가지(가쪽아래팔피부신경)가 담당한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 근육피부신경: 위팔 앞칸 근육(두갈래근 등) 운동+가쪽아래팔 피부감각. 위팔 앞쪽 관통상에 취약.

[해부학 · 복막뒤·이자]

24. L2 절단면, 복막뒤·외분비+내분비 기관은?



정답 ④

복막뒤에 있으며 외분비(소화효소)와 내분비(인슐린) 기능을 모두 하는 기관은 이자(췌장)다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 이자=이차복막뒤장기. 외분비(췌리·소화효소)+내분비(이자섬·인슐린/글루카곤). L1~2 높이 가로 주행.

[해부학 · 팔꿈 골절·신경]

25. 소아 팔꿈 골절, 감각저하 예상 부위는?




정답 ④

팔꿈 안쪽(위관절융기) 부위 골절은 자신경을 손상시켜 손 안쪽(넷째·다섯째손가락) 감각을 떨어뜨린다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 소아 위관절융기 골절=정중/노신경·위팔동맥 손상 위험. 자신경=안쪽위관절융기 뒤 취약.

[해부학 · 지라 동맥]

26. 지라에 혈액을 공급하는 주된 동맥은?



정답 ③

지라는 복강동맥의 가지인 지라동맥(splenic artery)이 공급한다. 사진의 다, 정답 ③.

■ 관련 지식: 복강동맥→원위·지라·온간동맥. 지라동맥은 이자 위모서리를 따라 구불구불 주행.

[신경해부 · 브로카실어증]

27. 이해는 정상, 표현은 더듬거림(비유창) — 손상 부위는?

정답 ②

이해 정상·표현 비유창은 왼 대뇌반구 이마엽의 브로카영역 손상(브로카실어증)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 브로카(이마엽·표현↓·이해정상)·베르니케(관자엽·이해↓·유창하나 무의미). 우세반구(대개 좌)=언어.

[신경해부 · 거미막밑출혈]

28. 중간대뇌동맥 동맥류 파열, 혈액이 모이는 공간은?


정답 ③

뇌바닥 동맥류 파열 혈액은 거미막밑공간에 고인다(거미막밑출혈·벼락두통). 정답 ③.

■ 관련 지식: 머리속출혈: 경막바깥(중간뇌막동맥)·경막밑(다리정맥)·거미막밑(동맥류)·뇌내(고혈압).

[조직학 · 단핵구·쿠퍼세포]

29. 혈관 밖으로 나가 간 쿠퍼세포로 분화하는 세포는?




정답 ⑤

단핵구(monocyte)가 조직으로 이동해 큰포식세포(간의 쿠퍼세포)로 분화한다. 사진의 19-5, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 단핵구=가장 큰 백혈구·공팔형 핵→조직 대식세포(쿠퍼세포·미세아교·파골세포 등). 단핵포식계통.

[해부학 · 후두]

30. 기관지경술 사진, 화살표 구조물은?




정답 ①

성문에서 소리를 내는 흰 주름은 성대주름(vocal fold)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 후두: 안돌주름(가성대·위)·성대주름(진성대·아래), 그 사이 후두실. 성대=발성.

[해부학 · 심장동맥 경색]

31. 심장절단면 괴사 부위 — 손상된 혈관은?




정답 ①

괴사 분포(오른심실 부위)로 볼 때 오른심장동맥의 오른모서리가지(right marginal branch) 영역이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 심장동맥 영역: 앞벽·중격=LAD, 가쪽/뒤=회돌이, 아래벽·오른심실=오른심장동맥(모서리가지).

[조직학 · 버팀세포]

32. 혈액고환장벽 형성에 관여하는, 화살표가 가리키는 세포는?



정답 ①

정세관 안쪽의 버팀세포(Sertoli cell)가 밀착이음으로 혈액고환장벽을 형성하고 생식세포를 지지한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 버팀세포: 혈액고환장벽·영양-inhibin/AMH/ABP(FSH). 사이질세포(Leydig)=테스토스테론(LH).

[해부학 · 다리 근육]

33. 발등굽힘·안쪽번짐이 안 됨 — 손상 근육은?

정답 ①

발등굽힘(dorsiflexion)과 안쪽번짐(inversion)을 함께 하는 근육은 앞정강근(tibialis anterior)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 앞정강근(깊은종아리신경): 발등굽힘+안쪽번짐. 손상=발처짐(foot drop). 종아리근=가쪽번짐.

[발생학 · 중간공팔관]

34. 중간공팔관에서 남녀 동일하게 분화하는 구조물은?

정답 ⑤

중간공팔관(볼프관)의 꼬리부분이 방광에 흡수되어 남녀 모두 방광삼각(trigone)을 형성한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 중간공팔관: 남성=부고환·정관·정낭. 남녀 공통=방광삼각(흡수). 요관눈=요관쌍(중간공팔관 유래).

[해부학 · 간 혈류]

35. 굴모양혈관·중심정맥 통과 직후 도달하는 혈관은?


정답 ①

중심정맥의 혈액은 소엽밑정맥을 거쳐 간정맥으로 모여 아래대정맥으로 나간다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 간 혈류: 문맥+간동맥→굴모양혈관→중심정맥→소엽밑정맥→간정맥→아래대정맥.

[조직학 · 샘 분비방식]

36. 화살표 구조물과 분비 방식이 같은 샘 조직은?




정답 ①

화살표 구조가 세포 손상 없이 분비물만 내보내는 온분비(merocrine/exocytosis) 방식이면 같은 방식의 갑상샘이 답이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 분비방식: 온분비(exocytosis·대부분 샘)·부분분비(apocrine·젖샘·큰땀샘)·온몸분비(holocrine·기름샘).

[조직학 · 소장 감별]

37. 소화관 현미경 — 이 장기는?





정답 ②

점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 보이면 돌창자(ileum)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 소장: 샘창자(브루너샘)·빈창자(긴 용모·돌림주름)·돌창자(파이어판). 큰창자=용모 없음.

[해부학 · 다리 근막간]

38. 무릎 골절, 근력저하 예상 근막간은?



정답 ①

골절부 신경 손상으로 해당 근막간의 근력이 떨어진다. 사진 판독상 A, B, 정답 ①.

■ 관련 지식: 종아리 근막간: 앞칸(깊은종아리신경·발등굽힘)·가쪽칸(얕은종아리신경·가쪽번짐)·뒤칸(정강신경·발바닥굽힘).

[해부학 · 아래팔 신경지배]

39. 아래팔 근육 중 운동 지배 신경이 다른 것은?




정답 ③

아래팔 앞칸 대부분은 정중신경 지배이지만, 자쪽손목굽힘근·깊은손가락굽힘근 안쪽절반은 자신경 지배로 다르다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 아래팔 앞칸: 대부분 정중신경, 예외=자쪽손목굽힘근·깊은손가락굽힘근(내측)=자신경. 뒤칸=노신경.

[조직학 · 부신속질·크롬친화세포]

40. 두통·고혈압, 왼 부신 종대 — 관련 부위는?



정답 ⑤

발작성 고혈압·두통은 부신속질 종양(갈색세포종)을 시사하며, 카테콜아민을 분비하는 부신속질이 관련 부위다. 사진의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 부신속질=크롬친화세포·카테콜아민(에피네프린). 갈색세포종=발작성 고혈압·두통·발한·심계항진(5H).

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

Ⅲ. 순환·신경·통합 (41~60)

[해부학 · 음낭·정삭막]

41. 속정삭근막과 연결된 앞배벽 구조물은?

정답 ④

속정삭근막은 앞배벽의 배가로근막(transversalis fascia)이 이어져 형성된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 정삭막: 바깥정삭근막(배바깥빗근널힘줄)·고환올림근막(배속빗근)·속정삭근막(배가로근막). 층별 대응.

[조직학 · 모세혈관 크기]

42. 적혈구 크기 기준, 화살표 혈관의 너비는?




정답 ②

적혈구 지름(약 7~8 μm)을 기준으로 볼 때 화살표 혈관은 약 15~20 μm 다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 모세혈관 지름 $\approx$ 8~10 μm (적혈구 한 줄). 세동맥·세정맥은 그보다 크다. 적혈구=측정 기준자.

[신경해부 · 뇌출기·감각로]

43. 낙상 후 다리 감각 소실, 뇌출기 단면 관련 구조물은?



정답 ④

다리의 촉각·고유감각을 전달하는 상행로(안쪽섬유띠)에 해당하는 부위다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 뇌출기 상행각각: 안쪽섬유띠(뒤섬유단 연속·미세촉각/고유감각)·척수시상로(통온각). 다리=안쪽/가쪽 배열.

[발생학 · 배꼽탈장]

44. 신생아 창자가 탯줄로 빠져나감 — 원인은?




정답 ⑤

양막에 싸인 창자가 탯줄로 탈출한 배꼽탈장(omphalocele)은 생리적 배꼽탈장이 복강으로 복귀하지 못한 것이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 배꼽탈장(막 있음·탯줄기저·기형 동반)↔배벽갈림증(막 없음·오른배꼽옆). 생리적 탈장=6~10주.

[조직학 · 부신겉질·쿠싱]

45. 쿠싱 소견(자주색 줄무늬), 코티솔 분비 부위는?



정답 ③

코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 부신겉질(GFR): 토리층=알도스테론, 다발층=코티솔, 그물층=안드로젠. 속질=카테콜아민.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[해부학 · 햄스트링 손상]

46. 달리기 중 넓적다리 뒤 손상, 무릎 굽힘 곤란 — 손상 근육은?

정답 ④

넓적다리 뒤편 햄스트링(무릎 굽힘) 손상으로, 보기 중 반막근(semimembranosus)이 해당한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 햄스트링=반막근·반힘줄근·넓다리두갈래근(궁둥신경). 엉덩관절 펴+무릎 굽힘. 육상 급성 손상 호발.

[해부학 · 심장 영상해부]

47. 가슴 CT 설명으로 옳은 것은?




정답 ①

판막·심방/심실 위치관계상 옳은 설명은 "①과 ④ 사이에 승모판막이 있다"이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 심장 CT: 원심방-원심실 사이 승모판, 오른심방-오른심실 사이 삼첨판. 원심실 벽이 가장 두껍다.

[신경해부 · 시각로]

48. 뇌전이암, 시야결손 — 손상 예상 부위는?




정답 ④

시야결손 양상에 맞는 시각로 병변 부위(사진의 4)가 정답 ④.

■ 관련 지식: 시각로: 시신경(동측 실명)·시신경교차(양귀쪽반맹)·시각로/시각부챗살(반대쪽 동측반맹). 결손 형태로 국소화.

[조직학 · 여과틈새막]

49. 발세포 발돌기가 형성하는 여과틈새에 해당하는 구조물은?




정답 ②

발돌기 사이를 잇는 여과틈새막(slit diaphragm, nephrin)이 여과를 제한한다. 사진의 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽 3층: 창내피·토리바닥막(음전하)·발세포 여과틈새막(nephrin). 손상=단백뇨.

콩팥 토리 여과장벽 3층

혈액(모세혈관) 쪽



소변(보먼공간) 쪽

[해부학 · 피부분절]

50. 배꼽 감각 정상, 고살인대 근처 감각 소실 — 손상 척수분절은?

정답 ④

배꼽은 T10, 고살(서혜)부위 피부분절은 L1이므로 손상 분절은 L1이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 피부분절 랜드마크: 젖꼭지 T4, 배꼽 T10, 고살 L1, 무릎 L3~4, 새끼발가락 S1.

[신경해부 · 뒤대뇌동맥]

51. 뇌바닥동맥 끝가지로 관자엽·뒤통수엽에 분포하는 동맥은?




정답 ③

뇌바닥동맥의 끝가지로 관자엽·뒤통수엽(시각겉질)에 분포하는 것은 뒤대뇌동맥(PCA)이다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 대뇌동맥고리: 앞·중간대뇌동맥(속목동맥계)+뒤대뇌동맥(뇌바닥동맥). PCA=뒤통수엽 시각→반대쪽 동측반명.

[해부학 · 팔 혈관]

52. 왼팔 발달지연·감각저하, 혈관 기형 예상 부위는?




정답 ⑤

팔 전체에 영향을 주는 근위 혈관 기형은 빗장밑동맥(subclavian artery) 부위다. 사진의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 팔 동맥: 빗장밑→거드랑→위팔→노/자동맥. 근위(빗장밑) 병변=팔 전체 허혈·발달장애.

[조직학 · 허파 상피]

53. 허파 조직에서 표시한 상피의 종류는?



정답 ③

허파파리를 덮는 얇은 상피는 가스교환에 적합한 단층편평상피(1형 폐포세포)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 상피: 단층편평(폐포·혈관내피)·단층입방(세관)·거짓중층섬모원주(기도). 폐포=단층편평(가스교환).

[해부학 · 내장통증]

54. 위 몸통 궤양 통증을 전달하는 신경은?

정답 ②

위의 통증(내장구심)은 큰내장신경(greater splanchnic nerve, T5~9)을 통해 전달된다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 내장신경: 큰내장(T5~9·위·간·이자)·작은내장(T10~11)·맨아래내장(T12). 연관통=해당 척수분절 피부.

[조직학 · 술잔세포]

55. 기관지 점액을 분비하는 세포는?

정답 ②

기도상피의 술잔세포(goblet cell)가 점액을 분비해 이물을 흡착하고, 섬모가 이를 밀어낸다(점액섬모청소). 정답 ②.

■ 관련 지식: 기도상피: 섬모세포·술잔세포(점액)·바닥세포(줄기)·신경내분비세포. 점액섬모청소=방어.

[해부학 · 손목뼈 골절]

56. 손 짚고 넘어짐, 손목 가쪽 통증 — 골절된 뼈는?



정답 ②

손을 짚고 넘어진 뒤 해부학교담배갑(손목 가쪽) 압통은 손배뼈(scaphoid) 골절의 특징이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 손배뼈 골절: 해부학교담배갑 압통, 혈류 특성상 무혈괴사·불유합 위험. 초기 방사선 음성 가능.

[해부학 · 음부신경 차단]

57. 궁둥뼈가시 촉진 후 주사 — 마취되는 신경은?

정답 ①

궁둥뼈가시·엉치가시인대 주위 국소마취는 음부신경차단(S2~4)으로 회음부 통증을 완화한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 음부신경: 궁둥뼈가시 돌아 음부관 주행, 회음·외음부 감각·바깥항문/요도조임근. 궁둥뼈가시=차단 지표.

[해부학 · 공팔 해부]

58. 공팔의 해부학적 구조로 옳은 것은?


정답 ③

왼공팔정맥은 대동맥 앞을 가로질러(대동맥과 위창자간막동맥 사이) 아래대정맥으로 들어간다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 공팔: 오른공팔이 간 때문에 약간 아래. 왼공팔정맥이 길고 대동맥 앞을 지남(호두까기증후군). 공팔근막이 부신 포함.

[해부학 · 큰창자 특징]

59. 큰창자 삼각형 주름(팽대)을 수동적으로 만드는 구조물 A는?



정답 ①

큰창자의 세로근육이 세 띠로 모인 잘록창자띠(taenia coli)가 창자를 오그려 팽대(haustra)를 만든다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 큰창자 특징: 잘록창자띠·잘록창자팽대(haustra)·복막주렁. 띠가 장보다 짧아 주머니 형성.

[조직학 · 황체 유지·hCG]

60. 임신 초기 난소 황체를 유지하는 호르몬은?

정답 ⑤

착상한 영양막이 분비하는 사람융모막생식샘자극호르몬(hCG)이 황체를 유지해 프로게스테론 분비를 지속시킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: hCG: 영양막 분비, 황체 유지(임신 유지)·임신검사 표지. 이후 태반이 프로게스테론 분비 주도(황체-태반 전환).