

2021년도 4교시 문항별 상세 해설

병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양·유전 (1~18)

[병리학 · 발암기전]

1. HPV E6·E7이 p53·pRB를 불활성화 — 관여하는 종양 발생 기전은?


정답 ④

E6→p53 분해, E7→pRB 불활성화로 세포주기 검문점이 무력화되어 세포주기조절이상을 통해 발암한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 암의 특징(Hanahan): 증식신호 지속·성장억제 회피·세포사멸 회피·복제불멸·혈관신생·침습전이·면역회피·유전불안정. p53=게놈수호자, pRB=G1/S 검문점.

[병리학 · 결정질·통풍]

2. 엄지발가락 결정, 길고 가는 바늘 결정 — 결정 물질은?



정답 ①


길고 가는 바늘 모양(음성 복굴절) 결정은 요산염(monosodium urate)으로 통풍의 특징이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 통풍=요산염 결정(바늘·음성복굴절). 가성통풍=칼슘피로인산(마름모·양성복굴절). 통풍결정 주위 이물육아종.

감별/오답: ④칼슘피로인산=가성통풍(다른 결정 형태).

[병리학 · 갑상샘암]

3. 갑상샘 종괴·칼시토닌↓ — 진단은?




정답 ③

칼시토닌 상승은 소포결세포(C세포) 기원 수질암종의 표지다. 아밀로이드 기질이 특징. 정답 ③.

■ 관련 지식: 갑상샘암: 유두암(가장 흔함·BRAF·핵특징)·소포암(혈행전이)·수질암(C세포·칼시토닌·MEN2·RET)·역형성(고령·불량).

[병리학·육아종성 염증]

4. 공동성 폐병변·건락괴사 — 형성에 큰 역할을 하는 세포는?




정답 ④

결핵의 건락육아종은 대식세포가 상피모양세포·랑한스거대세포로 분화해 형성한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 육아종=활성 대식세포(상피모양세포)+림프구. 건락괴사=결핵. Th1/IFN- γ 매개(제IV형 과민). 랑한스거대세포.

[병리학·분자병리검사]

5. 폐 샘암종(뇌 전이), 표적치료용 유전자변이 확인 검사는?



정답 ⑤

폐 샘암종의 치료표적 변이(EGFR 등)는 염기서열 수준의 PCR 기반 유전자검사(genotyping)로 확인한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 분자검사: 점돌연변이=PCR/시퀀싱, 유전자재배열/증폭=FISH, 단백질발현=면역조직화학. 폐샘암=EGFR·ALK·ROS1 표적.

[병리학·소아 위장관]

6. 4주 남아, 담즙 없는 분출성 구토·올리브 덩이·날문근 4mm — 진단은?

정답 ③

분출성(비담즙성) 구토와 촉진되는 올리브 모양 덩이, 날문근 비후는 비대날문협착이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 비대날문협착: 생후 2~8주 남아, 분출성 비담즙성 구토·저염소성 대사알칼리증. 치료=날문근절개.

[병리학·유방암 표적]

7. Herceptin(Trastuzumab) 선택 근거 소견은?


정답 ⑤

Trastuzumab은 HER2 양성 유방암을 표적하는 단클론항체다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 유방암 분자아형: ER/PR(내분비치료), HER2(트라스투주맵), 삼중음성(예후불량). HER2=ERBB2 증폭.

[병리학·쇼그렌증후군]

8. 안구·구강건조·침샘 림프구 침윤 — 자가항체는?



정답 ⑤

건조증상+침샘 림프구 침윤은 쇼그렌증후군으로, 항SS-A(Ro)/SS-B(La) 항체가 검출된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 자가항체: 항Sm=SLE 특이, 항dsDNA=SLE(신염), 항Scl-70=전신경화증, 항SS-A/B=쇼그렌·신생아루푸스.

[병리학 · 과민반응]

9. 니켈 목걸이 접촉피부염, CD4 T세포 — 관련 과민반응은?

정답 ②

접촉피부염은 감작된 CD4 T세포 매개 지연(제Ⅳ형)과민반응이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 과민반응: I형(IgE·즉시·아나필락시스)·II형(항체·세포)·III형(면역복합체)·IV형(T세포·지연: 접촉피부염·결핵반응·이식거부).

[병리학 · HPV·자궁경부]

10. 고등급 자궁경부 병변에서 가장 흔한 HPV 아형은?


정답 ③

고위험 HPV-16(및 18형)이 고등급 병변·자궁경부암에서 가장 흔하다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 고위험 HPV=16·18(암), 저위험=6·11(사마귀·콘딜로마). 백신=16/18(±6/11) 포함.

[병리학 · 목·낭성병변]

11. 가쪽 목 무통성 낭 — 진단은?



정답 ④

측경부의 무통성 낭은 아가미틈새낭(branchial cleft cyst)이다(편평상피 이장+림프조직). 정답 ④.

■ 관련 지식: 목 낭: 아가미틈새낭=가쪽·편평상피, 갑상허관낭=정중선·혀뼈 부근·삼킴 시 이동. 위치로 감별.

감별/오답: ⑤갑상허관낭=정중선.

[병리학 · 가족섬종폴립증]

12. 대장 수백 개 용종 → 유전자는?




정답 ①

수백~수천 개 대장 용종의 가족섬종폴립증(FAP)은 APC 종양억제유전자 변이가 원인이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: FAP: APC(5q) 생식세포 변이, 100% 대장암 진행→예방적 전절제. 대장암 경로: APC→KRAS→TP53(선종-암 연속).

[병리학 · 방광암 병기]

13. 방광 요로상피암 치료 결정에 가장 중요한 인자는?



정답 ④

방광암은 고유근층(muscularis propria) 침범 여부가 병기와 치료(경요도절제 vs 방광절제)를 좌우한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 방광 요로상피암: 근층 비침범(표재성)=경요도절제+BCG, 근층 침범=근치적 방광절제. 병기가 등급보다 예후 결정적.

[병리학 · 삼염기반복질환]

14. 지적장애, Xq27.3 삼염기반복 변이 — 질병은?


정답 ③

Xq27.3의 CGG 삼염기반복 확장(FMR1)은 여린X증후군으로, 남아 지적장애의 흔한 유전 원인이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 삼염기반복질환: 여린X(CGG·FMR1)·헌팅턴(CAG)·근긴장디스트로피(CTG)·프리드라이히실조(GAA). 표현촉진(anticipation).

[병리학 · 바렛식도]

15. 하부식도 반점 선홍색 변화(바렛식도) — 추적할 합병증은?




정답 ①

만성 위식도역류로 생긴 바렛식도(장상피화생)는 샘암종(adenocarcinoma)으로 진행할 수 있어 추적이 필요하다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 바렛식도=원주상피 화생(술잔세포)→이형성→식도 샘암종. 반면 식도 상부 편평상피암=흡연·음주.

[병리학 · 포상기태]

16. hCG↑·포도알 병터·p57 음성 — 진단은?




정답 ③

hCG 현저 상승, 포도송이 용모, p57 음성(부계 유전자만)은 완전포상기태다(46,XX 부계기원). 정답 ③.

■ 관련 지식: 포상기태: 완전(부계만·p57 음성·46,XX·용모막암 위험↑) vs 부분(삼배수체·p57 양성·태아조직 있음). p57=모계발현 각인.

[병리학 · 소포림프종]

17. 전신 림프절종대, 크기 비슷한 림프여포결절 — 관련 유전자는?




정답 ②

균일한 여포성 결절 증식의 소포림프종은 t(14;18)로 BCL2가 과발현되어 세포자멸을 억제한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 림프종-유전자: 소포(BCL2·t14;18)·버킷(MYC·t8;14)·외투세포(CCND1·t11;14)·APL(PML-RARA·t15;17).

[병리학 · 췌장 양성종양]

18. 췌장꼬리 점액 낭성병변 — 진단은?



정답 ③

췌장 몸통·꼬리에 생기는 점액 함유 낭에 난소형 기질을 동반하면 점액성 낭샘종이다(중년 여성). 정답 ③.

■ 관련 지식: 췌장 낭: 장액성 낭샘종(중앙 반흔·양성)·점액성 낭샘종(꼬리·여성·악성화 가능)·IPMN(관내). 거짓낭=염증성(상피 없음).

II. 병리학 — 순환·전신·신경 (19~45)

[병리학 · 혈류역동 장애]

19. 치핵·메두사머리·식도정맥류에 공통된 혈류역동 장애는?

정답 ④

세 소견 모두 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈(congestion)과 결순환(문맥-체순환 문합)의 결과다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 울혈=정맥 유출 저하(수동적). 충혈=동맥 유입 증가(능동적). 문맥고혈압 결순환: 식도정맥류·치핵·배꼽정맥(메두사머리).

[병리학 · 간경변·지혈]

20. 간경변(작고 딱딱)·비장종대, 발치 후 지혈 안 됨 — 원인은?

정답 ③

간이 합성하는 응고인자가 감소해 지혈이 안 된다(비장종대에 의한 혈소판 감소도 기여하나 근본은 합성 저하). 정답 ③.

■ 관련 지식: 간=대부분 응고인자(II·VII·IX·X 등, 비타민K 의존) 합성. 간부전→PT 연장. 비장기능항진→혈소판↓.

[병리학 · 갑상샘저하]

21. 피로·추위·변비·거친 피부·갑상샘종대 — 가장 흔한 원인은?

정답 ⑤




갑상샘기능저하의 가장 흔한 원인은 자가면역 하시모토갑상샘염이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 하시모토: 항TPO·항티로글로불린 항체, 림프구 침윤·Hürthle세포, 갑상샘종대 후 위축. 갑상샘저하 최다 원인.

감별/오답: ③그레이브스병=갑상샘항진.

[병리학 · 사구체신염]

22. 소아, 콜라색 소변, 인후염 1개월 후 — 진단은?



정답 ④


선형 인두염(연쇄구균) 후 발생한 급성 신염증후군은 감염후사구체신염이다. 전자현미경상 상피말 혹(hump)이 특징. 정답 ④.

■ 관련 지식: 감염후사구체신염: 상피말 혹·과립상 C3/IgG·보체↓. IgA신증=인두염과 동시(수일 내)·메산지움 IgA로 감별.

감별/오답: ①IgA신증=상기도감염과 동시 발생.

[병리학 · 고환종양]

23. 잠복고환력, AFP·βHCG 정상, 균질 회황색 — 진단은?



정답 ①


균질한 회황색 고형종양에 종양표지자 정상, 명세포 시트가 보이면 고환종(seminoma)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 고환종양: 정상피종(seminoma·표지자 정상·방사선 민감), 비정상피종(배아암종·난황낭종양=AFP↑·융모막암=βHCG↑).

잠복고환=위험인자.

[병리학 · 탈수초질환]

24. 재발-완화 신경증상, LFB 염색 병변 — 일차 손상 구조는?




정답 ②

재발-완화 경과와 luxol fast blue(말이집 염색)로 드러난 탈수초 반은 다발경화증으로, 말이집(myelin)이 일차 손상된다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 다발경화증: 중추 말이집 소실(반·plaque), 뇌실주위 호발, 재발완화, 시신경염·MLF증후군. LFB=말이집 염색.

[병리학 · 석면·중피종]

25. 광부·흡수+흡막 종괴 — 진단은?



정답 ③

흡막을 둘러싸는 종괴+다량 흡수는 석면 노출과 연관된 악성중피종이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 석면=중피종(흡막)·폐암. 중피종: calretinin·WT1 양성. 규폐증·탄광부진폐증=결절성 섬유화(종괴X).

[병리학 · 당뇨병케토산증]

26. 16세, 다뇨·체중감소, pH 7.1·PCO₂ 17·케톤 양성 — 진단은?

정답 ④

고혈당·케톤뇨·높은 음이온차 대사산증(pH 7.1·PCO₂ 보상 저하)은 당뇨병케토산증(DKA)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: DKA(주로 1형): 고혈당·케톤산증·탈수, Kussmaul 호흡, 총칼륨↓·측정칼륨 정상/↑. 치료=수액·인슐린·칼륨.

감별/오답: ⑤고삼투압증후군=2형·매우 고혈당·케톤 경미.

[병리학 · 급성췌장염]

27. 음주 후 등으로 퍼지는 복통, 아밀라아제 2022 — 특징적 병리는?

정답 ⑤


알코올성 급성췌장염의 특징적 병리는 급성염증과 지방괴사(효소성)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 급성췌장염(담석·알코올): 지방괴사·출혈·칼슘비누. 만성췌장염=섬유화·석회화·관확장·실질위축(①~④는 만성 소견).

감별/오답: ①~④는 만성췌장염 소견.

[병리학 · 유방암 조직형]

28. 유방 종괴, E-cadherin 음성 — 진단은?





정답 ⑤

E-cadherin 소실(음성)은 세포가 한 줄로 늘어서는 침습소엽암종의 특징이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 유방암: 관암종(E-cadherin 양성·경화성 덩어리) vs 소엽암종(E-cadherin 음성·CDH1·단열배열·양측성 경향).

[병리학 · 갑상샘 유두암]

29. 갑상샘 종양(유두상 핵특징) — 가장 흔한 유전자 이상은?



정답 ①

갑상샘 유두암종에서 가장 흔한 유전자 이상은 BRAF(V600E)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 유두암 핵특징: 간유리핵·핵구·핵내봉입·홍. 유전자=BRAF·RET/PTC재배열. 예후 양호(림프전이).

[병리학 · 위장관기질종양]

30. GIST의 기원 세포와 가장 흔한 유전자변화는?



정답 ①

GIST는 카할세포(간질카할세포) 기원이며 KIT(CD117) 활성화변이가 가장 흔하다. 정답 ①.

■ 관련 지식: GIST: CD117(KIT)·DOG1 양성, KIT/PDGFRA 변이. 표적치료=이마티닙. 카할세포=위장관 페이스메이커.

[병리학 · 난소 생식세포종양]

31. 젊은 여성, 고형 난소종양·LDH↑, AFP/βHCG 정상 — 진단은?



정답 ②

고형·소엽상 난소종양에 LDH 상승, 표지자 정상은 정상피종의 난소 대응인 난소고환종(dysgerminoma)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 난소 생식세포종양: 난소고환종(dysgerminoma·LDH↑·방사선민감)·난황낭(AFP↑)·용모막암(βHCG↑)·미성숙기형종.

[병리학 · 대혈관염]

32. 젊은 남자, 양팔 혈압차·무맥, 대동맥 촬영 — 진단은?




정답 ③

젊은 여성/성인에서 대동맥·큰가지 협착으로 맥박 소실·혈압 좌우차가 나타나는 것은 다카야스동맥염(무맥병)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 혈관염 크기: 대혈관=다카야스(젊음)·거대세포(고령·측두동맥·실명). 중=결절다발·가와사키. 소=ANCA관련·현미경다발.

[병리학 · 헬리코박터위염]

33. 위생검 Giemsa 염색 — 원인은?




정답 ③

Giemsa 염색으로 드러난 만곡균은 헬리코박터 파일로리로, 만성위염·소화궤양·MALT림프종·위암과 연관된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: H. pylori: 요소분해효소(요소호기검사)·CagA. 소화궤양·B세포 MALT림프종·위생암 위험. 제균 3제요법.

[병리학 · 호지킨림프종]

34. 전종격동 종양, CD30+·CD15+ — 진단은?




정답 ⑤

리드-스텐버그세포(CD30+/CD15+)를 보이는 전종격동 종양은 호지킨림프종(결절경화형)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 호지킨: R-S세포(CD15·CD30), 결절경화형(젊은 여성·종격동 최다). 비호지킨과 달리 인접 전파·B증상.

[병리학 · 글리코겐축적근병]

35. 운동 시 근통·근경련, myophosphorylase 음성 — 진단은?




정답 ②

운동유발 근통·근육경련·근색소뇨에 미오포스포릴라아제(근인산분해효소) 결핍은 맥아들병(McArdle, 제 V 형)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 글리코겐축적병: 폰페(제 II · 산성말타아제·심비대)·맥아들(제 V · 근인산분해효소·운동불내성·second wind)·코리·폰기어케.

[병리학 · 신경교종 분류]

36. 전두엽 종양, IDH1 양성 — 추가할 검사는?





정답 ①

IDH 변이 신경교종에서 희소돌기아교세포종 확정을 위해 1p/19q 공동결실(FISH)을 확인한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 성인 미만신경교종: IDH 변이+1p/19q 결실=희소돌기교종, IDH변이+ATRX소실=별아교세포종, IDH야생형=교모세포종.

[병리학 · 폐암 조직형]

37. 기관지 폐쇄 중심성 폐종양 — 진단은?





정답 ⑤

기관지를 막는 중심성 폐종양에 각질화·세포간교가 보이면 편평세포암종이다(흡연·중심성). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 폐암: 편평세포암(중심성·흡연·PTHrP 고칼슘)·소세포암(중심성·신경내분비·SIADH)·샘암(말초·비흡연/EGFR).

[병리학 · 간세포암종]

38. B형간염 추적 중 간종괴 — 진단은?




정답 ③

만성 B형간염(간경변) 배경의 간종괴는 간세포암종(HCC)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: HCC 위험: 만성 B/C간염·간경변·아플라톡신. 표지자=AFP. 영상=동맥기 조영증강+문맥기 washout.

[병리학 · 심근경색 시간경과]

39. 흉통·트로포닌↑, 당일 사망 시 심근 조직 소견은?




정답 ②

경색 발생 약 1일이면 중성구 침윤이 나타난다(응고괴사 초기). 정답 ②.

■ 관련 지식: 심근경색 시간: 0~4h(변화 미미)→응고괴사·중성구(1~3일)→대식세포·육아조직(1~2주)→섬유화 반흔(수주~). 트로포닌=수시간 상승·1~2주 지속.

[병리학 · 세포자멸사]

40. 세포자멸사의 전자현미경 특징 소견은?



정답 ④


세포자멸사(apoptosis)는 염색질 응집(핵농축)·세포 수축·자멸소체 형성이 특징이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 세포자멸사: 염색질응축·세포수축·막 보존·자멸소체·염증 없음(카스파아제·미토콘드리아 경로). 괴사=팽창·막파괴·염증.

감별/오답: ③막 손상·⑤중성구 침윤=괴사 소견.

[병리학 · 염증 유형]

41. 사진의 염증으로 옳은 것은?




정답 ③

중성구와 괴사조직으로 이루어진 고름(농)을 형성하는 것은 화농(고름) 염증이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 삼출 염증: 장액성(맑은 액)·섬유소성(피브린·심장막)·화농성(고름·중성구·농양)·출혈성. 화농=화농균(포도알균).

[병리학 · 전립샘암]

42. 고령 남자, 딱딱한 전립샘·골전이 — 상승 종양표지자는?



정답 ③

전립샘암(골 조골성 전이)에서 전립샘특이항원(PSA)이 상승한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 종양표지자: PSA(전립샘)·CEA(대장)·AFP(간·난황낭)·CA125(난소)·CA19-9(췌장). 전립샘암=조골성 골전이.

[병리학 · 창상치유]

43. 화상 후 손가락이 펴지지 않음 — 관련 병리는?



정답 ①



화상·손상 후 반흔이 수축해 관절 운동이 제한되는 것은 구축(contracture)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 창상치유 이상: 구축(화상·반흔수축·근섬유모세포)·켈로이드(경계 넘는 콜라겐 과증식)·비후흉터·상처벌어짐.

감별/오답: ④켈로이드=경계 넘는 용기성 흉터.

[병리학 · 다낭공팔병]

44. 투석 후 신이식, 다낭성 신장 육안 — 관련 유전자는?




정답 ②

성인 양쪽 신장의 다수 낭(신부전)은 상염색체우성다낭공팔병으로 PKD1 변이가 가장 흔하다. 정답 ②.

■ 관련 지식: ADPKD: PKD1(대부분)·PKD2, 양측 다낭·고혈압·간낭·뇌동맥류. ARPKD=PKHD1(영아). VHL=신세포암·혈관모세포종.

[병리학 · 알츠하이머]

45. 고령 기억장애·대뇌위축·출혈 — 축적물 확인 염색은?



정답 ②


알츠하이머·대뇌아밀로이드혈관병의 축적물은 베타아밀로이드로, 이를 확인하는 염색을 시행한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 알츠하이머: 노인반(β -아밀로이드)·신경섬유매듭(과인산화 타우). 아밀로이드혈관병→염성 뇌출혈. 기타: α -시누클레인(파킨슨)·TDP-43(FTD/ALS).

III. 기생충학 (46~60)

[기생충학 · 조충]

46. 대변에 마디 벌레·소고기 생식 — 치료는?



정답 ④

소고기 생식으로 감염되는 민촌충(무구조충, *Taenia saginata*)이며 치료는 프라지판텔이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 조충 치료=프라지판텔. 민촌충(소·마디 능동배출)·갈고리촌충(돼지·낭미충증 위험)·광절열두조충(생선·B12 결핍).

[기생충학 · 독소포자충]

47. 고양이 종숙주·그물내피계 감염·태아 기형 — 기생충은?

정답 ③

고양이가 종숙주, 덜 익힌 고기로 감염, 그물내피계 감염, 임신초기 태아 기형(뇌수종·맥락망막염)을 일으키는 것은 독소포자충이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 독소플라스마: 고양이(종숙주), 사람=중간숙주. 선천감염(TORCH)·면역저하 시 뇌염. 삼징=수두증·뇌내석회화·맥락망막염.

[기생충학 · 주혈흡충]

48. 필리핀 여행, 호산구↑·대변잠혈+ — 진단은?



정답 ⑤

필리핀 유행지, 호산구증가·혈변은 일본주혈흡충증이다(측방 소극이 있는 총란). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 주혈흡충: 피부 침입(세르카리아)·정맥 기생. 일본주혈흡충=장·간(간섬유화). 방광주혈흡충=방광암 연관.

[기생충학 · 파동편모충(샤가스)]

49. 브라질, 노린재 물림·눈꺼풀 부종 — 진단은?



정답 ③

남미, 노린재(트리아토민) 물림 후 눈꺼풀 부종(로마냐 징후)은 파동편모충증(샤가스병, *T. cruzi*)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 샤가스병: 노린재 매개, 급성=로마냐징후, 만성=심근병증·거대식도/거대결장. 혈액도말 트리파노소마.

[기생충학 · 요충]

50. 소아 야간 항문 가려움, 셀로판테이프 도말 — 치료는?




정답 ①

야간 항문 소양·셀로판테이프법으로 진단하는 요충(Enterobius)은 알벤다졸(또는 메벤다졸)로 치료한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 요충: 항문주위 산란(야간)·가족 감염, D형(편측 팽대) 총란. 치료=알벤다졸/메벤다졸·2주 후 반복.

[기생충학 · 포충(에키노코쿠스)]

51. 중앙아시아 출신, 간 낭·낭액 현미경 — 진단은?




정답 ②

목축지역(우즈베키스탄) 출신의 간 낭에서 원두절(protoscolex)이 보이면 포충증(echinococcosis, 포낭충)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 포충증: 개(중숙주)·양(중간숙주), 간·폐 포낭. 낭액=원두절·갈고리. 파열 시 아나필락시스. 치료=알벤다졸±수술(PAIR).

[기생충학 · 회충]

52. 위내시경 중 발견된 기생충의 총란은?



정답 ②

위내시경 중 발견된 큰 선충은 회충(Ascaris)으로, 그 총란은 두껍고 울퉁불퉁한 유단백막을 가진 둥근 알(사진 40-2)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 회충 수정란=둥글고 두꺼운 유단백막(mammillated). 편충란=술통형 양극마개, 구충란=얇은 껍질·난할. 폐이행(뢰플러).

[기생충학 · 요코가와흡충]

53. 은어회 섭취(하동), 복통·설사 — 진단은?




정답 ④

은어·잉어류 생식으로 감염되는 장흡충 요코가와흡충이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 요코가와흡충: 은어(제2중간숙주) 생식, 소장 기생·설사. 충란은 간흡충과 유사(작고 난개). 치료=프라지관텔.

[기생충학 · 피부유충이행증]

54. 해변 맨발 여행 후 발의 이행발진(creeping eruption) — 원인 기생충은?



정답 ④

해변에서 맨발로 유충에 감염되어 생기는 피부유충이행증(creeping eruption)은 개·고양이구충(*Ancylostoma braziliense*)이 원인이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 피부유충이행증=동물 구충 유충이 사람 피부 내 이동(막다른 감염). 내장유충이행증=개회충(*Toxocara*).

[기생충학 · 이(louse)]

55. 선원, 겨드랑·허리 가려움, 옷깃에서 4mm 벌레 — 원인은?




정답 ①

옷깃·술기에 서식하며 몸통을 무는 4mm 곤충은 몸니(이, body louse)다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 이: 몸니(옷 술기·발진티푸스 매개)·머릿니·사면발니. 웜진드기=굴 파는 진드기(손가락사이·야간소양·가족).

[기생충학 · 사상충]

56. 림프부종·코끼리피부병 유발 미세사상충, 검출 최적 시간은?




정답 ⑤

림프사상충(반크로프트사상충)의 미세사상충은 야간주기성을 보여 밤 12시경 말초혈액에서 가장 잘 검출된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 림프사상충증: 모기 매개, 림프관 폐색→상피병(코끼리피부)·음낭수종. 미세사상충 야간주기성(밤 채혈).

[기생충학 · 말라리아]

57. 연천 북부 군인, 격일 발열(삼일열 주기) — 원인체는?




정답 ③

국내(경기북부) 토착 말라리아로 격일(48시간) 발열 주기를 보이는 것은 삼일열원충(*Plasmodium vivax*)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 말라리아: 삼일열(*vivax*·국내·재발/휴면소체)·열대열(*falciparum*·중증·뇌말라리아). 얼룩날개모기 매개, 발열=적혈구 파열.

[기생충학 · 간흡충]

58. 담관 비후·확장, 담관 내 움직이는 음영 — 진단은?




정답 ②

민물고기 생식으로 담관에 기생하는 간흡충(*Clonorchis sinensis*)이다. 만성 감염은 담관암 위험을 높인다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 간흡충: 민물고기(제2중간숙주) 생식, 담관 기생·담관염·담관암. 작은 난개 총란. 치료=프라지판텔.

[기생충학 · 질편모충]

59. 요도염(성접촉), 젖은퍼바른표본 운동성 원충 — 진단은?




정답 ②

성매개로 감염되고 운동성 편모충이 보이는 요도염·질염은 질편모충증(*Trichomonas vaginalis*)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 질편모충: 성매개, 딸기자궁목·거품냉·운동성 영양형(포낭기 없음). 치료=메트로니다졸(파트너 동시).

[기생충학 · 람블편모충]

60. 동남아 여행 후 냄새 고약한 지방성 설사 — 진단은?



정답 ②

여행 후 악취 나는 지방성 설사(흡수장애)는 람블편모충증(*Giardia lamblia*)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 람블편모충: 십이지장 기생·지방변·흡수장애, 얼굴모양 영양형·타원 포낭. 물 매개. 치료=메트로니다졸/티니다졸.

감별/오답: ④이질아메바=혈성 점액변·간농양으로 감별.