
108 | orientation selected from PEARSON positive_total_area, threshold=0.50
PEARSON_global_score_40C
Pearson r=-0.100 (p=0.593) | Spearman ρ=0.073 (p=0.698) | Kendall τ=0.059 (p=0.645)
Pearson log1p(activity) r=0.097 (p=0.603)
PA6 activity (µM)
SURFMATCH global score
0
50
100
150
200
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
NylCa
NylCk
NylCp2_TS
NylCp2
UMGSP2
UMGSP1
GatA
tt_NylC
UMGSP3
ReU
Ooh
nc_NylC
TtA
NfpolyA
HotPETase
ThcCut1
FsC
Tfcut2
AoC
NylB
Subtilisin
Trypsin
chymotrypsin
LCC_ICCG
ph_NylC
HiC
Papain
MsmegA
Cut190
MGS0156
ThcCut2
Structural groups (D=0.50)
SG1 NylC-like (n=7)
SG10 Subtilisin isolated (n=1)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
SG7 Papain / bromelain (n=1)
Global linear regression
SG1 NylC-like regression (r=-0.29, p=0.53)
Global statistics\nn = 31\nR² = 0.010\nRMSE = 73.54 µM
Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory
SG1 NylC-like (n=7)
Pearson r=-0.29 (p=0.53)
Spearman ρ=-0.54 (p=0.21)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
Pearson r=0.38 (p=0.281)
Spearman ρ=0.51 (p=0.136)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
Pearson r=0.79 (p=0.0105)
Spearman ρ=0.62 (p=0.0722)