078 | orientation selected from PEARSON global_score
PEARSON_negative_total_area_40C
Pearson r=0.626 (p=1.65e-04) | Spearman ρ=0.543 (p=0.00159) | Kendall τ=0.374 (p=0.00373)
Pearson log1p(activity) r=0.530 (p=0.00217)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG2 Amidase / urethane-like regression (r=-0.49, p=0.147)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.392\nRMSE = 57.63 µM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=0.26 (p=0.573)
  Spearman ρ=0.14 (p=0.758)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=-0.49 (p=0.147)
  Spearman ρ=-0.40 (p=0.25)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=0.58 (p=0.104)
  Spearman ρ=0.42 (p=0.258)