050 | orientation selected from FORMULA negative_max_area, threshold=0.50
FORMULA_global_score_50C
Pearson r=0.089 (p=0.634) | Spearman ρ=0.255 (p=0.166) | Kendall τ=0.168 (p=0.189)
Pearson log1p(activity) r=0.216 (p=0.243)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG3 Cutinase / PETase-like regression (r=-0.13, p=0.732)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.008\nRMSE = 88.86 µM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=-0.08 (p=0.858)
  Spearman ρ=-0.38 (p=0.403)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=0.26 (p=0.467)
  Spearman ρ=0.21 (p=0.567)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=-0.13 (p=0.732)
  Spearman ρ=0.02 (p=0.966)