050 | orientation selected from FORMULA negative_max_area, threshold=0.50
FORMULA_negative_max_area_50C
Pearson r=-0.268 (p=0.146) | Spearman ρ=-0.243 (p=0.187) | Kendall τ=-0.192 (p=0.138)
Pearson log1p(activity) r=-0.244 (p=0.186)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG3 Cutinase / PETase-like regression (r=-0.46, p=0.208)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.072\nRMSE = 85.96 µM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=0.42 (p=0.344)
  Spearman ρ=0.45 (p=0.317)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=0.08 (p=0.816)
  Spearman ρ=0.31 (p=0.377)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=-0.46 (p=0.208)
  Spearman ρ=-0.36 (p=0.339)