078 | orientation selected from PEARSON global_score
PEARSON_positive_max_area_50C
Pearson r=-0.215 (p=0.246) | Spearman ρ=-0.257 (p=0.162) | Kendall τ=-0.185 (p=0.156)
Pearson log1p(activity) r=-0.144 (p=0.44)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG3 Cutinase / PETase-like regression (r=-0.31, p=0.415)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.046\nRMSE = 87.14 µM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=-0.39 (p=0.385)
  Spearman ρ=-0.18 (p=0.694)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=-0.08 (p=0.819)
  Spearman ρ=0.17 (p=0.634)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=-0.31 (p=0.415)
  Spearman ρ=-0.39 (p=0.304)