127 | orientation selected from PEARSON negative_max_area, threshold=0.50
PEARSON_global_score_50C
Pearson r=0.246 (p=0.181) | Spearman ρ=0.494 (p=0.00476) | Kendall τ=0.360 (p=0.00493)
Pearson log1p(activity) r=0.513 (p=0.00314)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG3 Cutinase / PETase-like regression (r=0.36, p=0.342)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.061\nRMSE = 86.47 μM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=-0.36 (p=0.434)
  Spearman ρ=-0.14 (p=0.758)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=0.47 (p=0.165)
  Spearman ρ=0.43 (p=0.22)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=0.36 (p=0.342)
  Spearman ρ=0.49 (p=0.183)