127 | orientation selected from PEARSON negative_max_area, threshold=0.50
PEARSON_negative_total_area_50C
Pearson r=0.413 (p=0.0208) | Spearman ρ=0.229 (p=0.215) | Kendall τ=0.164 (p=0.201)
Pearson log1p(activity) r=0.274 (p=0.136)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG3 Cutinase / PETase-like regression (r=0.35, p=0.355)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.171\nRMSE = 81.24 µM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=-0.01 (p=0.986)
  Spearman ρ=-0.13 (p=0.788)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=-0.76 (p=0.011)
  Spearman ρ=-0.72 (p=0.0182)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=0.35 (p=0.355)
  Spearman ρ=0.37 (p=0.325)