
108 | orientation selected from PEARSON positive_total_area, threshold=0.50
PEARSON_global_score_50C
Pearson r=-0.092 (p=0.623) | Spearman ρ=0.268 (p=0.145) | Kendall τ=0.186 (p=0.147)
Pearson log1p(activity) r=0.219 (p=0.237)
PA6 activity (µM)
SURFMATCH global score
Structural groups (D=0.50)
SG1 NylC-like (n=7)
SG10 Subtilisin isolated (n=1)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
SG7 Papain / bromelain (n=1)
Global linear regression
Global statistics\nn = 31\nR² = 0.008\nRMSE = 88.84 µM
Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory
SG1 NylC-like (n=7)
Pearson r=-0.29 (p=0.521)
Spearman ρ=-0.25 (p=0.585)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
Pearson r=0.54 (p=0.107)
Spearman ρ=0.66 (p=0.0392)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
Pearson r=0.71 (p=0.0313)
Spearman ρ=0.65 (p=0.0596)
NylCk
NylCp2_TS
NylCa
NylCp2
tt_NylC
UMGSP2
nc_NylC
GatA
HotPETase
UMGSP1
FsC
NfpolyA
ThcCut1
LCC_ICCG
UMGSP3
HiC
TtA
Tfcut2
AoC
NylB
Trypsin
ReU
ph_NylC
MsmegA
ThcCut2
MGS0156
Ooh
Subtilisin
Papain
Cut190
chymotrypsin