078 | orientation selected from PEARSON global_score
PEARSON_global_score_50C
Pearson r=-0.423 (p=0.0176) | Spearman ρ=-0.326 (p=0.0731) | Kendall τ=-0.225 (p=0.0792)
Pearson log1p(activity) r=-0.255 (p=0.167)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG2 Amidase / urethane-like regression (r=0.36, p=0.311)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.179\nRMSE = 80.83 μM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=-0.67 (p=0.0962)
  Spearman ρ=-0.76 (p=0.0489)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=0.36 (p=0.311)
  Spearman ρ=0.55 (p=0.0972)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=0.53 (p=0.144)
  Spearman ρ=0.45 (p=0.23)