089 | orientation selected from PEARSON positive_max_area, threshold=0.50
PEARSON_negative_total_area_50C
Pearson r=0.450 (p=0.0112) | Spearman ρ=0.282 (p=0.124) | Kendall τ=0.221 (p=0.0851)
Pearson log1p(activity) r=0.287 (p=0.117)



Structural groups (D=0.50)
- SG1 NylC-like (n=7)
- SG10 Subtilisin isolated (n=1)
- SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
- SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
- SG4 MGS0156 / LipBC (n=1)
- SG6 Trypsin / chymotrypsin (n=2)
- SG7 Papain / bromelain (n=1)
- Global linear regression
- SG2 Amidase / urethane-like regression (r=-0.35, p=0.324)

Global statistics\nn = 31\nR² = 0.202\nRMSE = 79.69 µM

Within-group correlations (n ≥ 4)
exploratory

SG1 NylC-like (n=7)
  Pearson r=-0.18 (p=0.706)
  Spearman ρ=-0.32 (p=0.478)
SG2 Amidase / urethane-like (n=10)
  Pearson r=-0.35 (p=0.324)
  Spearman ρ=-0.41 (p=0.241)
SG3 Cutinase / PETase-like (n=9)
  Pearson r=0.07 (p=0.852)
  Spearman ρ=0.07 (p=0.854)