

Całki podstawowe

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$$

$$\int a dx = ax + C, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

Wzory wynikające z całek podstawowych

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 + p^2} dx = \frac{1}{p} \arctan \frac{x}{p} + C, \quad p \in \mathbb{R}$$

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = \ln \left(\tan \frac{\frac{\pi}{2} + x}{2} \right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{p^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{p} + C, \quad p \in \mathbb{R}$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + p}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 + p}| + C, \quad p \in \mathbb{R}$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \sqrt{x^2 + p} dx = \frac{1}{2} \left[p \ln |x + \sqrt{x^2 + p}| + x \sqrt{x^2 + p} \right] + C, \quad p \in \mathbb{R}$$

$$\int \sqrt{p^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left[p^2 \arcsin \frac{x}{p} + x \sqrt{p^2 - x^2} \right] + C, \quad p \in \mathbb{R}$$

Podstawienia Całek Niewymiernych

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, \quad \text{gdzie } a \neq 0, \Delta = b^2 - 4ac \neq 0,$$

oraz R jest funkcją wymierną dwóch zmiennych

Powyższą całkę rozwiązujemy używając **podstawień Eulera**:

I. $\sqrt{ax^2 + bx + c} = x\sqrt{a} - t, \text{ jeśli } a > 0,$

II. $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt - \sqrt{c}, \text{ jeśli } c > 0,$

III. $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x-x_1)(x-x_2)} = (x-x_1)t, \text{ jeśli } \Delta > 0.$

$$\int \frac{1}{(x-x_0)^k \sqrt{ax^2 + bx + c}} dx, k \in \mathbb{Z} \rightarrow t = \frac{1}{x-x_0} \rightarrow \text{Metoda Współczynników Nieoznaczonych}$$

$$\int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{ax^2 + bx + c}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx \rightarrow \text{Metoda Współczynników Nieoznaczonych}$$

$$\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_n}{q_n}}\right) dx \rightarrow t^s = \left|\frac{ax+b}{cx+d}\right|, s = \text{NWW}(q_1, \dots, q_n)$$

gdzie R jest funkcją $n+1$ zmiennych, a NWW - największa wspólna wielokrotność

Całki trygonometryczne

Usuwanie potęg z funkcji sinus i cosinus

■ Potęgi parzyste

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

■ Potęgi nieparzyste

$$\int \sin^n x \cos^m x dx \rightarrow t = \cos x$$

$$\int \cos^n x \sin^m x dx \rightarrow t = \sin x$$

n - potęga nieparzysta, m - dowolna potęga

Iloczyny funkcji trygonometrycznych

$$\sin(\alpha x) \cos(\beta x) = \frac{1}{2} [\sin[(\alpha + \beta)x] + \sin[(\alpha - \beta)x]]$$

$$\sin(\alpha x) \sin(\beta x) = \frac{1}{2} [\cos[(\alpha - \beta)x] - \cos[(\alpha + \beta)x]]$$

$$\cos(\alpha x) \cos(\beta x) = \frac{1}{2} [\cos[(\alpha + \beta)x] + \cos[(\alpha - \beta)x]]$$

Podstawienie tangensa połówkowego

Zamienia całki o wyrazach **$\sin x$** i **$\cos x$** na całki funkcji wymiernych

$$t = \tan \frac{x}{2}, \quad x = 2 \arctan t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Podstawienie tangensowe

Zamienia całki o wyrazach **$\sin^2 x$** , **$\cos^2 x$** , **$\sin x \cos x$** , **$\tan x$** , **$\cot x$** na całki funkcji wymiernych

$$t = \tan x, \quad x = \arctan t, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, \quad \sin x \cos x = \frac{t}{1+t^2}$$

Wybrane Wzory rekurencyjne

$$\int \sin^n(px) dx = -\frac{\sin^{n-1}(px) \cos(px)}{np} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(px) dx,$$

$$\int \cos^n(px) dx = \frac{\cos^{n-1}(px) \sin(px)}{np} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(px) dx,$$

$$\int \frac{1}{(x^2 + p^2)^n} = \frac{x}{2p^2(n-1)(x^2 + p^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2p^2(n-1)} \int \frac{1}{(x^2 + p^2)^{n-1}}$$