



INDICACIONES TRAS E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

La gastroscopia es una técnica que consiste en la introducción, a través de la boca, de una sonda flexible para la visualización del esófago, estómago y duodeno. No es una prueba dolorosa pero sí molesta por lo que suele realizarse bajo sedación. Por este motivo debe usted venir acompañado ya que existe una disminución de los reflejos que persiste al menos 8 horas.

OBJETIVO:

Permite diagnosticar enfermedades, para lo cual, a veces, es recomendable tomar muestras de tejidos (biopsias, citologías...). En ocasiones también se pueden realizar procedimientos terapéuticos (extirpación de pólipos, coagulación de lesiones sangrantes...)

CUIDADOS GENERALES

Para la realización de la exploración debe permanecer en AYUNAS (sin ingerir líquidos ni sólidos) en las 6-8 HORAS previas al procedimiento

Si tiene aparato dental que pueda moverse, piercings o utiliza dentadura postiza, deberá retirarlos antes de la exploración.

Debe informar al médico de cualquier enfermedad importante que padezca, especialmente del corazón o respiratorias, si es alérgico a algún medicamento o sustancia y si está en tratamiento con algún medicamento, especialmente aquellos que pueden alterar la coagulación.

INDICACIONES

1.- A menos que se le indique lo contrario, podrá volver a comer en cuanto abandone la sala de endoscopia.

2.- Permanezca acompañado por una persona responsable al menos las 8 horas siguientes a la prueba.

3.- Si no se le indica lo contrario, reanude su tratamiento médico habitual

- Hasta el día siguiente de la sedación:
- No beba alcohol
- No conduzca vehículos si puede evitarlo. No debe hacerlo bajo ningún concepto en las primeras 8 horas tras la exploración o
- No realice actividades peligrosas ni practique deportes intensos

Tras la exploración puede notar alguna molestia en la garganta o tener sensación de hinchazón debido al aire introducido durante la prueba y debido a la sedación puede presentar somnolencia, olvidos, cansancio, mareo, náuseas, dolor de cabeza... Todos estos síntomas son habituales, pero deben ser leves e irán desapareciendo poco a poco.

CUALQUIER DUDA LLAME A SU MÉDICO