

Tema 3 (II) - Determinantes, menores y rango

- El cálculo de un determinante usando métodos “clásicos” puede ser, a veces, muy engorroso. Sin embargo, la teoría de determinantes está llena de recursos. Por ejemplo, para toda matriz $A_{n \times n}$ se cumple que $\det(A)^2 = \det(A) \cdot \det(A) = \det(A) \cdot \det(A^t) = \det(A \cdot A^t)$. Aplicar este “truco” para calcular los determinantes siguientes calculando previamente su cuadrado.

$$\begin{vmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & -2 & \sqrt{5} \\ -\sqrt{3} & \sqrt{2} & \sqrt{5} & 2 \\ 2 & -\sqrt{5} & \sqrt{2} & \sqrt{3} \\ -\sqrt{5} & -2 & -\sqrt{3} & \sqrt{2} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{vmatrix}$$

- Usar la *Regla de Cramer* para probar que los sistemas dados tienen solución única y hallar dicha solución.

$$\begin{array}{llll} 2x - y = 3 & x + 2y = 5 & 18x + 12y = 13 & 20x + 8y = 11 \\ x - 2y = 0 & -x + y = 1 & 30x + 24y = 23 & 12x - 24y = 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} -x + 2y - 3z = 1 & x + 2y + z = 2 & x - 4y - z = -1 & 5x - 2y + z = 15 \\ 2x + z = 0 & -x + 3y - 2z = 4 & 2x - 3y + z = 4 & 3x - 3y - z = -7 \\ 3x - 4y + 4z = 2 & 4x + y - z = 6 & x + y - 4z = 6 & 2x - y - 7z = -3 \end{array}$$

- Para los sistemas que siguen: usar el *Teorema de Rouché-Frobenius* para resolverlos o para probar que no tienen solución.

$$\begin{array}{llll} 2x + 7y + 3z + t = 6 & 2x - 3y + 5z + 7t = 1 & 3x + 4y + z + t = 3 & 2x + 5y - 8z = 8 \\ 3x + 5y + 2z + 2t = 4 & 4x - 6y + 2z + 3t = 2 & 6x + 8y + 2z + 5t = 7 & 4x + 3y - 9z = 9 \\ 9x + 4y + z + 7t = 2 & 2x - 3y - 11z - 15t = 1 & 9x + 12y + 3z + 10t = 13 & 2x + 3y - 5z = 7 \\ & & & x + 8y - 7z = 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} 3x + 2y + 2z + 2t = 2 & 8x + 6y + 5z + 2t = 21 & 2x + 3y + z + 2t = 4 & 3x + 5y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + 2z + 5t = 3 & 3x + 3y + 2z + t = 10 & 4x + 3y + z + t = 5 & 4x + 7y + 5z = 0 \\ 9x + y + 4z - 5t = 1 & 4x + 2y + 3z + t = 8 & 5x + 11y + 3z + 2t = 2 & x + y - 4z = 0 \\ 2x + 2y + 3z + 4t = 5 & 3x + 5y + z + t = 15 & 2x + 5y + z + t = 1 & 2x + 9y + 6z = 0 \\ 7x + y + 6z - t = 7 & 7x + 4y + 5z + 2t = 18 & x - 7y - z + 2t = 7 & \end{array}$$

- Para las matrices siguientes: hallar los valores de λ que hacen su rango, respectivamente, máximo y mínimo. Debe usarse la teoría de determinantes aunque no exclusivamente.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 3 & -\lambda & 4 \\ 4 & -\lambda & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & \lambda^3 \\ 3 & \lambda + 2 & 2\lambda + 1 & 3\lambda \\ 3 & 2\lambda + 1 & \lambda^2 + 2\lambda & 3\lambda^2 \end{pmatrix}$$

- Para las siguientes matrices: hallar su rango (por el método que se prefiera), localizar un menor principal y, usando la teoría de determinantes, expresar las filas y columnas de cada matriz como combinación lineal de las filas y columnas que intervienen en el menor principal hallado.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 \\ 5 & -3 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & -5 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

- Supongamos que $B_{p \times p}$ es una matriz con rango r (obviamente, $r \leq p$) y $C_{q \times q}$ es una matriz con rango s (obviamente, $s \leq q$). Construimos la matriz por bloques $A = \left(\begin{array}{c|c} B & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & C \end{array} \right)$ ¿Cuál es el rango de la matriz A ? ¿Es cierto que $\det(A) = \det(B) \cdot \det(C)$?