Utilidades para números

Los comandos `\spdiv` y `\spmul`

- División: $20 : 26$.
- División con paréntesis: $(20 : 26)$.
- División con paréntesis sin leerlos: $(20 : 26)$.
- División con barra: $20/26$.
- División con otra lectura: $20 : 26$.
- División con signo leído: $-20 : 5$.
- Multiplicación: $20 \cdot 26$.
- Multiplicación con paréntesis: $(20 \cdot 26)$.
- Multiplicación con paréntesis sin leerlos: $(20 \cdot 26)$.
- Multiplicación con cruz: 20×26.
- Multiplicación con otra lectura: $20 \cdot 26$.
- Multiplicación con signo leído: $-20 \cdot 5$.

Los comandos `\spnD` y `\spnM`

- Divisores sin argumento: $\mathrm{D}(n)$.
- Divisores de un número: $\mathrm{D}(6)$.
- Divisores de una letra: $\mathrm{D}(m)$.
- Divisores con resultado: $\mathrm{D}(6) = \{1, 2, 3, 6\}$.
- Divisores con resultado acotado: $\mathrm{D}(12) = \{1, 2, ...\}$.
- Divisores sin el concepto: $\mathrm{D}(6)$.
- Divisores con prefijo: $\mathrm{D}(6)$.
- Divisores silenciados: $\mathrm{D}(6)$.
- Múltiplos sin argumento: $\mathrm{M}(n)$.
- Múltiplos de un número: $\mathrm{M}(6)$.
- Múltiplos de una letra: $\mathrm{M}(m)$.
- Múltiplos con resultado: $\mathrm{M}(6) = \{6, 12, 18, 24, 30, ...\}$.

- Múltiplos con resultado acotado: $\mathrm{M}(6) = \{6, 12, 18, ...\}$.
- Múltiplos sin el concepto: $\mathrm{M}(6)$.
- Múltiplos con prefijo: $\mathrm{M}(6)$.
- Múltiplos silenciados: $\mathrm{M}(6)$.

Los comandos `\spmcd` y `\spmcm`

- Máximo común divisor sin argumento: mcd.
- Máximo común divisor de números: $\mathrm{mcd}(2, 3, 6)$.
- Máximo común divisor de letras: $\mathrm{mcd}(m, n)$.
- Máximo común divisor con resultado: $\mathrm{mcd}(2, 3, 6) = 1$.
- Máximo común divisor abreviado: $\mathrm{mcd}(2, 3, 6)$.
- Máximo común divisor en mayúsculas: $\mathrm{MCD}(2, 3, 6)$.
- Máximo común divisor sin el concepto: $\mathrm{mcd}(2, 3, 6)$.
- Máximo común divisor con prefijo: $\mathrm{mcd}(2, 3, 6)$.
- Máximo común divisor silenciado: $\mathrm{mcd}(2, 3, 6)$.
- Mínimo común múltiplo sin argumento: mcm.
- Mínimo común múltiplo de números: $\mathrm{mcm}(2, 3, 6)$.
- Mínimo común múltiplo de letras: $\mathrm{mcm}(m, n)$.
- Mínimo común múltiplo con resultado: $\mathrm{mcm}(2, 3, 6) = 6$.
- Mínimo común múltiplo abreviado: $\mathrm{mcm}(2, 3, 6)$.
- Mínimo común múltiplo en mayúsculas: $\mathrm{MCM}(2, 3, 6)$.
- Mínimo común múltiplo sin el concepto: $\mathrm{mcm}(2, 3, 6)$.
- Mínimo común múltiplo con prefijo: $\mathrm{mcm}(2, 3, 6)$.
- Mínimo común múltiplo silenciado: $\mathrm{mcm}(2, 3, 6)$.

El comando `\spnZ`

- Entero positivo: 23.
- Entero negativo: -23.
- Entero con paréntesis: (-23).
- Entero con paréntesis sin leerlos: (-23).
- Entero con signo leído: -23.
- Entero grande: $1\,000\,000$.
- Entero grande sin separación: 1000000.

El comando `\spmQ`

- Número mixto: $2\frac{5}{7}$.
- Unión con *entero*: $1\frac{5}{7}$.
- Unión con *enteros*: $2\frac{5}{7}$.
- Unión con *y*: $2\frac{5}{7}$.
- Sin semántica de entero: $2\frac{5}{7}$.
- Fracción en tamaño *display*: $2\frac{5}{7}$.
- Con paréntesis: $(2\frac{5}{7})$.
- Con paréntesis sin leerlos: $(2\frac{5}{7})$.
- Silenciado: $2\frac{5}{7}$.

Los comandos `\sprazon` y `\spProp`

- Razón: $\frac{3}{4}$.
- Razón en tamaño *display*: $\frac{3}{4}$.
- Razón en línea: $3 : 4$.
- Razón silenciada: $\frac{3}{4}$.
- Proporción: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$.

- Proporción en tamaño *display*: $\dfrac{3}{4} = \dfrac{6}{8}$.
- Proporción en línea: $3 : 4 = 6 : 8$.
- Proporción silenciada: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$.