INFOGRAFÍA CABALLA Scomber colias

DÓNDE VIVE

Aguas someras hasta fuera del talud continental (0 - 300 m). Es una especie euritérmica (9°C - 22°C) y eurihalina (14 - 35).

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de crustáceos (especialmente copépodos), peces (preferentemente anchoíta) y moluscos cefalópodos (calamaretes).

Existen evidencias de canibalismo sobre


huevos.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Habita aguas templado-cálidas del océano Atlántico, mar Mediterráneo y mar Negro. En el Atlántico occidental lo hace desde Nueva Escocia (45° N) hasta el sur de Argentina (46°S), incluyendo el golfo San Matías. En el mar Argentino se han identificado dos *stocks*: norteño (proximidades de Mar del Plata) y sureño (área denominada EL Rincón) separados a los fines de manejo en la latitud de 39°S.





CUERPO

Elongado y redondeado, robusto, cubierto con escamas pequeñas. Boca provista de dientes diminutos.

MÉTODO DE CAPTURA

El *stock* norteño es capturado principalmente por la flota de rada o ría empleando redes de cerco sin jareta o lampara. El *stock* sureño por embarcaciones costeras y de altura fresqueras que operan redes de media agua en proximidad del fondo.

CURIOSIDADES

En el área marplatense se han podido determinar los desplazamientos estacionales de los adultos: en invierno permanecen a profundidades entre 100 m y 200 m, y se aproximan a la costa entre los meses de septiembre a febrero para reproducirse y luego alimentarse intensamente.

IMPORTANCIA PESQUERA

Su destino principal es la conservería, que se comercializa en el mercado interno. Se exporta congelada, principalmente entera, a Brasil.







entera congelada

COLOR

Coloración dorsal azul verdoso. Blanco iridiscente en la parte inferior de los flancos y del vientre.

CICLO DE VIDA

La reproducción tiene lugar entre fines de noviembre y diciembre, sólo de noche, con una temperatura en superficie de alrededor de 17° C. Se reproducen a partir de los 24 - 27 cm de longitud total (uno a dos años de edad). La mayor edad observada es de 10 años.

TAMAÑO I PESO

Máxima talla observada: 59 cm de longitud total. El crecimiento es rápido. En los dos primeros años de vida alcanza algo más del 50% de su tamaño. Puede alcanzar los 900 g de peso total.

TEMPORADA DE PESCA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



Stock sureño: meses de agosto a octubre.

