



Sirius Bacter

INOCULANTE BIOLÓGICO · BIOFERTILIZANTE

Consortio líquido de tres bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Nutre el cultivo por fijación biológica de nitrógeno, solubilización de fósforo y producción de reguladores naturales de crecimiento. Se aplica al suelo por drench, riego o aspersión dirigida a la zona radicular.

1×10⁸ CONCENTRACIÓN UFC/mL consorcio	3 CONSORCIO especies bacterianas	20 PRESENTACIONES litros	90 VIDA ÚTIL días desde fabricación
--	---	---	--

CÓMO ACTÚA EN LA RIZOSFERA

Fijación biológica de nitrógeno

Azotobacter chroococcum y *Azospirillum brasilense* reducen el N₂ atmosférico a formas amoniacales asimilables, complementando el fertilizante nitrogenado.

Solubilización de fósforo

Pseudomonas fluorescens libera ácidos orgánicos y fosfatasas que movilizan el fósforo fijado en el suelo hacia formas disponibles para la raíz.

Promoción del crecimiento radicular

Las tres especies producen auxinas que estimulan la emisión de raíces secundarias y pelos radiculares, ampliando la superficie de absorción.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Azospirillum brasilense

Fijación de nitrógeno y producción de auxinas

Azotobacter chroococcum

Fijación de nitrógeno atmosférico de vida libre

Pseudomonas fluorescens

Solubilización de fósforo y colonización radicular

Consortio total: 1×10⁸ UFC/mL (1×10¹¹ UFC/L) **Pureza:** mínimo 95%, libre de patógenos **Aditivos:** protectantes, agua y estabilizantes.

VENTANA DE APLICACIÓN

APLICAR

EVITAR

NO APLICAR

APLICAR

12 a.m.

7 a.m.

10 a.m.

4 p.m.

12 a.m.

< 28 °C

temperatura al aplicar

> 70 %

humedad relativa

4 h

sin lluvias fuertes

Las células bacterianas son organismos vivos sensibles a la radiación ultravioleta y a la desecación. **Aplicar después de las 4:00 p.m. o antes de las 7:00 a.m.** es determinante para conservar la viabilidad en campo. Puede aplicarse en cualquier época del año, priorizando el inicio de temporada lluviosa y las etapas de mayor demanda nutricional.

Aplicar siempre sobre suelo húmedo o acompañar con riego ligero posterior: el consorcio requiere agua libre para establecerse en la rizosfera. En riego por goteo, inyectar en el último tercio del ciclo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

01

Equipo limpio, sin residuos de químicos, bactericidas o fungicidas.

02

Agite el envase antes de medir: las células sedimentan.

03

Mida la dosis correspondiente al área a tratar.

04

Prediluya en 1 L de agua limpia hasta suspensión homogénea.

05

Complete el volumen total con agitación constante.

06

Aplique dentro de las 4 h. No guarde mezcla sobrante.

Agua: limpia, pH 6,0 – 7,0, no clorada. Si es de acueducto, dejar reposar 24 horas antes de usar.

ORIENTACIÓN DE DOSIFICACIÓN

CULTIVO	MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA
Palma de aceite	Plantas adultas: drench al plato.	1,0 – 2,0 L/ha	Cada 30 días
Solanáceas	Aspersión dirigida a la base o riego por goteo.	3,0 – 6,0 L/ha	Cada 20 días
Frutales	Aplicar al área de goteo durante floración y llenado de fruto.	1,0 – 2,0 L/ha	Cada 20 días
Hortalizas	Drench o riego por goteo en presiembra, siembra y postrasplante.	1,0 L/ha	Cada 20 días
Cereales	Incorporar al suelo antes de la siembra. Refuerzo en amacolle, hoja bandera y floración.	2,0 – 3,0 L/ha	3 aplicaciones
Pastos y forrajeras	Aspersión al suelo después de corte o pastoreo.	1,0 – 2,0 L/ha	Cada 30 días

Rangos de orientación técnica basados en experiencia de campo de Sirius Regenerative Solutions y literatura de las especies. No corresponden a ensayos de eficacia aprobados. Se recomienda validar en lote piloto antes de la aplicación extensiva.

ALMACENAMIENTO

No congelar

15 – 30 °C

> 35 °C

- Lugar fresco, seco, ventilado y sin exposición solar directa.
- Envase cerrado, en posición vertical y en su empaque original.
- No almacenar junto a agroquímicos, bactericidas, combustibles ni fertilizantes.
- Una vez abierto, utilizar el contenido dentro de las 24 horas.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

SEGURIDAD Y MANEJO

Protección: guantes de nitrilo o caucho, gafas de seguridad, mascarilla N95 o superior, ropa de manga larga y botas.

Precauciones: evitar contacto con piel y ojos e inhalación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse manos y rostro al terminar. Mantener alejado de calor, chispas o fuego.

Primeros auxilios: piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con párpados abiertos; inhalación, trasladar a lugar ventilado; ingestión, no inducir vómito y buscar atención médica. Si persiste la molestia, consultar a un médico presentando esta ficha.

Envases: no incinerar. Triple lavado incorporando el agua a la mezcla, inutilizar el envase y entregarlo al programa de posconsumo. El producto vencido puede incorporarse al suelo o a compostaje; no verter en fuentes de agua.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con *Trichoderma* ni con otros compuestos fúngicos

Los hongos de rápida colonización desplazan a las bacterias del consorcio. Separar las aplicaciones y usar equipo dedicado o previamente lavado.

No se declaran compatibilidades específicas con otros insumos agrícolas.

DATOS REGULATORIOS Y LOGÍSTICA

- **Grupo:** agente microbial para control de enfermedades.
- **Formulación:** suspensión concentrada (SC) líquida, dispersable con agitación.
- **Carencia / reingreso:** 0 días / una vez seca la aplicación, o 4 h después.
- **Fitotoxicidad:** no fitotóxico en las dosis indicadas; probar en área reducida en cultivo o variedad nueva.
- **No objetivo:** sin efectos declarados; evitar aplicación directa sobre colmenas y cuerpos de agua.
- **Sostenibilidad:** biodegradable, por fermentación de materias primas naturales; apto para producción orgánica y regenerativa.

ENTREGAS FRACCIONADAS

Producto biológico vivo: el despacho se programa en entregas fraccionadas acordadas con el cliente según el cronograma de aplicación en finca. No se recomienda acumular inventario.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia
direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 3118882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.