

Capítulo 1

## **Introducción**

## Preliminares

Basándonos en Campercholi y Vaggione 2015

### 2.1. Definibilidad por fórmulas abiertas

TEOREMA 1 (Los embeddings preservan fórmulas abiertas). *Sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  estructuras y  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  una función. Son equivalentes:*

1.  $\gamma$  es un embedding de  $A$  en  $B$ .
2. Para toda fórmula abierta  $\varphi(\bar{x})$  y para cada  $\bar{a}$  de  $A$  vale que:

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$$

DEMOSTRACIÓN.  $1 \Rightarrow 2$ )

Sea  $\gamma$  un embedding de  $A$  en  $B$ , sea  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  una fórmula abierta y  $\bar{a} \in A^n$ , el caso base sale directo ya que los homomorfismos preservan términos. Veamos los casos inductivos:

Sea  $\varphi(\bar{x}) = \neg\varphi_1(\bar{x})$  con  $\varphi_1 \in F_k^\tau$ :

$$\mathbf{A} \models \neg\varphi_1[\bar{a}] \text{ sii } \mathbf{A} \not\models \varphi_1[\bar{a}] \text{ sii } \mathbf{B} \not\models \varphi_1[\gamma(\bar{a})] \text{ sii } \mathbf{B} \models \neg\varphi_1[\gamma(\bar{a})]$$

Sea  $\varphi(\bar{x}) = (\varphi_1 \eta \varphi_2)(\bar{x})$  con  $\varphi_1, \varphi_2 \in F_k^\tau$ :

$$\mathbf{A} \models (\varphi_1 \eta \varphi_2)[\bar{a}] \text{ sii } \mathbf{A} \models \varphi_1[\bar{a}] \text{''} \eta \text{''} \mathbf{A} \models \varphi_2[\bar{a}] \text{ sii } \mathbf{A} \models \varphi_1[\gamma(\bar{a})] \text{''} \eta \text{''} \mathbf{B} \models \varphi_2[\gamma(\bar{a})] \text{ sii } \mathbf{B} \models (\varphi_1 \eta \varphi_2)[\gamma(\bar{a})]$$

$2 \Rightarrow 1$ )

Supongamos que para toda fórmula abierta  $\varphi = \varphi(\bar{x})$  y cada  $\bar{a} \in A^m$  vale que:

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$$

- Veamos que  $\gamma$  es inyectiva:

$$\begin{aligned} \gamma(a) &= \gamma(a') \\ \mathbf{B} &\models (x_1 \equiv x_2)[\gamma(a), \gamma(a')] \\ \mathbf{A} &\models (x_1 \equiv x_2)[a, a'] \\ a &= a' \end{aligned}$$

- Veamos que  $\gamma$  es un homomorfismo:

Sea  $c \in \mathcal{C}$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &\models (c \equiv x_1)[c^{\mathbf{A}}] \\ \mathbf{B} &\models (c \equiv x_1)[\gamma(c^{\mathbf{A}})] \\ c^{\mathbf{B}} &= \gamma(c^{\mathbf{A}}) \end{aligned}$$

Sea  $r \in \mathcal{R}_n$

$$\begin{aligned}
(a_1, \dots, a_n) &\in r^{\mathbf{A}} \\
\mathbf{A} &\models r(x_1, \dots, x_n)[a_1, \dots, a_n] \\
\mathbf{B} &\models r(x_1, \dots, x_n)[\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_n)] \\
(\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_n)) &\in r^{\mathbf{B}} \\
\text{Sea } f &\in \mathcal{F}_n
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} &\models (f(x_1, \dots, x_n) \equiv x_{n+1})[a_1, \dots, a_n, f^{\mathbf{A}}(a_1, \dots, a_n)] \\
\mathbf{B} &\models (f(x_1, \dots, x_n) \equiv x_{n+1})[\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_n), \gamma(f^{\mathbf{A}}(a_1, \dots, a_n))] \\
f^{\mathbf{B}}(\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_n)) &= \gamma(f^{\mathbf{A}}(a_1, \dots, a_n))
\end{aligned}$$

■ Veamos que  $\gamma$  es embedding:

Sea  $r \in \mathcal{R}_n$

$$\begin{aligned}
(\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_n)) &\in r^{\mathbf{B}} \\
\mathbf{B} &\models r(x_1, \dots, x_n)[\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_n)] \\
\mathbf{A} &\models r(x_1, \dots, x_n)[a_1, \dots, a_n] \\
(a_1, \dots, a_n) &\in r^{\mathbf{A}}
\end{aligned}$$

□

TEOREMA 2. Si  $\mathbf{A}$  es una subestructura de  $\mathbf{B}$  y  $\varphi(\bar{x})$  es una fórmula abierta, entonces para cada  $\bar{a} \in A^n$  vale que

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \varphi[\bar{a}]$$

DEMOSTRACIÓN. Sea  $\mathbf{A}$  una subestructura de  $\mathbf{B}$  y  $\varphi(\bar{x})$  una fórmula abierta.

Como  $\mathbf{A}$  es subestructura es cerrada sobre  $r, f$  y  $c^{\mathbf{B}} \in A$

Sea  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  tal que para todo  $x \in A$ ,  $\gamma(x) = x$ . Como  $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ , es directo que  $\gamma$  es un embedding. Entonces por el Teorema 1,  $\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$

Finalmente, por definición de  $\gamma$ :

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \varphi[\bar{a}]$$

□

NOTACIÓN 3. Dado un conjunto de fórmulas  $\Delta$ , escribiremos  $\Delta(\bar{x})$  para anunciar que cada una de las fórmulas en  $\Delta$  tiene sus variables libres contenidas en la tupla  $\bar{x}$ , y que consideramos cada  $\delta \in \Delta(\bar{x})$  declarada  $\delta = \delta(\bar{x})$ . Si  $\mathbf{A}$  es una estructura y  $\bar{a}$  es una tupla de elementos de  $A$ , escribiremos  $\mathbf{A} \models \Delta[\bar{a}]$  cuando  $\mathbf{A} \models \delta[\bar{a}]$  para cada  $\delta \in \Delta(\bar{x})$ .

DEFINICIÓN 4. Sea  $\mathbf{A}$  una estructura y sean  $a_1, \dots, a_n \in A$ . Definimos el diagrama abierto para  $a_1, \dots, a_n$  en  $\mathbf{A}$  como:

$$\Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}(x_1, \dots, x_n) := \{\alpha \mid \alpha \text{ es abierta y } \mathbf{A} \models \alpha[\bar{a}]\}$$

TEOREMA 5. Sea  $\mathbf{A}$  una estructura y  $b_1, \dots, b_n \in B$ , son equivalentes:

1.  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}[\bar{b}]$
2. Hay un isomorfismo  $\gamma$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$

DEMOSTRACIÓN. Veamos  $1 \Rightarrow 2$ :

Supongamos que  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}[\bar{b}]$

Si  $\alpha$  fórmula abierta y  $\mathbf{A} \models \alpha[\bar{a}]$  entonces  $\mathbf{B} \models \alpha[\bar{b}]$

Tomo  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}} = \{t^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n] : t \in T^\tau, a_1, \dots, a_n \in \bar{a}\}$  y  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{A}} = \{t^{\mathbf{A}}[b_1, \dots, b_n] : t \in T^\tau, b_1, \dots, b_n \in \bar{b}\}$

Defino

$$\begin{aligned} \gamma &: A' \rightarrow B' \\ \gamma(t^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n]) &= t^{\mathbf{B}}[b_1, \dots, b_n] \end{aligned}$$

Es claro que  $\gamma$  es un homomorfismo.

- Veamos que  $\gamma$  es inyectivo

Sean  $a'_1, a'_2 \in A'$  tales que  $a'_1 \neq a'_2$

$$\begin{aligned} (2.1.1) \quad a'_1 &\neq a'_2 \\ t_1^{\mathbf{A}}[\bar{a}] &\neq t_2^{\mathbf{A}}[\bar{a}] \\ \mathbf{A} &\models \neg(t_1 \equiv t_2)[\bar{a}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2.1.2) \quad \mathbf{B} &\models \neg(t_1 \equiv t_2)[\bar{b}] \\ t_1^{\mathbf{B}}[\bar{b}] &\neq t_2^{\mathbf{B}}[\bar{b}] \\ \gamma(t_1^{\mathbf{A}}[\bar{a}]) &\neq \gamma(t_2^{\mathbf{A}}[\bar{a}]) \end{aligned}$$

- Veamos que  $\gamma$  es sobreyectivo

Sea  $b' \in B'$

$$\begin{aligned} b' &\in B' \\ t^{\mathbf{B}}[\bar{b}] &\in B' \end{aligned}$$

Tomo  $t^{\mathbf{A}}[\bar{a}] = a'$

$$\gamma(t^{\mathbf{A}}[\bar{a}]) = t^{\mathbf{B}}[\bar{b}]$$

Por lo tanto  $\gamma$  es un isomorfismo y  $\gamma(a_j) = \gamma(x_j^{\mathbf{A}}[a_1, \dots, a_n]) = x_j^{\mathbf{B}}[b_1, \dots, b_n] = b_j$ .

Ahora veamos  $2 \Rightarrow 1$ :

Supongamos que hay un isomorfismo  $\gamma$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$

Entonces, es claro que  $\gamma$  es un embedding de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$ .

Por el Teorema 1 para toda fórmula abierta  $\varphi(\bar{x})$  y cada  $\bar{a} \in A'$

$$\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$$

Por el Teorema 2 como  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  es subestructura de  $\mathbf{A}$ ,  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  lo es de  $\mathbf{B}$  y  $\varphi$  es abierta

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$$

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$$

Por lo tanto si  $\alpha$  es abierta y  $\mathbf{A} \models \alpha[\bar{a}]$  entonces  $\mathbf{B} \models \alpha[\bar{b}]$

Finalmente,  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}\bar{a}}[\bar{b}]$  □

**DEFINICIÓN 6.** Dos fórmulas  $\alpha(\bar{x})$  y  $\beta(\bar{x})$  se dicen *equivalentes* sobre una familia de estructuras  $\mathcal{K}$  si para cada  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  y cada  $\bar{a}$  de  $A$  vale que

$$\mathbf{A} \models \alpha[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{A} \models \beta[\bar{a}].$$

TEOREMA 7 (Modulo equivalencia sobre una estructura finita, la cantidad de fórmulas en  $x_1, \dots, x_n$  es finita). *Sea  $\mathcal{K}$  una clase finita de estructuras finitas, y sean  $x_1, \dots, x_n$  variables.*

*Hay un conjunto finito de fórmulas  $\Sigma(\bar{x})$  tal que para toda fórmula  $\varphi(\bar{x})$  hay  $\sigma(\bar{x}) \in \Sigma(\bar{x})$  tal que  $\varphi(\bar{x})$  y  $\sigma(\bar{x})$  son equivalentes sobre  $\mathcal{K}$ .*

DEMOSTRACIÓN. Sea  $\mathcal{K} = \{\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m\}$ . Veamos primero que las fórmulas son finitas modulo equivalencia. Sea  $\varphi(\bar{x})$  defino  $T_{\varphi\mathcal{K}} = \{\bar{a} \in A_1^n \mid \mathbf{A}_1 \models \varphi[\bar{a}]\} \times \dots \times \{\bar{a} \in A_m^n \mid \mathbf{A}_m \models \varphi[\bar{a}]\}$  y supongamos  $\varphi$  equivalente  $\psi$  en  $\mathcal{K}$ , entonces

$(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m) \in T_{\varphi\mathcal{K}} \Leftrightarrow (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m) \in T_{\psi\mathcal{K}}$  para cada  $(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m) \in A_1^n \times \dots \times A_m^n$  lo que significa que  $T_{\varphi\mathcal{K}} = T_{\psi\mathcal{K}}$ . Entonces basta con contar los subconjuntos de  $A_1^n \times \dots \times A_m^n$ , como  $|A_1^n \times \dots \times A_m^n| = |A_1|^n \dots |A_m|^n$  y cada  $A_i$  era finito, es claro que  $A_1^n \times \dots \times A_m^n$  es finito. Por lo tanto  $\mathcal{P}(A^n)$  también lo es.

Ahora veamos que existe  $\Sigma(\bar{x})$ . Sean  $T_1, \dots, T_k \subseteq A_1^n \times \dots \times A_m^n$  tales que existe  $\varphi_i(\bar{x})$  tal que para cada  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ ,  $\mathbf{A} \models \varphi_i[T_i]$  y sea  $\psi(\bar{x})$ , tomo  $T_{\psi\mathcal{K}}$  y como  $T_1, \dots, T_k$  es la sucesión de todos los subconjuntos que se definen con una fórmula, hay un  $j$  tal que  $T_j = T_{\psi\mathcal{K}}$ . Entonces, para cada  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ ,  $\mathbf{A} \models \psi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathbf{A} \models \varphi_j[\bar{a}]$ .  $\square$

TEOREMA 8. *Sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  estructuras finitas y  $a_1, \dots, a_n \in A$ , entonces existe una fórmula abierta  $\varphi(\bar{x})$  tal que para todo  $\bar{b} \in B^n$  son equivalentes:*

1.  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$
2. Hay un isomorfismo  $\gamma$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$

DEMOSTRACIÓN. Tomo  $\varphi = \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}\bar{a}}} \alpha(\bar{x})$  que es una fórmula, por el Teorema 7.

Es claro que  $\mathbf{B} \models \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}\bar{a}}} \alpha(\bar{x})[\bar{b}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}\bar{a}}[\bar{b}]$

Entonces por Teorema 5, hay un isomorfismo  $\gamma$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$   $\square$

DEFINICIÓN 9. Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden y  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación n-ario. Diremos que  $R$  es *definible* en una familia  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras cuando exista una  $\mathcal{L}$ -fórmula  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  tal que para todo  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  y todas  $a_1, \dots, a_n \in A$

$$(a_1, \dots, a_n) \in R^{\mathbf{A}} \iff \varphi(a_1, \dots, a_n)$$

Si  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  son lenguajes de primer orden, para una  $\mathcal{L}'$ -estructura  $\mathbf{A}$ , usaremos  $\mathbf{A}_{\mathcal{L}}$  para indicar el reducto de  $\mathbf{A}$  al lenguaje  $\mathcal{L}$ . Si  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  son  $\mathcal{L}$ -estructuras, usaremos  $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$  para expresar que  $\mathbf{A}$  es subestructura de  $\mathbf{B}$ .

Sean:

$$Fo(\mathcal{L}) = \{\varphi : \varphi \text{ es una } \mathcal{L}\text{-fórmula}\}$$

$$E(\mathcal{L}) = \{\varphi : \varphi \text{ es una } \mathcal{L}\text{-fórmula existencial}\}$$

$$E^+(\mathcal{L}) = \{\varphi : \varphi \text{ es una } \mathcal{L}\text{-fórmula existencial positiva}\}$$

$$Op(\mathcal{L}) = \{\varphi : \varphi \text{ es una } \mathcal{L}\text{-fórmula abierta}\}$$

$$Op^+(\mathcal{L}) = \{\varphi : \varphi \text{ es una } \mathcal{L}\text{-fórmula abierta positiva}\}$$

$$\pm At(\mathcal{L}) = At(\mathcal{L}) \cup \{\neg\alpha : \alpha \in At(\mathcal{L})\}$$

$$At(\mathcal{L}) = \{\mathcal{L}\text{-fórmulas atómicas}\}$$

DEFINICIÓN 10. Dados  $A, B$  conjuntos,  $R^A \subseteq A^n$ ,  $R^B \subseteq B^n$ , diremos que una función  $\gamma : A \rightarrow B$  preserva  $R$  si para toda tupla  $(a_1, \dots, a_n) \in A_0$  tenemos que si  $(a_1, \dots, a_n) \in R^A$  implica que  $(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \in R^A$ .

TEOREMA 11. Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden, sea  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación  $n$ -ario. Para una clase finita  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras, los siguientes son equivalentes:

1. Hay una fórmula en  $\text{Op}(\mathcal{L})$  que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ .
2. Para todas  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , todas  $\mathbf{A}_0 \leq \mathbf{A}_{\mathcal{L}}, \mathbf{B}_0 \leq \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$ , todo isomorfismo  $\sigma : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{B}_0$  preserva  $R$ .

DEMOSTRACIÓN.  $1 \Rightarrow 2$ ) Sea  $\varphi(\bar{x})$  la fórmula que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ , sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$  y sean  $\mathbf{A}_0 \leq \mathbf{A}_{\mathcal{L}}$  y  $\mathbf{B}_0 \leq \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  tales que  $\sigma : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{B}_0$  sea un isomorfismo. Sea  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}_0} \cap A_0$  veamos que  $\sigma(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}_0}$ . Como  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}_0} \Rightarrow \bar{a} \in R^{\mathbf{A}} \Leftrightarrow \mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}]$ , por Teorema 2,  $\mathbf{A}_0 \models \varphi[\bar{a}]$  y como  $\mathbf{A}_0$  y  $\mathbf{B}_0$  son isomorfos por  $\sigma$ ,  $\mathbf{B}_0 \models \varphi[\sigma(\bar{a})]$ . Nuevamente por Teorema 2  $\mathbf{B} \models \varphi[\sigma(\bar{a})]$  y como por hipótesis  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ ,  $\sigma(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}}$ .

$2 \Rightarrow 1$ ) Sea  $\varphi = \bigvee_{\mathbf{A} \in \mathcal{K}} (\bigvee_{\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}} (\bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}\bar{a}}} \alpha(\bar{x})))$ , la cual es fórmula por el Teorema 7. Veamos que para cada  $\mathbf{B} \in \mathcal{K}$ ,  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$  sii  $\bar{b} \in R^{\mathbf{B}}$ . Sea  $\mathbf{B} \in \mathcal{K}$ :

$\Rightarrow$ ) Supongamos  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ , entonces en particular para algún  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  y  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ ,  $\mathbf{B} \models \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}\bar{a}}} \alpha(\bar{x})[\bar{b}]$ . Por Teorema 8, hay un isomorfismo  $\gamma : \langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}} \rightarrow \langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$ . Entonces por hipótesis  $\gamma$  preserva  $R$ . Finalmente como  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ , entonces  $\gamma(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}}$  o sea que  $\bar{b} \in R^{\mathbf{B}}$ .

$\Leftarrow$ ) Supongamos  $\bar{b} \in R^{\mathbf{B}}$ . Entonces  $\varphi = \bigvee_{\mathbf{A} \in \mathcal{K}} (\bigvee_{\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}} (\bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}\bar{a}}} \alpha(\bar{x}))) = \dots \vee \dots \vee (\bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{B}\bar{b}}} \alpha(\bar{x}))$ , evidentemente  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{B}\bar{b}}[\bar{b}]$ , entonces  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ .  $\square$

## 2.2. Definibilidad por fórmulas abiertas positivas y conjunción de atómicas

TEOREMA 12. Sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  estructuras y  $h : A \rightarrow B$  una función, son equivalentes:

1.  $h$  es un homomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$ .
2. Para toda fórmula atómica  $\varphi = \varphi(\bar{x})$  y para cada  $\bar{a}$  de  $A$  vale que

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \implies \mathbf{B} \models \varphi[h(\bar{a})].$$

3. Para toda fórmula abierta positiva<sup>1</sup>  $\varphi = \varphi(\bar{x})$  y para cada  $\bar{a}$  de  $A$  vale que

$$\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \implies \mathbf{B} \models \varphi[h(\bar{a})].$$

DEMOSTRACIÓN.  $1 \Rightarrow 2$ ) Directo, ya que los homomorfismos preservan términos.

$2 \Rightarrow 1$ ) Supongamos  $\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}] \Rightarrow \mathbf{B} \models \varphi[h(\bar{a})]$  con  $\varphi$  atómica. Veamos que  $h$  es homomorfismo.

Sea  $c \in \mathcal{C}$

$$\mathbf{A} \models (c \equiv x_1) [c^{\mathbf{A}}] \Rightarrow \mathbf{B} \models (c \equiv x_1) [h(c^{\mathbf{A}})] \Leftrightarrow c^{\mathbf{B}} = h(c^{\mathbf{A}})$$

Sea  $f \in \mathcal{F}_n$

$$\mathbf{A} \models (f(x_1, \dots, x_n) \equiv x_{n+1}) [a_1, \dots, a_n, f^{\mathbf{A}}(\bar{a})]$$

$$\mathbf{B} \models (f(x_1, \dots, x_n) \equiv x_{n+1}) [h(a_1), \dots, h(a_n), h(f^{\mathbf{A}}(\bar{a}))]$$

$$f^{\mathbf{B}}(h(\bar{a})) = h(f^{\mathbf{A}}(\bar{a}))$$

<sup>1</sup>Una fórmula es positiva si no tiene ocurrencias de  $\neg, \rightarrow, \leftrightarrow$ .

Sea  $r \in \mathcal{R}_n$

$$\bar{a} \in r^{\mathbf{A}} \Rightarrow \mathbf{A} \models r(\bar{x})[\bar{a}] \Rightarrow \mathbf{B} \models r(\bar{x})[h(\bar{a})] \Rightarrow h(\bar{a}) \in r^{\mathbf{B}}$$

2 $\Rightarrow$ 3) Rutina.

3 $\Rightarrow$ 2) Directo ya que toda atómica es abierta positiva.  $\square$

DEFINICIÓN 13. Sea  $\mathbf{A}$  una estructura y sean  $a_1, \dots, a_n \in A$ . Definimos el diagrama atómico positivo de  $\bar{a}$  en  $\mathbf{A}$  como

$$\Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+(x_1, \dots, x_n) := \{\alpha \mid \alpha \text{ es atómica y } \mathbf{A} \models \alpha[\bar{a}]\}.$$

TEOREMA 14. Sean  $\mathbf{B}$  una estructura y  $b_1, \dots, b_n \in B$ , son equivalentes:

1.  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+[\bar{b}]$ .
2. Hay un homomorfismo  $h$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $h(\bar{a}) = \bar{b}$ .

DEMOSTRACIÓN. 1 $\Rightarrow$ 2) Defino  $h : \langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}} \rightarrow \langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$ , como

$$h(t^{\mathbf{A}}[\bar{a}]) = t^{\mathbf{B}}[\bar{b}]$$

El cual es se ve fácilmente que es un homomorfismo que cumple  $h(\bar{a}) = \bar{b}$ .

2 $\Rightarrow$ 1) Supongamos que hay un homomorfismo  $h$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $h(\bar{a}) = \bar{b}$ , entonces como  $\mathbf{A} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+[\bar{a}]$ , por el Teorema 12  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+[h(\bar{a})]$ , entonces  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+[\bar{b}]$   $\square$

TEOREMA 15. Sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  estructuras finitas y  $a_1, \dots, a_n \in A$ , entonces existe una fórmula abierta  $\varphi(\bar{x})$  tal que para todo  $\bar{b} \in B^n$  son equivalentes:

1.  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$
2. Hay un homomorfismo  $h$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $h(\bar{a}) = \bar{b}$

DEMOSTRACIÓN. Tomo  $\varphi = \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+} \alpha(\bar{x})$  que es una fórmula, por el Teorema 7.

Es claro que  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}] \Leftrightarrow \mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+[\bar{b}]$

Entonces por Teorema 14, hay un homomorfismo  $h$  de  $\langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}}$  en  $\langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $h(\bar{a}) = \bar{b}$   $\square$

TEOREMA 16. Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden, sea  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación  $n$ -ario. Para una clase finita  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras, los siguientes son equivalentes:

1. Hay una  $\mathcal{L}$ -fórmula abierta positiva que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ .
2. Para todas  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , todas  $\mathbf{A}_0 \leq \mathbf{A}_{\mathcal{L}}, \mathbf{B}_0 \leq \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$ , todo homomorfismo  $h : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{B}_0$  preserva  $R$ .

DEMOSTRACIÓN. Veamos 1 $\Rightarrow$ 2:

Sea  $\varphi(\bar{x})$  la fórmula abierta positiva que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ , sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$  y sean  $\mathbf{A}_0 \leq \mathbf{A}_{\mathcal{L}}$  y  $\mathbf{B}_0 \leq \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  tales que  $h : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{B}_0$  sea un homomorfismo. Sea  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}_0} \cap A_0$  veamos que  $h(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}_0}$ :

$\bar{a} \in R^{\mathbf{A}_0} \Rightarrow \bar{a} \in R^{\mathbf{A}} \Leftrightarrow \mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}]$ , por Teorema 2,  $\mathbf{A}_0 \models \varphi[\bar{a}]$  y como  $h$  es un homomorfismo de  $\mathbf{A}_0$  en  $\mathbf{B}_0$  y  $\varphi$  es abierta positiva por Teorema 12,  $\mathbf{B}_0 \models \varphi[h(\bar{a})]$ . Nuevamente por Teorema 2  $\mathbf{B} \models \varphi[h(\bar{a})]$  y como por hipótesis  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ ,  $h(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}}$ .

Veamos 2 $\Rightarrow$ 1:

Sea  $\varphi = \bigvee_{\mathbf{A} \in \mathcal{K}} \left( \bigvee_{\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}} \left( \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+} \alpha(\bar{x}) \right) \right)$ , la cual es fórmula por el Teorema 7. Sea  $\mathbf{B} \in \mathcal{K}$ :

$\Rightarrow$ ) Supongamos  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ , entonces en particular para algún  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  y  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ ,  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{A}, \bar{a}}^+[\bar{b}]$ . Por Teorema 15, hay un homomorfismo  $h : \langle \bar{a} \rangle^{\mathbf{A}} \rightarrow \langle \bar{b} \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que

$h(\bar{a}) = \bar{b}$ . Entonces por hipótesis  $h$  preserva  $R$ . Finalmente como  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ , entonces  $h(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}}$  o sea que  $\bar{b} \in R^{\mathbf{B}}$ .

$\Leftarrow$ ) Supongamos  $\bar{b} \in R^{\mathbf{B}}$ . Entonces  $\varphi = \dots \vee \dots \vee \left( \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{B}\bar{b}}^+} \alpha(\bar{x}) \right)$ , evidentemente  $\mathbf{B} \models \Delta_{\mathbf{B}\bar{b}}^+[\bar{b}]$ , entonces  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ .  $\square$

DEFINICIÓN 17. Sean  $A_1, \dots, A_m, B$  conjuntos,  $R^{A_i} \subseteq A_i^n$  para cada  $i \in [1, m]$ ,  $R^B \subseteq B^n$  y  $h : D \subseteq A_1 \times \dots \times A_m \rightarrow B$  una función. Diremos que  $h$  preserva  $R$  si dados

$$\bar{a}_1 = (a_{11}, \dots, a_{1m}), \dots, \bar{a}_n = (a_{n1}, \dots, a_{nm}) \in D$$

tales que

$$(a_{1i}, \dots, a_{ni}) \in R^{A_i} \text{ para cada } i \in [1, m]$$

se tiene que  $(h(\bar{a}_1), \dots, h(\bar{a}_n)) \in R^B$ .

LEMA 18. Sean  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$  estructuras y  $\varphi = \exists \bar{y} \psi(\bar{x}, \bar{y})$  con  $\psi$  una conjunción de fórmulas atómicas. Entonces son equivalentes:

1. Para todo  $i = 1, \dots, m$  se da que  $\mathbf{A}_i \models \varphi[a_{1i}, \dots, a_{ni}]$
2.  $\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m \models \varphi[\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n]$ , con  $\bar{a}_j = (a_{j1}, \dots, a_{jm})$

DEMOSTRACIÓN. Rutina.  $\square$

TEOREMA 19. Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden, sea  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación  $n$ -ario. Para una clase finita  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras, los siguientes son equivalentes:

1. Para cada  $m \geq 1$ , para todas  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , para cada  $\mathbf{S} \leq (\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m)_{\mathcal{L}}$ , todo homomorfismo  $h : \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  preserva  $R$ .
2. Hay una conjunción finita de  $\mathcal{L}$ -fórmulas atómicas que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ .

DEMOSTRACIÓN.  $2 \Rightarrow 1$ ) Sea  $\varphi(\bar{x})$  conjunción de atómicas que define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ . Sean  $m \geq 1$ ,  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ ,  $\mathbf{S} \leq (\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m)_{\mathcal{L}}$ , y  $h : \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  un homomorfismo. Sean

$$\bar{s}_1 = (s_{11}, \dots, s_{1m}), \dots, \bar{s}_n = (s_{n1}, \dots, s_{nm}) \in \mathbf{S}$$

tales que

$$(s_{1i}, \dots, s_{ni}) \in R^{A_i} \text{ para cada } i \in \{1, \dots, m\}.$$

Veamos que  $(h(\bar{s}_1), \dots, h(\bar{s}_n)) \in R^B$ . Como  $(s_{1i}, \dots, s_{ni}) \in R^{A_i}$  y  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ , tenemos que

$$\mathbf{A}_i \models \varphi[s_{1i}, \dots, s_{ni}] \text{ para } i \in \{1, \dots, m\}.$$

Luego, por el Lema 18,

$$\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m \models \varphi[\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_n].$$

Como  $\varphi$  es abierta y  $\mathbf{S} \leq (\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m)_{\mathcal{L}}$ , el Teorema 2 implica que  $\mathbf{S} \models \varphi[\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_n]$ , y aplicando el Teorema 12 obtenemos que  $\mathbf{B} \models \varphi[h(\bar{s}_1), \dots, h(\bar{s}_n)]$ . Finalmente, como  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$  y  $\mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , concluimos que  $(h(\bar{s}_1), \dots, h(\bar{s}_n)) \in R^B$ .

$1 \Rightarrow 2$ ) Supongamos  $\mathcal{K} = \{\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m\}$ ,  $R$   $n$ -aria. Sean  $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n \in \mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}$  tales que  $\bar{x}_i = \left( x_{i1}^1, \dots, x_{i|R^{\mathbf{A}_1}|}^1, \dots, x_{i1}^m, \dots, x_{i|R^{\mathbf{A}_m}|}^m \right)$  para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$  con  $\bigcup R^{A_j} = \left\{ \left( x_{1i}^j, \dots, x_{ni}^j \right) \text{ con } i \in \{1, |R^{A_j}|\} \right\}$  para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$ . Sea

$$\varphi = \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}, (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)}^+} \alpha(\bar{x})$$



. Supongamos  $\mathbf{B} \models \varphi[b_1, \dots, b_n]$  y veamos que  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$ . Como  $\mathbf{B} \models \Delta^+_{\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}, (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)}[b_1, \dots, b_n]$ , por Teorema 14 hay  $h$  homomorfismo de  $\langle \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n \rangle_{\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}}$  en  $\langle b_1, \dots, b_n \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $h(\bar{x}_i) = b_i$ . Como por hipótesis  $h$  preserva  $R$ , entonces como  $(x_{1i}^j, \dots, x_{ni}^j) \in R^{\mathbf{A}_j}$ ,  $(h(\bar{x}_1), \dots, h(\bar{x}_n)) \in R^{\mathbf{B}}$ , que es exactamente  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$ .

Ahora supongamos  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$  y veamos que  $\mathbf{B} \models \varphi[b_1, \dots, b_n]$ , entonces hay algún  $j$  tal que  $\mathbf{A}_j = \mathbf{B}$  y hay algún  $k$  y algún  $j$  tal que

$$(x_{1k}^j, \dots, x_{nk}^j) = (b_1, \dots, b_n)$$

. Entonces como  $\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{B}^{|R^{\mathbf{B}}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|} \models \varphi[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$  por Teorema 18  $\mathbf{B} \models \varphi[x_{1k}^j, \dots, x_{nk}^j]$ , por lo tanto  $\mathbf{B} \models \varphi[b_1, \dots, b_n]$ .  $\square$

**TEOREMA 20.** *Sea  $\mathbf{A}$  una estructura finita y  $a_1, \dots, a_n \in A$ . Entonces hay una fórmula existencial  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  tal que para toda estructura  $\mathbf{B}$  y para todo  $\bar{b} \in B^n$  los siguientes son equivalentes:*

1.  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ .
2. Hay un embedding  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$

**DEMOSTRACIÓN.** Sean  $a'_1, \dots, a'_m$  tales que  $\langle a_1, \dots, a_n, a'_1, \dots, a'_m \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$  y sea

$$\varphi = \exists y_1, \dots, y_m \left( \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}} \alpha(\bar{x}, \bar{y}) \right)$$

que es fórmula por el Teorema 7.

Supongamos  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ , entonces existen  $b'_1, \dots, b'_m \in B$  tales que  $\mathbf{B} \models \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}} \alpha(\bar{x}, \bar{y}) [\bar{b}, \bar{b}']$  por Teorema 5 hay un isomorfismo  $\gamma : \langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} \rightarrow \langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $\gamma(\bar{a}, \bar{a}') = (\bar{b}, \bar{b}')$ , y como  $\langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$  y  $\langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}} \leq \mathbf{B}$ ,  $\gamma$  es un embedding de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$ .

Supongamos que hay un embedding  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  tal que  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b}$ , por lo tanto  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{S} \leq \mathbf{B}$  es un isomorfismo. Como  $\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}]$ , por ser  $\gamma$  un isomorfismo  $\mathbf{S} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$  y entonces  $\mathbf{S} \models \varphi[\bar{b}]$ . Por lo tanto existe  $\bar{b}'$  en  $S \subseteq B$  tal que  $\mathbf{S} \models \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}} \alpha(\bar{x}, \bar{y}) [\bar{b}, \bar{b}']$ . Como  $\bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}} \alpha(\bar{x}, \bar{y})$  es una fórmula abierta, por Teorema 2,  $\mathbf{B} \models \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}} \alpha(\bar{x}, \bar{y}) [\bar{b}, \bar{b}']$ , entonces  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$   $\square$

**TEOREMA 21.** *Sea  $\mathbf{A}$  una estructura finita y  $a_1, \dots, a_n \in A$ . Entonces hay una fórmula existencial positiva  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  tal que para toda estructura  $\mathbf{B}$  y para todo  $\bar{b} \in B^n$  los siguientes son equivalentes:*

1.  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ .
2. Hay un homomorfismo  $h : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  tal que  $h(\bar{a}) = \bar{b}$

**DEMOSTRACIÓN.** Sean  $a'_1, \dots, a'_m$  tales que  $\langle a_1, \dots, a_n, a'_1, \dots, a'_m \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$  y sea

$$\varphi = \exists y_1, \dots, y_m \left( \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}}^+ \alpha(\bar{x}, \bar{y}) \right)$$

que es fórmula por el Teorema 7.

Supongamos  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ , entonces existen  $b'_1, \dots, b'_m \in B$  tales que  $\mathbf{B} \models \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}}^+ \alpha(\bar{x}, \bar{y}) [\bar{b}, \bar{b}']$  por Teorema 14 hay un homomorfismo  $h : \langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} \rightarrow \langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $h(\bar{a}, \bar{a}') =$

$(\bar{b}, \bar{b}')$ , y como  $\langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$  y  $\langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}} \leq \mathbf{B}$ ,  $h$  es un homomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$  tal que  $h(\bar{a}) = \bar{b}$ .

Supongamos que hay un homomorfismo  $h : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  tal que  $h(\bar{a}) = \bar{b}$ . Como  $\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}]$ , entonces  $\mathbf{A} \models \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}^+[\bar{a}, \bar{a}']$  y por Teorema 12  $\mathbf{B} \models \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}^+[h(\bar{a}), h(\bar{a}')]$ . Entonces  $\mathbf{B} \models \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}^+[\bar{b}, \bar{b}']$ , por lo que claramente  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ .  $\square$

**TEOREMA 22.** *Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden, sea  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación  $n$ -ario. Para una clase finita  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras, los siguientes son equivalentes:*

1. *Hay una  $\mathcal{L}$ -fórmula que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ .*
2. *Para todas  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , todo isomorfismo  $\gamma : \mathbf{A}_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  preserva  $R$ .*

**DEMOSTRACIÓN.**  $1 \Rightarrow 2$ ) Sea  $\varphi$  una  $\mathcal{L}$ -fórmula que define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ , y sea  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  un isomorfismo. Supongamos  $\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}]$  entonces  $\mathbf{B} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$  y como  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ , entonces  $\gamma(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}}$ .

$2 \Rightarrow 1$ ) Para cada  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ , cada  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ , tomo  $\bar{a}'$  tal que  $\langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$ . Ahora tomo  $\delta_{\mathbf{A}, (\bar{a}, \bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y}) = \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}} \alpha(\bar{x}, \bar{y})$ , que es fórmula por Teorema 7. Ahora tomo

$$\varphi = \bigvee_{\mathbf{A} \in \mathcal{K}} \left( \left( \bigvee_{\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}} (\exists \bar{y} \delta_{\mathbf{A}, (\bar{a}, \bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y})) \right) \wedge \left( \forall x_1, \dots, x_{|\mathbf{A}|+1} \bigvee_{i \neq j} x_i = x_j \right) \right)$$

Sea  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$ . Entonces como  $\varphi = \dots \vee \left( (\exists \bar{y} \delta_{\mathbf{B}, (\bar{b}, \bar{b}')}(\bar{x}, \bar{y}) \vee \dots) \wedge (\forall x_1, \dots, x_{|\mathbf{B}|+1} \bigvee_{i \neq j} x_i = x_j) \right) \dots$ , y como  $\mathbf{B} \models \exists \bar{y} \delta_{\mathbf{B}, (\bar{b}, \bar{b}')}(\bar{x}, \bar{y})[\bar{b}, \bar{b}']$  y  $\mathbf{B} \models \forall x_1, \dots, x_{|\mathbf{B}|+1} \bigvee_{i \neq j} x_i = x_j[\bar{b}, \bar{b}']$  entonces  $\mathbf{B} \models \varphi[\bar{b}]$ .

Sea  $\mathbf{B} \models \varphi[b_1, \dots, b_n]$ . Entonces hay algún  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ , y algún  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$  tales que  $\mathbf{B} \models (\exists \bar{y} \delta_{\mathbf{A}, (\bar{a}, \bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y})) \wedge (\forall x_1, \dots, x_{|\mathbf{A}|+1} \bigvee_{i \neq j} x_i = x_j)[\bar{b}]$ . Entonces hay un  $\bar{z}$  en  $\mathbf{B}$  tal que  $\mathbf{B} \models \delta_{\mathbf{A}, (\bar{a}, \bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y})[\bar{b}, \bar{z}]$ . Como  $\mathbf{B} \models \Delta_{(\bar{a}, \bar{a}'), \mathbf{A}}^+[\bar{b}, \bar{z}]$ , por Teorema 5 hay  $\gamma : \langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} \rightarrow \langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}}$  isomorfismo tal que  $(\gamma(\bar{a}), \gamma(\bar{a}')) = (\bar{b}, \bar{z})$  con  $\langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$  y  $\langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}} \leq \mathbf{B}$ , lo que implica que  $|\mathbf{A}| \leq |\mathbf{B}|$ . Pero como  $\mathbf{B} \models \forall x_1, \dots, x_{|\mathbf{A}|+1} \bigvee_{i \neq j} x_i = x_j[b_1, \dots, b_n]$  entonces  $|\mathbf{B}| \leq |\mathbf{A}|$ , luego  $|\mathbf{B}| = |\mathbf{A}|$ , por lo que es claro que  $\langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}} = \mathbf{B}$ . Como  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  es un isomorfismo tal que  $(\gamma(\bar{a}), \gamma(\bar{a}')) = (\bar{b}, \bar{z})$  y sabemos que los isomorfismos entre estructuras de  $\mathcal{K}$ , preservan  $R$ , como  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ ,  $\gamma(\bar{a}) = \bar{b} \in R^{\mathbf{B}}$ .

Como  $\varphi$  es disyunción de existenciales, por teorema puede ser convertida en una fórmula existencial.  $\square$

**TEOREMA 23.** *Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden, sea  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación  $n$ -ario. Para una clase finita  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras, los siguientes son equivalentes:*

1. *Hay una  $\mathcal{L}$ -fórmula existencial que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ .*
2. *Para todas  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , todo embedding  $\gamma : \mathbf{A}_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  preserva  $R$ .*

**DEMOSTRACIÓN.**  $1 \Rightarrow 2$ ) Sea  $\varphi$  existencial que define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ , y sea  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  un embedding. Entonces  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{S} \leq \mathbf{B}$  es un isomorfismo. Supongamos  $\mathbf{A} \models \varphi[\bar{a}]$  entonces  $\mathbf{S} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$ . Como  $\varphi$  es de la forma  $\varphi = \exists \bar{y} \psi(\bar{x}, \bar{y})$  con  $\psi$  abierta, existe un  $\bar{s}$  tal que  $\mathbf{S} \models \psi[\gamma(\bar{a}), \bar{s}]$ . Como  $\psi$  es abierta y  $\mathbf{S} \leq \mathbf{B}$ , por el Teorema 2  $\mathbf{B} \models \psi[\gamma(\bar{a}), \bar{s}]$ . Entonces  $\mathbf{B} \models \varphi[\gamma(\bar{a})]$  y como  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ , entonces  $\gamma(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}}$ .

$2 \Rightarrow 1$ ) Para cada  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ , cada  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ , tomo  $\bar{a}'$  tal que  $\langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$ . Ahora tomo  $\delta_{\mathbf{A},(\bar{a},\bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y}) = \bigwedge_{\alpha \in \Delta_{(\bar{a},\bar{a}'),\mathbf{A}}} \alpha(\bar{x}, \bar{y})$ , que es fórmula por Teorema 7. Ahora tomo

$$\varphi = \bigvee_{\mathbf{A} \in \mathcal{K}} \left( \bigvee_{\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}} (\exists \bar{y} \delta_{\mathbf{A},(\bar{a},\bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y})) \right)$$

Sea  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$ . Entonces como  $\varphi = \dots \vee \exists \bar{y} \delta_{\mathbf{B},(\bar{b},\bar{b}')}(\bar{x}, \bar{y}) \vee \dots$ , y como  $\mathbf{B} \models \exists \bar{y} \delta_{\mathbf{B},(\bar{b},\bar{b}')}(\bar{x}, \bar{y}) [\bar{b}, \bar{b}']$ ,  $\mathbf{B} \models \varphi [\bar{b}]$ .

Sea  $\mathbf{B} \models \varphi [b_1, \dots, b_n]$ . Entonces para algún  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ , y algún  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$  tales que  $\mathbf{B} \models \exists \bar{y} \delta_{\mathbf{A},(\bar{a},\bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y}) [\bar{b}]$ . Entonces hay un  $\bar{z}$  en  $\mathbf{B}$  tal que  $\mathbf{B} \models \delta_{\mathbf{A},(\bar{a},\bar{a}')}(\bar{x}, \bar{y}) [\bar{b}, \bar{z}]$ . Como  $\mathbf{B} \models \Delta_{(\bar{a},\bar{a}'),\mathbf{A}} [\bar{b}, \bar{z}]$ , por Teorema 5 hay  $\gamma : \langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} \rightarrow \langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}}$  isomorfismo tal que  $(\gamma(\bar{a}), \gamma(\bar{a}')) = (\bar{b}, \bar{z})$  y como  $\langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle^{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$  y  $\langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle^{\mathbf{B}} \leq \mathbf{B}$ ,  $\gamma$  es un embedding de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$  y como  $\bar{a} \in R^{\mathbf{A}}$ ,  $\gamma(\bar{a}) \in R^{\mathbf{B}}$ ,  $\bar{b} \in R^{\mathbf{B}}$ .

Como  $\varphi$  es disyunción de existenciales, por teorema puede ser convertida en una fórmula existencial.  $\square$

**TEOREMA 24.** Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden, sea  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación  $n$ -ario. Para una clase finita  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras, los siguientes son equivalentes:

1. Hay una  $\mathcal{L}$ -fórmula existencial positiva que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ .
2. Para todas  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , todo homomorfismo  $\gamma : \mathbf{A}_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  preserva  $R$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Igual a la prueba del Teorema 23, tomando el diagrama abierto positivo.  $\square$

**TEOREMA 25.** Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden, sea  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  un símbolo de relación  $n$ -ario. Para una clase finita  $\mathcal{K}$  de  $\mathcal{L}'$ -estructuras, los siguientes son equivalentes:

1. Para cada  $m \geq 1$ , para todas  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , todo homomorfismo  $h : (\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m)_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  preserva  $R$ .
2. Hay una  $\mathcal{L}$ -fórmula primitiva positiva que define  $R$  en  $\mathcal{K}$ .

**DEMOSTRACIÓN.**  $2 \Rightarrow 1$ ) Sea  $\varphi = \exists \bar{y} \psi(\bar{x}, \bar{y})$  primitiva positiva que define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ . Sean  $m \geq 1$ ,  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$  y  $h : (\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m)_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathbf{B}_{\mathcal{L}}$  un homomorfismo. Sean

$$\bar{a}_1 = (a_{11}, \dots, a_{1m}), \dots, \bar{a}_n = (a_{n1}, \dots, a_{nm}) \in S$$

tales que

$$(a_{1i}, \dots, a_{ni}) \in R^{A_i} \text{ para cada } i \in \{1, \dots, m\}.$$

Veamos que  $(h(\bar{a}_1), \dots, h(\bar{a}_n)) \in R^{\mathbf{B}}$ . Como  $(a_{1i}, \dots, a_{ni}) \in R^{A_i}$  y  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ , tenemos que

$$\mathbf{A}_i \models \varphi [a_1, \dots, a_{ni}] \text{ para } i \in \{1, \dots, m\}.$$

Luego, por el Lema 18,

$$\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m \models \varphi [\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n].$$

Entonces hay  $b_1, \dots, b_k \in A_1 \times \dots \times A_m$ , tales que

$$\mathbf{A}_1 \times \dots \times \mathbf{A}_m \models \psi [\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n, b_1, \dots, b_k].$$

Como  $\psi$  es abierta positiva, aplicando el Teorema 12 obtenemos que  $\mathbf{B} \models \varphi [h(\bar{a}_1), \dots, h(\bar{a}_n)]$ . Finalmente, como  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$  y  $\mathbf{B} \in \mathcal{K}$ , concluimos que  $(h(\bar{a}_1), \dots, h(\bar{a}_n)) \in R^{\mathbf{B}}$ .

1 $\Rightarrow$ 2) Supongamos  $\mathcal{K} = \{\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m\}$ ,  $R$   $n$ -aria. Sean  $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n \in \mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}$  tales que  $\bar{x}_i = \left( x_{i1}^1, \dots, x_{i|R^{\mathbf{A}_1}|}^1, \dots, x_{i1}^m, \dots, x_{i|R^{\mathbf{A}_m}|}^m \right)$  para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$  con  $\bigcup R^{\mathbf{A}_j} = \left\{ \left( x_{1i}^j, \dots, x_{ni}^j \right) \text{ con } i \in \{1, |R^{\mathbf{A}_j}|\} \right\}$  para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$ . Sean  $\bar{x}'_1, \dots, \bar{x}'_k \in \mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}$ , tales que  $\langle \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{x}'_1, \dots, \bar{x}'_k \rangle_{\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}} = \mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}$ . Sea

$$\varphi = \exists \bar{y} \bigwedge_{\alpha \in \Delta^+_{\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}, (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{x}'_1, \dots, \bar{x}'_k)}} \alpha(\bar{x}, \bar{y})$$

. Supongamos  $\mathbf{B} \models \varphi[b_1, \dots, b_n]$  y veamos que  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$ . Entonces hay  $b'_1, \dots, b'_k$  tal que  $\mathbf{B} \models \Delta^+_{\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}, (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{x}'_1, \dots, \bar{x}'_k)}[b_1, \dots, b_n, b'_1, \dots, b'_k]$ ,

por Teorema 14 hay  $h$  homomorfismo de  $\langle \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{x}'_1, \dots, \bar{x}'_k \rangle_{\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}}$  en  $\langle b_1, \dots, b_n, b'_1, \dots, b'_k \rangle^{\mathbf{B}}$  tal que  $h(\bar{x}_i) = b_i$  y  $h(\bar{x}'_i) = b'_i$ , claramente  $h$  es un homomorfismo de  $\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|}$  en  $\mathbf{B}$ . Como por hipótesis  $h$  preserva  $R$ , entonces como  $(x_{1i}^j, \dots, x_{ni}^j) \in R^{\mathbf{A}_j}$ ,  $(h(\bar{x}_1), \dots, h(\bar{x}_n)) \in R^{\mathbf{B}}$ , que es exactamente  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$ .

Ahora supongamos  $(b_1, \dots, b_n) \in R^{\mathbf{B}}$  y veamos que  $\mathbf{B} \models \varphi[b_1, \dots, b_n]$ , entonces hay algún  $j$  tal que  $\mathbf{A}_j = \mathbf{B}$  y hay algún  $k$  y algún  $j$  tal que

$$(x_{1k}^j, \dots, x_{nk}^j) = (b_1, \dots, b_n)$$

. Entonces como  $\mathbf{A}_1^{|R^{\mathbf{A}_1}|} \times \dots \times \mathbf{B}^{|R^{\mathbf{B}}|} \times \dots \times \mathbf{A}_m^{|R^{\mathbf{A}_m}|} \models \varphi[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$  por Teorema 18  $\mathbf{B} \models \varphi[x_{1k}^j, \dots, x_{nk}^j]$ , por lo tanto  $\mathbf{B} \models \varphi[b_1, \dots, b_n]$ .  $\square$

## Algoritmos de chequeo de definibilidad

Una clase  $\mathcal{K}$  de estructuras será *disjunta* si dadas  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$  se tiene que  $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} \neq \emptyset$  si y solo si  $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ . La clase  $\mathcal{K}$  será *normal* si es disjunta, finita y cada una de las estructuras en  $\mathcal{K}$  es finita.

### 3.1. Preprocesamiento

LEMA 26. Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden,  $\mathcal{K}$  una clase finita de  $\mathcal{L}'$ -estructuras finitas y  $\mathbf{A}, \tilde{\mathbf{A}} \in \mathcal{K}$ , con  $\mathbf{A} \neq \tilde{\mathbf{A}}$ , tales que hay un  $\mathcal{L}$ -isomorfismo  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \tilde{\mathbf{A}}$ . Entonces para toda  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  y toda  $\mathcal{L}$ -fórmula  $\varphi$  son equivalentes:

1.  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K}$ .
2.  $\gamma$  es un  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfismo y  $\varphi$  define a  $R$  en  $\mathcal{K} - \{\tilde{\mathbf{A}}\}$ .

DEMOSTRACIÓN.  $1 \Rightarrow 2$ ) Trivial.

$2 \Rightarrow 1$ )  $\tilde{\mathbf{A}} \models R[\bar{a}]$  sii  $\mathbf{A} \models R[\gamma^{-1}(\bar{a})]$  sii  $\mathbf{A} \models \varphi[\gamma^{-1}(\bar{a})]$  sii  $\tilde{\mathbf{A}} \models \varphi[\bar{a}]$ .  $\square$

Independientemente del tipo de definibilidad que uno quiera chequear el Lema 26 sugiere que uno puede comenzar por reducir  $\mathcal{K}$  eliminando copias de estructuras  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfas.

---

#### Algorithm 1 Preprocesamiento

---



```

1: for  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  do
2:   for  $\mathbf{B} \in \mathcal{K} - \{\mathbf{A}\}$  do
3:     if hay  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$   $\mathcal{L}$ -isomorfismo then
4:       if  $\gamma$  es un  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfismo then
5:          $\mathcal{K} = \mathcal{K} - \{\mathbf{B}\}$ 
6:       else
7:         return  $\gamma$   $\triangleright R$  no es definible y  $\gamma$  es contraejemplo
8:       end if
9:     end if
10:  end for
11: end for
12: return  $\mathcal{K}$   $\triangleright \mathcal{K}$  sin estructuras  $\mathcal{L}$ -isomorfas
```

---

Notar que los isomorfismos revisados por este algoritmo deben ser necesariamente revisados para comprobar definibilidad en cualquiera de los formatos. La ventaja de chequear estos en primer lugar es que podría reducirse la clase  $\mathcal{K}$  en el proceso.

Se obtiene una pequeña ganancia al chequear por  $\mathcal{L}$ -isomorfismos y recién descubierto uno de estos comprobar si es un  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfismo. Observar además que, para poder aplicar los teoremas de definibilidad de las secciones 2.1 y 2.2, habría que verificar que cada uno de los  $\mathcal{L}$ -isomorfismos entre estructuras de  $\mathcal{K}$  preserven  $R$  y vemos que basta con chequear sólo uno.

FIGURA 3.1.1. Esquema de  $\mathcal{K}$  antes del preprocesamientoFIGURA 3.1.2.  $\mathcal{K}$  luego del preprocesamiento

**3.1.1. Ejemplo de ejecución.** Supongamos que  $\mathcal{K}$  esta dado por la Figura 3.1.1, donde cada tipo de isomorfismo esta representado por una forma geométrica.

El algoritmo de preprocesamiento detectaria el  $\mathcal{L}$ -isomorfismo entre los dos octagonos y revisaria que sea tambien un  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfismo, dando lugar a la Figura 3.1.2, donde la flecha es el isomorfismo a chequear.

### 3.2. Definibilidad abierta

Dados  $\mathcal{F}_0$  y  $\mathcal{F}$  dos conjuntos de funciones, diremos que  $\mathcal{F}_0$  genera a  $\mathcal{F}$  si  $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$  y para toda  $f \in \mathcal{F}$  hay  $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{F}_0$  (quizás repetidas) tales que  $f = f_1 \circ \dots \circ f_n$ .

Dado un conjunto  $\mathcal{K}$  de estructuras definimos los siguientes conjuntos:

$$\text{iso}(\mathcal{K}) = \{\gamma : \gamma \text{ isomorfismo de } \mathbf{A} \text{ en } \mathbf{B} \text{ con } \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}\}$$

$$\text{sub iso}(\mathcal{K}) = \{\gamma : \gamma \text{ isomorfismo de } \mathbf{A}_0 \text{ en } \mathbf{B}_0 \text{ con } \mathbf{A}_0, \mathbf{B}_0 \in \mathbb{S}(\mathcal{K})\}$$

$$\text{hom}(\mathcal{K}) = \{\gamma : \gamma \text{ homomorfismo de } \mathbf{A} \text{ en } \mathbf{B} \text{ con } \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}\}$$

$$\text{sub hom}(\mathcal{K}) = \{\gamma : \gamma \text{ homomorfismo de } \mathbf{A}_0 \text{ en } \mathbf{B}_0 \text{ con } \mathbf{A}_0, \mathbf{B}_0 \in \mathbb{S}(\mathcal{K})\}$$

LEMA 27. Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden tales que  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  es un símbolo de relación  $n$ -ario y  $\mathcal{K}$  un conjunto normal de  $\mathcal{L}'$ -estructuras. Entonces si cada  $\gamma \in \text{sub iso}(\mathcal{K}_{\mathcal{L}})$  preserva  $R$ ,  $R$  es definible por una  $\mathcal{L}$ -fórmula abierta en  $\mathcal{K}$ .

DEMOSTRACIÓN. Directo del Teorema 11. □

TEOREMA 28. Sea  $\mathcal{K}$  un conjunto normal de  $\mathcal{L}$ -estructuras donde no hay estructuras isomorfas. Sea  $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{S}(\mathcal{K})$  tal que contiene exactamente un representante por cada tipo de isomorfismo en  $\mathbb{S}(\mathcal{K})$ . Sea  $\mathcal{F} \subseteq \text{sub iso}(\mathcal{K})$  tal que:

1. para cada  $\mathbf{S} \in \mathcal{S}$  se tiene que  $\text{aut}(\mathbf{S}) \subseteq \mathcal{F}$ ,
2. para cada  $\mathbf{A} \in \mathbb{S}(\mathcal{K}) - \mathcal{S}$  hay  $\gamma, \gamma^{-1} \in \mathcal{F}$  para algún isomorfismo  $\gamma$  de  $\mathbf{A}$  en el representante del tipo de isomorfismo de  $\mathbf{A}$  en  $\mathcal{S}$ .

Entonces  $\mathcal{F}$  genera  $\text{sub iso}(\mathcal{K})$ .

DEMOSTRACIÓN. Sea  $\gamma \in \text{sub iso}(\mathcal{K})$ , entonces  $\gamma : \mathbf{A}_0 \leq \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}_0 \leq \mathbf{B}$  isomorfismo, con  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ .

Si  $\mathbf{A}_0, \mathbf{B}_0 \in \mathcal{S}$ , como no hay estructuras isomorfas en  $\mathcal{S}$ ,  $\mathbf{A}_0 = \mathbf{B}_0$ , por lo tanto  $\gamma \in \text{aut}(\mathbf{A}_0) \subseteq \mathcal{F}$ .

Si  $\mathbf{A}_0 \in \mathcal{S}$  pero  $\mathbf{B}_0 \notin \mathcal{S}$ , entonces  $\mathbf{A}_0$  es el representante de  $\mathbf{B}_0$  en  $\mathcal{S}$ , y por lo tanto hay un isomorfismo  $\delta : \mathbf{B}_0 \rightarrow \mathbf{A}_0$  tal que  $\delta, \delta^{-1} \in \mathcal{F}$ . Claramente  $\delta\gamma = \lambda \in \text{aut}(\mathbf{A}_0) \subseteq \mathcal{F}$ , por lo tanto  $\gamma = \delta^{-1}\lambda$ .

Si  $\mathbf{A}_0, \mathbf{B}_0 \notin \mathcal{S}$ , hay  $\mathbf{C}_0 \in \mathcal{S}$  que es representante de  $\mathbf{A}_0$  y  $\mathbf{B}_0$ . Luego hay  $\delta : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{C}_0$  y  $\delta' : \mathbf{B}_0 \rightarrow \mathbf{C}_0$  tales que  $\delta, \delta^{-1}, \delta', \delta'^{-1} \in \mathcal{F}$ . Claramente  $\delta'\gamma\delta^{-1} = \lambda \in \text{aut}(\mathbf{C}_0) \subseteq \mathcal{F}$ , por lo tanto  $\gamma = \delta'^{-1}\lambda\delta$ .  $\square$

COROLARIO 29. Sean  $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$  lenguajes de primer orden tales que  $R \in \mathcal{L}' - \mathcal{L}$  es un símbolo de relación  $n$ -ario y  $\mathcal{K}$  un conjunto normal de  $\mathcal{L}'$ -estructuras. Supongamos  $\mathcal{F}$  es como en el Teorema 28 para la familia  $\mathcal{K}_{\mathcal{L}}$ . Entonces si cada  $\gamma \in \mathcal{F}$  preserva  $R$ , se tiene que  $R$  es definible por una  $\mathcal{L}$ -fórmula abierta en  $\mathcal{K}$ .

DEMOSTRACIÓN. Directa ya que composición de funciones que preservan, preserva y Lema 27.  $\square$

El Teorema 28 sugiere un subconjunto de isomorfismos que bastan para revisar definibilidad abierta a través del Corolario 29.

En el Algoritmo 2 se construye  $\mathcal{S}$  a la vez que se van revisando los isomorfismos en  $\mathcal{F}$ . Para esto recorreremos las estructuras en  $\mathcal{K}$  de mayor a menor tamaño. Al momento de procesar una  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  lo primero que se hace es buscar un  $\mathcal{L}$ -isomorfismo  $\gamma$  entre  $\mathbf{A}$  y un miembro  $\mathcal{S}$ . Si un tal  $\gamma$  existe, tanto  $\gamma$  como su inversa son revisados (miembros de  $\mathcal{F}$  correspondientes al punto (2) del Teorema 28). Si no hay un tal  $\gamma$ , la estructura  $\mathbf{A}$  es agregada a  $\mathcal{S}$  y sus  $\mathcal{L}$ -automorfismos son revisados (miembros de  $\mathcal{F}$  correspondientes al punto (1) del Teorema 28). A continuación las subestructuras de  $\mathbf{A}$  son procesadas de la misma manera.

Notar que en las líneas ?? y 14 que no se necesita revisar si los automorfismos son  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -automorfismos ya que, como se recorren todos su inversa también es revisada por preservación.

Además, una vez que una subestructura resulta ser  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfa a un representante en  $\mathcal{S}$ , sabemos que todas sus subestructuras ya tienen representante en  $\mathcal{S}$  y que los isomorfismos internos preservan. Esto permite disminuir la cantidad de subestructuras a revisar, como se ve en la línea 10.

**3.2.1. Ejemplo de ejecución.** Tomamos  $\mathcal{K}$  luego del preprocesamiento como en la Figura 3.1.2. Supongamos que el octágono tiene tres subestructuras propias, dos círculos y un triángulo, y que es procesado primero (o sea que tiene cardinalidad mayor o igual a la del trapecio). Sus subestructuras son revisadas y sus dos tipos de isomorfismos (círculo y triángulo) son agregados a  $\mathcal{S}$  y revisados sus automorfismos, mientras que para el segundo círculo solo se revisa el isomorfismo desde el representante en  $\mathcal{S}$ . En la Figura 3.2.1 se puede ver un esquema luego del procesamiento del octágono donde las estructuras en  $\mathcal{S}$  se muestran en verde y las flechas son los isomorfismos y automorfismos revisados hasta ahora.

Luego se revisa el trapecio y sus subestructuras, de las cuales la única que no tiene representante del tipo de isomorfismo en  $\mathcal{S}$  es el cuadrado por lo que se agrega a  $\mathcal{S}$  y se revisan sus automorfismos, mientras que para las demás solo se revisa el isomorfismo desde el representante. La Figura 3.2.2 esquematiza el procesamiento finalizado.

Notar que solo se revisan los automorfismos de estructuras en  $\mathcal{S}$  (coloreadas en verde) y que solo se revisan isomorfismos desde estructuras en  $\mathcal{S}$  a estructuras fuera de  $\mathcal{S}$ .

**Algorithm 2** Chequeo de definibilidad abierta

---

```


1:  $\mathcal{S} = \emptyset$ 
2: for  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ , desde la mayor a la menor cardinalidad do
3:    $Sub = [\mathbf{C} : \mathbf{C} \in \mathbb{S}_{\mathcal{L}}(\mathbf{A}), \text{ de la mayor a menor cardinalidad}]$ 
4:   for  $\mathbf{B} \in Sub$  do
5:      $iso = \text{TIENEREPRESENTANTE}(\mathbf{A}_0, \mathcal{S})$ 
6:     if  $iso \neq \text{Null}$  then
7:       if  $iso$  no es un  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfismo then
8:         return  $iso$   $\triangleright \gamma$  es contraejemplo
9:       end if
10:       $Sub = [\mathbf{C} : \mathbf{C} \in Sub \text{ tal que } C \not\subseteq B]$ 
11:    else
12:       $\mathcal{S} = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{B}\}$ 
13:      for  $\alpha \in \text{Aut}_{\mathcal{L}}(\mathbf{B})$  do
14:        if  $\alpha$  no preserva  $R$  then
15:          return  $\alpha$   $\triangleright \alpha$  es contraejemplo
16:        end if
17:      end for
18:    end if
19:  end for
20: end for
21: return  $\triangleright R$  es abierta-definible

22: function TIENEREPRESENTANTE( $\mathbf{A}_0, \mathcal{S}$ )
23:   for  $\mathbf{S} \in \mathcal{S}$ , con  $|\mathbf{A}_0| = |\mathbf{S}|$  do
24:     if hay  $\gamma : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{S}$  isomorfismo then
25:       return  $\gamma$   $\triangleright \gamma$  es isomorfismo con el representante
26:     end if
27:   end for
28:   return Null  $\triangleright$  No tiene representante
29: end function

```

---

FIGURA 3.2.1. Esquema luego del procesamiento del octagono

**3.3. Definibilidad de primer orden**


Luego de haber aplicado el Algoritmo 1 para preprocesamiento, solo basta con revisar los automorfismos para  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ .

**3.4. Definibilidad existencial-positiva**

Por el Teorema 24, luego de aplicar el Algoritmo 1 de preprocesamiento, solo basta con revisar los homomorfismos entre  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ .



FIGURA 3.2.2. Esquema del procesamiento finalizado

**Algorithm 3** Chequeo de definibilidad de primer orden

---

```

1:  $\mathcal{K}_0 = \emptyset$ 
2: for  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  do
3:    $\mathcal{K}_0 = \mathcal{K}_0 \cup \{\mathbf{A}\}$ 
4:    $\mathcal{K} = \mathcal{K} - \{\mathbf{A}\}$ 
5:   for  $\alpha \in \text{Aut}_{\mathcal{L}}(\mathbf{A})$  do
6:     if  $\alpha$  no es un  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -automorfismo then
7:       return  $\alpha \triangleright R$  no es definible en primer orden y  $\alpha$  es contraejemplo
8:     end if
9:   end for
10: end for
11: return  $\mathcal{K}_0$   $\triangleright R$  es definible en primer orden

```

---

**Algorithm 4** Chequeo de definibilidad existencial-positiva

---

```

1: for  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$  do
2:   for  $\mathbf{B} \in \mathcal{K}$  do
3:     if hay un  $h : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$   $\mathcal{L}$ -homomorfismo then
4:       if  $h$  no preserva  $R$  then
5:         return  $h \triangleright R$  no es existencial-positiva definible y  $h$  es
contraejemplo
6:       end if
7:     end if
8:   end for
9: end for
10: return  $\mathcal{K}$   $\triangleright R$  es existencial positiva definible

```

---

**3.5. Definibilidad abierta-positiva**

**TEOREMA 30.** Sea  $\mathcal{K}$  un conjunto normal de  $\mathcal{L}$ -estructuras donde no hay estructuras isomorfas. Sea  $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{S}(\mathcal{K})$  tal que contiene exactamente un representante por cada tipo de isomorfismo en  $\mathbb{S}(\mathcal{K})$ . Sea  $\mathcal{H} \subseteq \text{sub hom}(\mathcal{K})$  tal que:

- $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}$  con  $\mathcal{F}$  como en el Teorema 28,
- para cada  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{S}$  todo  $h : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  homomorfismo sobreyectivo esta en  $\mathcal{H}$ .

Entonces  $\mathcal{H}$  genera  $\text{sub hom}(\mathcal{K})$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $h \in \text{sub hom}(\mathcal{K})$ , entonces  $h : \mathbf{A}_0 \leq \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}_0 \leq \mathbf{B}$  homomorfismo, con  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{K}$ .

Si  $\mathbf{A}_0, h(\mathbf{A}_0) \in \mathcal{S}$ ,  $h$  es homomorfismo sobreyectivo entre estructuras de  $\mathcal{S}$ , por lo que  $h \in \mathcal{H}$ .

Si  $\mathbf{A}_0 \in \mathcal{S}$  pero  $h(\mathbf{A}_0) \notin \mathcal{S}$ , hay  $\mathbf{S}$  representante de  $h(\mathbf{A}_0)$  en  $\mathcal{S}$  y un isomorfismo  $\delta : h(\mathbf{A}_0) \rightarrow \mathbf{S}$  tal que  $\delta, \delta^{-1} \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}$ . Luego  $\delta^{-1}h = f$  donde  $f$  es un

homomorfismo claramente sobreyectivo de  $\mathbf{A}_0$  en  $\mathbf{S}$ , por lo que  $f \in \mathcal{H}$ . Finalmente  $h = \delta f$ .

Si  $\mathbf{A}_0, h(\mathbf{A}_0) \notin \mathcal{S}$ , hay respectivos  $\mathbf{S}, \mathbf{S}' \in \mathcal{S}$  representantes de  $\mathbf{A}_0$  y  $h(\mathbf{A}_0)$ . Luego hay  $\delta : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{S}$  y  $\delta' : h(\mathbf{A}_0) \rightarrow \mathbf{S}'$  tales que  $\delta, \delta^{-1}, \delta', \delta'^{-1} \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}$ . Luego  $\delta' h \delta^{-1} = f$  donde  $f$  es un homomorfismo claramente sobreyectivo de  $\mathbf{S}$  en  $\mathbf{S}'$ , por lo que  $f \in \mathcal{H}$ . Finalmente  $h = \delta'^{-1} f \delta$ .  $\square$

**TEOREMA 31** (Las estructuras finitas cumplen la propiedad de Cantor-Bernstein). *Dadas  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{B}$  estructuras finitas, si hay  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow A$  homomorfismos inyectivos entonces hay un  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  isomorfismo.*

**DEMOSTRACIÓN.** Sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  estructuras finitas y  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow A$  homomorfismos inyectivos. Notar que  $gf$  es una permutación de  $\mathbf{A}$ , y como  $\mathbf{A}$  es finito hay  $k \geq 1$  tal que  $(gf)^k = \text{Id}_A$ . Luego como  $g^{-1} = f(gf)^{k-1}$  vemos que  $g^{-1}$  es homomorfismo.  $\square$

Por el Teorema 16, luego de aplicar el Algoritmo1 de preprocesamiento y el Algoritmo 2 de definibilidad abierta.

### 3.6. Detección de homomorfismos

**3.6.1. CSP.** Como aparece en Wikipedia 2016, un CSP (constraint satisfaction problem) es definido como una terna  $\langle X, D, C \rangle$ , donde

$X = \{X_1, \dots, X_n\}$  es un conjunto de variables

$D = \{D_1, \dots, D_n\}$  es un conjunto con los respectivos dominios de los valores

$C = \{C_1, \dots, C_m\}$  es un conjunto de restricciones

Cada variable  $X_i$  se mueve en los valores del respectivo dominio no vacío  $D_i$ . Cada restricción  $C_j \in C$  es un par  $\langle t_j, R_j \rangle$ , donde  $t_j$  es una  $k$ -upla de variables y  $R_j$  es una relación  $k$ -aria en el correspondiente dominio de cada variable. Una valuación sobre las variables es una función desde un subconjunto de las variables a un particular conjunto de valores en los correspondientes dominios de valores. Una valuación  $v$  satisface la restricción  $\langle t_j, R_j \rangle$  si los valores asignados a las variables  $t_j$  satisfacen la relación  $R_j$ .

Una valuación es consistente si no viola ninguna de las restricciones. Una valuación es completa si incluye todas las variables. Una valuación es solución si es consistente y completa. En ese caso diremos que la valuación resuelve el CSP.

La ventaja de utilizar CSP es que hay múltiples circunstancias en las que uno de estos problemas se pueden resolver muy eficientemente, y pensamos continuar nuestro trabajo buscando maneras de aprovechar estas propiedades.

**3.6.2. CSP para calcular homomorfismos.** Sean  $\mathbf{A}, \mathbf{B}$   $\mathcal{L}$ -estructuras, queremos encontrar homomorfismos de  $\mathbf{A}$  en  $\mathbf{B}$  resolviendo una instancia de CSP. Tomamos

$$X = \{X_i : i \in A\}$$

$$D_i = B$$

$$C = C^R \cup C^f$$

donde  $C^R$  es tal que para cada  $R \in \mathcal{L}$   $n$ -aria, para cada  $(a_1, \dots, a_n) \in R^{\mathbf{A}}$ , se da que  $((X_{a_1}, \dots, X_{a_n}), R^{\mathbf{B}}) \in C^R$  y  $C^f$  es tal que para cada  $f \in \mathcal{L}$   $n$ -aria, para cada  $(a_1, \dots, a_n, a') \in \text{graph}(f^{\mathbf{A}})$ , se da que  $((X_{a_1}, \dots, X_{a_n}, X_{a'}), \text{graph}(f^{\mathbf{B}})) \in C^f$ .

**Algorithm 5** Chequeo de definibilidad abierta-positiva

---

```

1:  $\mathcal{S} = \emptyset$ 
2: for  $\mathbf{A} \in \mathcal{K}$ , desde la mayor a la menor cardinalidad do
3:    $Sub = [\mathbf{C} : \mathbf{C} \in \mathbb{S}_{\mathcal{L}}(\mathbf{A}), \text{ de la mayor a menor cardinalidad}]$ 
4:   for  $\mathbf{B} \in Sub$  do
5:      $(iso, ce) = \text{TIENEREPRESENTANTE}(\mathbf{A}_0, \mathcal{S})$ 
6:     if  $ce \neq \text{null}$  then
7:       return  $ce$   $\triangleright ce$  es contraejemplo
8:     end if
9:     if  $iso \neq \text{null}$  then
10:      if  $iso$  no es un  $\mathcal{L} \cup \{R\}$ -isomorfismo then
11:        return  $iso$   $\triangleright \gamma$  es contraejemplo
12:      end if
13:       $Sub = [\mathbf{C} : \mathbf{C} \in Sub \text{ tal que } C \not\subseteq B]$ 
14:    else
15:       $\mathcal{S} = \mathcal{S} \cup \{\mathbf{B}\}$ 
16:      for  $\alpha \in \text{Aut}_{\mathcal{L}}(\mathbf{B})$  do
17:        if  $\alpha$  no preserva  $R$  then
18:          return  $\alpha$   $\triangleright \alpha$  es contraejemplo
19:        end if
20:      end for
21:    end if
22:  end for
23: end for
24: for  $\mathbf{A} \in \mathcal{S}$  do
25:   for  $\mathbf{B} \in \mathcal{S}$ , con  $|\mathbf{B}| < |\mathbf{A}|$  do
26:    for  $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  con  $\gamma$  homomorfismo sobreyectivo do
27:      if  $\gamma$  no preserva  $R$  then
28:        return  $\gamma$   $\triangleright \gamma$  es contraejemplo
29:      end if
30:    end for
31:  end for
32: end for
33: return  $\triangleright R$  es definible por una abierta positiva

34: function TIENEREPRESENTANTE( $\mathbf{A}_0, \mathcal{S}$ )
35:   for  $\mathbf{S} \in \mathcal{S}$ , con  $|\mathbf{A}_0| = |\mathbf{S}|$  do
36:      $bihomo = \text{False}$ 
37:     for  $\gamma : \mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{S}$  con  $\gamma$  homomorfismo biyectivo do
38:        $bihomo = \text{True}$ 
39:       if  $\gamma$  es un  $\mathcal{L}$ -isomorfismo, con  $\mathbf{S} \in \mathcal{S}$  then
40:         return  $(\gamma, \text{Null})$   $\triangleright \gamma$  es isomorfismo con el representante
41:       else
42:         if  $\gamma$  no preserva  $R$  then
43:           return  $(\text{Null}, \gamma)$   $\triangleright \gamma$  es contraejemplo
44:         end if
45:       end if
46:     end for
47:     if  $\neg bihomo$  then
48:       for  $\gamma : \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{A}_0$  con  $\gamma$  homomorfismo biyectivo do
49:         if  $\gamma$  no preserva  $R$  then
50:           return  $(\text{Null}, \gamma)$   $\triangleright \gamma$  es contraejemplo
51:         end if
52:       end for
53:     end if
54:     return  $(\text{Null}, \text{Null})$   $\triangleright$  No tiene representante
55:   end for
56: end function

```

---

$C^f$ . Donde  $\text{graph}(f^{\mathbf{A}})$  es el gráfico de la función definido como  $\text{graph}(f^{\mathbf{A}}) = \{(x_1, \dots, x_n, f^{\mathbf{A}}(x_1, \dots, x_n)) : (x_1, \dots, x_n) \in A^n\}$ .

Supongamos que  $V : X \rightarrow B$  es una valuación solución de  $(X, D, C)$ , entonces el homomorfismo  $\gamma$  determinado por  $V$  será  $\gamma(a) = V(X_a)$ .

Si además quisiéramos que el homomorfismo fuera inyectivo, bastaría con agregar una restricción  $((X_1, \dots, X_m), \text{para todo par } (i, j) \text{ con } i \neq j \text{ y } i, j \in \{1, \dots, m\} \text{ se da que } X_i \neq X_j)$ , donde  $X_1, \dots, X_m$  son todas las variables en  $X$ . Para que fuera sobreyectivo bastaría agregar  $((X_1, \dots, X_m), \bigcup_{i=1}^m \{X_i\} = B)$ .

**LEMA 32.** *Sea  $\mathbf{A}$  una estructura finita, entonces todo endomorfismo inyectivo de  $\mathbf{A}$  es un automorfismo de  $\mathbf{A}$ .*

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $\gamma$  un endomorfismo inyectivo de  $\mathbf{A}$ . Como  $A$  es finito tenemos que  $\gamma$  es sobre y además  $\gamma^{-1} = \gamma^k$  para algún  $k \geq 1$ .  $\square$

### 3.7. Generación de subestructuras

Dada una  $\mathcal{L}$ -estructura  $\mathbf{A}$ , generamos sus subestructuras recorriendo  $\mathcal{P}(A)$ , desde la mayor a la menor cardinalidad filtrando aquellos  $A_0 \in \mathcal{P}(A)$  que no son cerrados bajo  $\mathcal{L}$ .

Además cuando detectamos que una subestructura  $\mathbf{A}_0$  ya tiene representante en  $\mathcal{S}$  durante nuestros algoritmos, disminuimos los subconjuntos a chequear, revisando solo  $\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(A_0)$ , ya que si  $\mathbf{A}_0$  tiene representante en  $\mathcal{S}$ , entonces cada subestructura de  $\mathbf{A}_0$  tiene representante en  $\mathcal{S}$ .

Dado que conocemos implementaciones de este problema mucho mas eficientes, como por ejemplo la del Universal Algebra Calculator, pensamos mejorar en el futuro el algoritmo para generación de subestructuras que hemos estado utilizando durante este trabajo.

## Álgebras de Lindenbaum

### 4.1. Definiciones e ideas básicas

Sea  $\mathbf{A}$  una  $\mathcal{L}$ -estructura, y sea

$$\Sigma \in \{\text{Fo}(\mathcal{L}), \text{E}(\mathcal{L}), \text{E}^+(\mathcal{L}), \text{Op}(\mathcal{L}), \text{Op}^+(\mathcal{L})\}.$$

Notar que la colección de relaciones  $n$ -arias definibles en  $\mathbf{A}$  por fórmulas en  $\Sigma$  es cerrada bajo uniones e intersecciones (y también bajo complementación cuando  $\Sigma \in \{\text{Fo}(\mathcal{L}), \text{Op}(\mathcal{L})\}$ ). Llamaremos *Álgebra de Lindenbaum* (de relaciones  $n$ -arias definibles por  $\Sigma$  en  $\mathbf{A}$ ) al reticulado distributivo (o álgebra de Boole) resultante. Utilizaremos la siguiente notación:

- $\mathbf{Fo}_n(\mathbf{A})$  = Álgebra de Boole de relaciones  $n$ -arias definibles en  $\mathbf{A}$ ,
- $\mathbf{E}_n(\mathbf{A})$  = Reticulado de relaciones  $n$ -arias definibles por existenciales en  $\mathbf{A}$ ,
- $\mathbf{E}_n^+(\mathbf{A})$  = Reticulado de relaciones  $n$ -arias definibles por existenciales positivas en  $\mathbf{A}$ ,
- $\mathbf{Op}_n(\mathbf{A})$  = Álgebra de Boole de relaciones  $n$ -arias definibles por abiertas en  $\mathbf{A}$ ,
- $\mathbf{Op}_n^+(\mathbf{A})$  = Reticulado de relaciones  $n$ -arias definibles por abiertas positivas en  $\mathbf{A}$

**TEOREMA 33** (Teorema de representación de Stone). *Toda álgebra de Boole finita  $\mathbf{A}$  es isomorfa al álgebra definida por  $\mathcal{P}(At)$  donde  $At \subseteq A$  es el conjunto de átomos en  $\mathbf{A}$ .*

**TEOREMA 34** (Teorema de representación de Birkhoff). *Todo reticulado distributivo finito  $\mathbf{L}$  es isomorfo al reticulado de conjuntos descendientes del poset de elementos join-irreducibles en  $\mathbf{L}$ .*

Definimos:

$$\text{sub hom}(\mathbf{A}) = \{\gamma : \gamma \text{ homomorfismo de } \mathbf{A}_0 \text{ en } \mathbf{B}_0 \text{ con } \mathbf{A}_0, \mathbf{B}_0 \in \mathbb{S}(\mathbf{A})\}$$

$$\text{sub iso}(\mathbf{A}) = \{\gamma : \gamma \text{ isomorfismo de } \mathbf{A}_0 \text{ en } \mathbf{B}_0 \text{ con } \mathbf{A}_0, \mathbf{B}_0 \in \mathbb{S}(\mathbf{A})\}$$

**LEMA 35.** *Una relación  $r \subseteq A^n$  es join-irreducible en  $\mathbf{Op}(\mathbf{A})$  sii hay  $\bar{a} \in A^n$  tal que  $r = \{h(\bar{a}) : h \in \text{sub iso}(\mathbf{A})\}$ .*

**DEMOSTRACIÓN.** Supongamos que  $r \subseteq A^n$  es join-irreducible en  $\mathbf{Op}(\mathbf{A})$ . Como  $r$  es cerrado bajo sub iso  $(\mathbf{A})$  por pertenecer a  $\mathbf{Op}(\mathbf{A})$ , es claro que

$$r = \bigcup_{\bar{x} \in r} \{h(\bar{x}) : h \in \text{sub iso}(\mathbf{A})\}$$

, pero como  $r$  es join-irreducible hay una  $\bar{a} \in r$  tal que  $r = \{h(\bar{a}) : h \in \text{sub iso}(\mathbf{A})\}$ .

Supongamos que  $r = \{h(\bar{a}) : h \in \text{sub iso}(\mathbf{A})\}$  para algun  $\bar{a} \in A^n$ . Sean  $r_1, \dots, r_m \in \mathbf{Op}(\mathbf{A})$  tales que

$$r = r_1 \cup \dots \cup r_m$$

, es claro que hay un  $r_j$  tal que  $\bar{a} \in r_j$ . Además como  $r_j$  es cerrado bajo sub iso  $(\mathbf{A})$  por pertenecer a  $\mathbf{Op}(\mathbf{A})$ , entonces  $r = r_j$ .  $\square$

LEMA 36. Una relación  $r \subseteq A^n$  es join-irreducible en  $\mathbf{Op}^+(\mathbf{A})$  sii hay  $\bar{a} \in A^n$  tal que  $r = \{h(\bar{a}) : h \in \text{sub hom}(\mathbf{A})\}$ .

DEMOSTRACIÓN. Igual a la del Lema 35  $\square$

#### 4.2. Preorden y algoritmo

#### 4.3. Algoritmos para calcular álgebras

#### 4.4. Ejemplos y aplicación

LEMA 37. Sea  $\mathbf{L}$  un reticulado y  $R$  una relación binaria no vacía sobre  $L$  preservada por endomorfismos en  $\mathbf{L}$ . Entonces vale que  $\Delta^L \subseteq R$ .

DEMOSTRACIÓN. Esto es una consecuencia directa de que para cada  $a \in L$  la función de  $L$  en  $L$  que vale constantemente  $a$  es un endomorfismo.  $\square$

TEOREMA 38 (Teorema del filtro primo). Sea  $\langle L, \vee, \wedge \rangle$  un reticulado distributivo y  $F$  un filtro. Supongamos  $x \in L - F$ . Entonces hay un filtro primo  $P$  tal que  $x \notin P$  y  $F \subseteq P$ .

LEMA 39. Sea  $\mathbf{L}$  un reticulado distributivo y  $R$  una relación binaria no vacía sobre  $L$  preservada por endomorfismos en  $\mathbf{L}$ . Si hay  $(a, b) \in R$  tal que  $a \not\leq b$  (respectivamente  $b \not\leq a$ ), entonces  $\{(x, y) : x \geq y\} \subseteq R$  (respectivamente  $\{(x, y) : x \leq y\} \subseteq R$ ).

DEMOSTRACIÓN. Fijamos  $(a, b) \in R$  tal que  $a \not\leq b$ , y sean  $c, d \in L$  tales que  $c \geq d$ . Veremos que  $(c, d) \in R$ . Por el Teorema 38 hay un filtro primo  $P$  que contiene al filtro generado por  $a$  y además  $b \notin P$ . Definimos  $h : L \rightarrow L$  por

$$h(x) = \begin{cases} c & \text{si } x \in P, \\ d & \text{si } x \notin P. \end{cases}$$

Es fácil ver que  $h$  es un endomorfismo. Finalmente como  $(a, b) \in R$  y  $h$  preserva  $R$ ,  $(h(a), h(b)) = (c, d) \in R$ .  $\square$

TEOREMA 40. Sea  $\mathbf{L}$  un reticulado distributivo y  $R$  una relación binaria sobre  $L$  definible por un fórmula existencial positiva en  $\mathbf{L}$ . Se da una de las siguientes:

- $R = \Delta$ ,
- $R = \{(x, y) : x \leq y\}$ ,
- $R = \{(x, y) : x \geq y\}$ ,
- $R = \{(x, y) : x \leq y\} \cup \{(x, y) : x \geq y\}$ ,
- $R = L \times L$ .

DEMOSTRACIÓN. Si  $R \subseteq \Delta$ , por el Lema 37  $R = \Delta$ .

Si  $R \subseteq \{(x, y) : x \leq y\}$ , pero  $R \not\subseteq \Delta$ , hay  $(a, b) \in R$  tales que  $a < b$ , entonces  $a \not\geq b$  y por el Lema 39  $R = \{(x, y) : x \leq y\}$ . Análogo para  $R \subseteq \{(x, y) : x \geq y\}$ .

Si  $R \not\subseteq \{(x, y) : x \leq y\}$  y  $R \not\subseteq \{(x, y) : x \geq y\}$ , aplicando dos veces el Lema 39  $\{(x, y) : x \leq y\} \cup \{(x, y) : x \geq y\} \subseteq R$ . Si además  $(a, b) \in R$  pero  $a \not\leq b$  y  $a \not\geq b$ , tomo  $(c, d) \in R$ , si son comparables ya esta están en  $R$  por lo anterior. Si son incomparables aplico dos veces el Teorema 38 y tomo dos filtros primos  $P$  y  $Q$  tales que  $a \in P$  pero  $b \notin P$  y  $b \in Q$  pero  $a \notin Q$ . Ahora definimos la siguiente función

$$h(x) = \begin{cases} c \vee d & \text{si } x \in P \cup Q \\ c & \text{si } x \in P - Q \\ d & \text{si } x \in Q - P \\ c \wedge d & \text{si } x \notin P \text{ y } x \notin Q \end{cases}$$

que fácilmente puede verse que es un endomorfismo. Por lo tanto como  $(a, b) \in R$  y  $h$  preserva  $R$ ,  $(h(a), h(b)) = (c, d) \in R$ . Por lo tanto  $R = L \times L$ .  $\square$

## Documentación de Definability

### 5.1. Introducción

Definability es un paquete que desarrollamos para SageMath, un software matemático licenciado bajo la GPL. Nuestro paquete implementa los algoritmos vistos en las secciones anteriores y permite dada una clase de estructuras, decidir definibilidad o generar las álgebras de Lindenbaum de relaciones definibles.

Nuestro paquete se basa en parte en las librerías desarrolladas por Peter Jipsen para utilizar Minion y Universal Algebra Calculator desde SageMath.

El paquete se desarrolla en <https://github.com/pablogventura/tesis>.

### 5.2. Instalación

#### 5.2.1. Requerimientos.

- SageMath 6.7 o superior.
- Minion 1.8 o superior.
- LADR versión de noviembre de 2009, (interfaz de línea de comandos de Prover9, Mace4, y otros programas)

#### 5.2.2. Instalación del paquete en SageMath.

### 5.3. Entrada de estructuras

### 5.4. Chequeo de definibilidad

### 5.5. Generación de álgebras de Lindenbaum

## Capítulo 6

### **Conclusiones y trabajo futuro**



## Bibliografía

- Campercholi, Miguel y Diego Vaggione (2015). *Semantical conditions for the definability of functions and relations*. eprint: 1506.07501. URL: <http://www.arxiv.org/abs/1506.07501>.
- Wikipedia (2016). *Constraint satisfaction problem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [En línea, visitado el 11 de Enero de 2016]. URL: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Constraint%20satisfaction%20problem&oldid=695651340>.