


Algoritmos para decidir definibilidad de relaciones en fragmentos de primer orden


Pablo Ventura

2 de marzo de 2016

Lenguaje Natural



Lenguaje Natural




Restringimos el lenguaje:

«esta arriba o a la misma altura que»

«esta abajo o a la misma altura que»

Lenguaje Natural

A pesar de reflejarlo en espejo se mantiene quien esta abajo o arriba de quien.



Lenguaje Formal

- ▶ La **Lógica de Primer Orden** es un lenguaje formal que permite expresar propiedades de estructuras matemáticas.

Lenguaje Formal

- ▶ La **Lógica de Primer Orden** es un lenguaje formal que permite expresar propiedades de estructuras matemáticas.
- ▶ En nuestro caso lo restringimos a fórmulas abiertas, abiertas positivas, existenciales, existenciales positivas y sin restricciones.

Elemento definible

Definición

Sean \mathcal{L} un lenguaje de primer orden y \mathbf{A} una \mathcal{L} -estructura. Si $a \in A$, diremos que la fórmula $\varphi(x)$ *define a a en \mathbf{A}* si para todo $x \in A$ vale que

$$x = a \iff \mathbf{A} \models \varphi(x).$$

Preservación para refutar definibilidad

Teorema

Si F es un automorfismo de \mathbf{A} y $\varphi(y)$ es una fórmula, entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a] \iff \mathbf{A} \models \varphi[F(a)].$$

Preservación para refutar definibilidad


Teorema

Si F es un automorfismo de \mathbf{A} y $\varphi(y)$ es una fórmula, entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a] \iff \mathbf{A} \models \varphi[F(a)].$$

Volviendo al ejemplo:

¿Es definible el elemento 2 en $\langle 2 \times 2, \leq \rangle$?



Preservación para refutar definibilidad


Teorema

Si F es un automorfismo de \mathbf{A} y $\varphi(y)$ es una fórmula, entonces

$$\mathbf{A} \models \varphi[a] \iff \mathbf{A} \models \varphi[F(a)].$$

Volviendo al ejemplo:

¿Es definible el elemento 2 en $\langle \mathbf{2} \times \mathbf{2}, \leq \rangle$?



Hay $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$, tal que $\gamma(2) = 3$.

Pero lo interesante es la vuelta


Teorema

Si \mathbf{A} es finita y e es punto fijo de todo automorfismo, entonces e es definible.

Pero lo interesante es la vuelta

Teorema


Si \mathbf{A} es finita y e es punto fijo de todo automorfismo, entonces e es definible.



Pero lo interesante es la vuelta

Teorema

Si \mathbf{A} es finita y e es punto fijo de todo automorfismo, entonces e es definible.



Solo los de la vertical!

$$\{1, 12, 5, 0\}$$

Definibilidad y preservación de relaciones binarias

Definición

Sean \mathbf{A} una estructura y $R \subseteq A \times A$. Diremos que la fórmula $\varphi(x_1, x_2)$ *define a* R en \mathbf{A} si para todo $a_1, a_2 \in A$ vale que


$$(a_1, a_2) \in R \iff \mathbf{A} \models \varphi(a_1, a_2).$$

Definibilidad y preservación de relaciones binarias

Definición

Sean \mathbf{A} una estructura y $R \subseteq A \times A$. Diremos que la fórmula $\varphi(x_1, x_2)$ *define a* R en \mathbf{A} si para todo $a_1, a_2 \in A$ vale que

$$(a_1, a_2) \in R \iff \mathbf{A} \models \varphi(a_1, a_2).$$




Definibilidad y preservación de relaciones binarias

Definición

Sean \mathbf{A} una estructura y $R \subseteq A \times A$. Diremos que la fórmula $\varphi(x_1, x_2)$ *define a* R en \mathbf{A} si para todo $a_1, a_2 \in A$ vale que

$$(a_1, a_2) \in R \iff \mathbf{A} \models \varphi(a_1, a_2).$$



La relación binaria «cubre a» es definible por

$$x \leq y \wedge x \neq y \wedge \nexists z (x \leq z \wedge x \neq z \wedge z \leq y \wedge z \neq y)$$

Preservación de relaciones binarias

Definición

Sean \mathbf{A}, \mathbf{B} dos \mathcal{L} -estructuras y $R \in \mathcal{L}$ binaria. Una función $f : A \rightarrow B$ *preserva* a R si

$$(a_1, a_2) \in R^{\mathbf{A}} \implies (f(a_1), f(a_2)) \in R^{\mathbf{B}}.$$

Teorema semántico de primer orden

Teorema

Sean \mathbf{A} una estructura y $R \subseteq A \times A$. Son equivalentes:

1. Hay una fórmula que define R en \mathbf{A} .
2. Todo automorfismo $\gamma : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$ preserva R .

Problema de definibilidad

Dados:

- ▶ \mathcal{L} un lenguaje de primer orden finito,
- ▶ \mathbf{A} una \mathcal{L} -estructura finita,
- ▶ un $R \subseteq A \times A$,
- ▶ un fragmento de primer orden Σ ,

decidir si hay una fórmula en Σ que define a R en \mathbf{A} .

Teorema semántico para abiertas

Teorema

Sean \mathbf{A} una estructura y $R \subseteq A \times A$. Son equivalentes:


1. Hay una fórmula abierta que define a R en \mathbf{A} .
2. Para todas $\mathbf{B}, \mathbf{C} \leq \mathbf{A}$, se tiene que todo isomorfismo $\sigma : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ preserva R .

Teorema semántico para abiertas


Teorema

Sean \mathbf{A} una estructura y $R \subseteq A \times A$. Son equivalentes:


1. Hay una fórmula abierta que define a R en \mathbf{A} .
2. Para todas $\mathbf{B}, \mathbf{C} \leq \mathbf{A}$, se tiene que todo isomorfismo $\sigma : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ preserva R .



Generación




Generación



Representantes para cada tipo de iso


Generación



Representantes para cada tipo de iso

- Automorfismos de los representantes


Generación



Representantes para cada tipo de iso

- ▶ Automorfismos de los representantes
- ▶ Solo un isomorfismo de representante en representado


Generación



Representantes para cada tipo de iso

- ▶ Automorfismos de los representantes
- ▶ Solo un isomorfismo de representante en representado
- ▶ Sin morfismos entre subestructuras de subestructuras

Generación



Representantes para cada tipo de iso

- ▶ Automorfismos de los representantes
- ▶ Solo un isomorfismo de representante en representado
- ▶ Sin morfismos entre subestructuras de subestructuras

Generan
al resto de morfismos


Algoritmo para definibilidad abierta

- ▶ $\mathcal{S} = \emptyset$
- ▶ Para cada subestructura \mathbf{B} de \mathbf{A} , de mayor a menor
 - ▶ Si tiene representante en \mathcal{S}
 - ▶ Reviso preservación en el isomorfismo
 - ▶ Salteo las subestructuras de \mathbf{B}
 - ▶ No tiene representante en \mathcal{S}
 - ▶ Se agrega la subestructura a \mathcal{S}
 - ▶ Se revisa preservación en los automorfismos

Ejemplo de ejecución

$$\langle 3 \times 3, \leq \rangle$$


$$R = \{(x, y) : x \text{ esta a la izquierda de } y\}$$



Ejemplo de ejecución

$$\langle 3 \times 3, \leq \rangle$$

$$R = \{(x, y) : x \text{ esta a la izquierda de } y\}$$



Contraejemplo!

γ iso de $\langle 0, 1 \rangle^L$ en $\langle 0, 2 \rangle^L$

$$\gamma(0) = 0$$

$$\gamma(1) = 2$$

$(2, 0) \in R$ pero $(1, 0) \notin R$

Otros algoritmos

Desarrollamos algoritmos con ideas similares para los siguientes fragmentos:

- ▶ Fórmulas abiertas positivas (Homomorfismos subestructuras)
- ▶ Fórmulas existenciales (Automorfismos)
- ▶ Fórmulas existenciales positivas (Endomorfismos)

Álgebras de relaciones definibles

- ▶ Las relaciones binarias definibles por Σ en \mathbf{A} son cerradas bajo \cup y \cap .

Álgebras de relaciones definibles

- ▶ Las relaciones binarias definibles por Σ en \mathbf{A} son cerradas bajo \cup y \cap .
- ▶ Forman un reticulado distributivo, llamado **Álgebra de Lindenbaum**.

Álgebras de relaciones definibles


- ▶ Las relaciones binarias definibles por Σ en \mathbf{A} son cerradas bajo \cup y \cap .
- ▶ Forman un reticulado distributivo, llamado **Álgebra de Lindenbaum**.
- ▶ Un reticulado distributivo queda caracterizado por sus elementos join-irreducibles.

Join-irreducibles

Un elemento es join-irreducible si no puede ser expresado como supremo de otros elementos.

Join-irreducibles

Un elemento es join-irreducible si no puede ser expresado como supremo de otros elementos.



Teorema semántico de existencia positivas

Teorema

Las relaciones definibles por fórmulas existencia positivas en \mathbf{A} son exactamente las preservadas por endomorfismos de \mathbf{A} .

Cálculo de las relaciones Join-irreducibles

Lema

Una relación $r \subseteq A^2$ es join-irreducible en $\mathbf{E}^+(\mathbf{A})$ sii hay $p \in A^2$ tal que $r = \{h(p) : h \in \text{Endomorfismos}(\mathbf{A})\}$.


Generación del álgebra de Lindenbaum

- Recopilamos los endomorfismos generadores a partir del algoritmo de chequeo.


Generación del álgebra de Lindenbaum

- ▶ Recopilamos los endomorfismos generadores a partir del algoritmo de chequeo.
- ▶ Saturamos cada $\bar{a} \in A^n$ con estos endomorfismos para obtener cada elemento join-irreducible. En particular $\{h(\bar{a}) : h \in \text{Endomorfismos}(\mathbf{A})\}$.

Ejecución para reticulados distributivos




Ejecución para reticulados distributivos



Interpretando la salida:

► Δ

Ejecución para reticulados distributivos




Interpretando la salida:

► Δ

► \leq

Ejecución para reticulados distributivos




Interpretando la salida:

► Δ

► \leq

► \geq

Ejecución para reticulados distributivos




Interpretando la salida:

► Δ

► \leq

► \geq

► L^2

$E^+(3 \times 3)$ 

Nuestro teorema de reticulados distributivos

Teorema

Sea \mathbf{L} un reticulado distributivo y R una relación binaria sobre L definible por un fórmula existencial positiva en \mathbf{L} . Se da una de las siguientes:

- ▶ $R = \Delta$,
- ▶ $R = \{(x, y) : x \leq y\}$,
- ▶ $R = \{(x, y) : x \geq y\}$,
- ▶ $R = \{(x, y) : x \leq y\} \cup \{(x, y) : x \geq y\}$,
- ▶ $R = L \times L$.

Aportes

- ▶ Resultados sobre un conjunto generador para los morfismos a revisar para definibilidad abierta y definibilidad abierta positiva.

Aportes

- ▶ Resultados sobre un conjunto generador para los morfismos a revisar para definibilidad abierta y definibilidad abierta positiva.
- ▶ Algoritmos para decidir definibilidad de relaciones, en fórmulas abiertas, abiertas positivas, existenciales y existenciales positivas.

Aportes

- ▶ Resultados sobre un conjunto generador para los morfismos a revisar para definibilidad abierta y definibilidad abierta positiva.
- ▶ Algoritmos para decidir definibilidad de relaciones, en fórmulas abiertas, abiertas positivas, existenciales y existenciales positivas.
- ▶ Algoritmos para obtener el álgebra de relaciones definibles.

Aportes

- ▶ Resultados sobre un conjunto generador para los morfismos a revisar para definibilidad abierta y definibilidad abierta positiva.
- ▶ Algoritmos para decidir definibilidad de relaciones, en fórmulas abiertas, abiertas positivas, existenciales y existenciales positivas.
- ▶ Algoritmos para obtener el álgebra de relaciones definibles.
- ▶ Se desarrolló una herramienta que implementa dichos algoritmos.

Aportes

- ▶ Resultados sobre un conjunto generador para los morfismos a revisar para definibilidad abierta y definibilidad abierta positiva.
- ▶ Algoritmos para decidir definibilidad de relaciones, en fórmulas abiertas, abiertas positivas, existenciales y existenciales positivas.
- ▶ Algoritmos para obtener el álgebra de relaciones definibles.
- ▶ Se desarrolló una herramienta que implementa dichos algoritmos.
- ▶ Caracterización de las relaciones binarias definibles por existenciales positivas en reticulados distributivos.

Trabajo Futuro

- ▶ Definibilidad por conjunción de atómicas y por primitivas positivas.

Trabajo Futuro

- ▶ Definibilidad por conjunción de atómicas y por primitivas positivas.
- ▶ Interacción entre los diferentes tipos de definibilidad.

Trabajo Futuro

- ▶ Definibilidad por conjunción de atómicas y por primitivas positivas.
- ▶ Interacción entre los diferentes tipos de definibilidad.
- ▶ Mejores implementaciones para la generación de subestructuras.

Trabajo Futuro

- ▶ Definibilidad por conjunción de atómicas y por primitivas positivas.
- ▶ Interacción entre los diferentes tipos de definibilidad.
- ▶ Mejores implementaciones para la generación de subestructuras.
- ▶ Continuar el estudio de la definibilidad existencial positiva en reticulados distributivos.

¿Preguntas?