

Diccionario de variables

Red bayesiana gaussiana — Enfermedad renal crónica (ckd.csv)

Variables incluidas en el modelo

Variable	Nombre	Descripción	Unidad
age	Edad	Edad del paciente al momento de la evaluación.	años
bp	Presión arterial	Presión diastólica. Registrada en múltiplos de 10, por lo que en la práctica es ordinal.	mm/Hg
bgr	Glucosa en sangre	Glucosa sérica tomada en cualquier momento del día, sin ayuno previo.	mg/dL
bu	Urea en sangre	Producto de desecho del metabolismo proteico. Se acumula cuando cae la filtración glomerular.	mg/dL
sc	Creatinina sérica	Marcador principal de función renal. Distribución con sesgo marcado a la derecha.	mg/dL
sod	Sodio	Electrolito regulado por el riñón; se altera con la pérdida de capacidad de concentración.	mEq/L
pot	Potasio	Electrolito de excreción renal. Su elevación es típica de la ERC avanzada.	mEq/L
hemo	Hemoglobina	Proteína transportadora de oxígeno. Representa la anemia asociada a la ERC.	g/dL
wc	Leucocitos	Conteo de células blancas; marcador de infección o inflamación.	células/mm ³

Variables excluidas

Variable	Nombre	Motivo de exclusión
sg	Gravedad específica	Ordinal de cinco niveles; incumple el supuesto gaussiano.
al	Albúmina en orina	Ordinal de seis niveles (escala de cruces del EGO).
su	Azúcar en orina	Ordinal censurada por abajo: solo se eleva sobre el umbral renal de glucosa (~180 mg/dL).
pcv	Volumen celular aglomerado	Redundante con hemo : mide la misma dimensión eritrocitaria.
rc	Conteo de eritrocitos	Redundante con hemo ; además es la de mayor cantidad de faltantes.
rbc, pc, pcc, ba	Marcadores del EGO	Catóricas binarias (normal/anormal, presente/ausente).
htn, dm, cad, appet, pe, ane	Comorbilidades y síntomas	Catóricas binarias.
class	Diagnóstico	Catórica binaria. No puede incluirse como nodo hijo de variables continuas en una red gaussiana.