



Castilla-La Mancha

Щеплення від

	Прената- льний період	2 місяці	4 місяці	6 місяців	11 місяців	12 місяців	15 місяців	4 роки	5 років	6 років	12 років	14 років	19 -64 роки	≥ 60 років	65 років	80 років
Гепатиту В (Б) ¹		HB	HB		HB											
Дифтерії, правця, коклюшу ²	dTpa	DTPa	DTPa		DTPa					DTPa		Td	Td		Td	
Поліомієліту		VPI	VPI		VPI					VPI						
Гемофільної інфекції типу b (б)		Hib	Hib		Hib											
Пневмококової хвороби		VNC	VNC		VNC										VNC	
Менінгококової хвороби ³		MenB	MenB MenC			MenB MenC					Men ACWY					
Кору, краснухи, паротиту ⁴						SRP		SRP					SRP			
Вітряна віспа ⁵							VVZ	VVZ			VVZ		VVZ			
Вірусу папіломи людини ⁶											VPH					
Грип ⁷	Flu			Flu annual										Flu annual		
Герпес Зостер ⁸															HZ	HZ

Систематичне введення

Введення чутливим або невакцинованим особам

Пояснення

1. Hepatitis B (Гепатит Б)

Щеплення у дитинстві:

Щеплення робиться у віці 0, 2, 4 у 11 місяців дітям, матері яких мають позитивний антиген вірусу гепатиту В (AgHBs positivo), а також тим, чиїм матерям не було зроблено щеплення і які не пройшли скринінг. Перша доза вакцини буде введена в перші 24 години життя разом з імуноглобуліном анти-НВ.

Щеплення у підлітковому та молодому віці:

Особам до 18 років, які не були привиті до цього, будуть введені 3 дози вакцин з такими інтервалами: 0, 1 і 6 місяців.

2. Difteria, Tétanos, Tosferina (Дифтерія, Правець, Коклюш)

Пренатальне щеплення (dTpa):

Одна доза вакцини dTpa під час кожної вагітності, після досягнення 27 неділі, краще всього на 27 чи 28 неділі вагітності.

Щеплення у дорослих (Td):

Перевірити календар прививок зроблених раніше перед тим як починати курс щеплення вакциною Td у дорослої людини. Співпрацюючи з медичним персоналом, а також з працівниками служби по передбаченню професійних ризиків, буде вивчений календар здійснених щеплень і, у разі необхідності, буде проведено щеплення вакциною Td у розмірі 5 доз. Людям у віці 65 років, що в дитинстві чи у підлітковому віці були прищепленні цією вакциною, необхідна ще одна доза вакцини Td по досягненні цього віку.

Комбіноване щеплення DTPa/VPI у віці 6 років:

Необхідна доза комбінованої вакцини DTPa/VPI неповнолітнім, що досягли віку 6 років і які отримали перші 3 дози вакцини у віці 2,4 у 11 місяців. Діти які отримали дози вакцини у 2,4,6 у 18 місяців (в цілому 4 дози) потребують по досягненню 6 років лише вакцину dTpa без VPI.

3. Enfermedad meningocócica (Менінгококова хвороба (у народжених після 2023))

Рекомендується щеплення від менінгококової інфекції спричиненої серогрупою Б з інтервалом у 1 – 2 тижні відносно інших інактивованих вакцин, що, згідно календарю щеплень, мають бути зроблені у тому ж віці. Це необхідно заради того, щоб звести до мінімуму можливу реактогенність у разі взаємодії. Важливо, щоб щеплення було здійснене у віці 2 і 4 місяців.

4. Sarampión, Rubéola y Parotiditis (Кіп, Краснуха та Епідемічний паротит)

ТДозу, що вводиться у віці 4 років, можна поєднати з прививкою від вітряної віспи, ввівши для цього потрібну бактеріальну вакцину АКДС.

Щеплення у дорослих:

Співпрацюючи з медичним персоналом, а також з працівниками служби по передбаченню професійних ризиків, буде вивчений календар здійснених щеплень. Дане щеплення рекомендується особам, що народилися на території Іспанії після 1970 року і у яких відсутні записи у календарі щеплень. У разі необхідності будуть введені 2 дози вакцини TV з інтервалом між дозами, як мінімум, у 4 неділі. Дана вакцина протипоказана вагітним жінкам та імуноскомпроментованим особам.

5. Varicela (Вітряна віспа)

Дозу, що вводиться у віці 4 років, можна поєднати з прививкою від кіру, краснухи та епідемічного паротиту, ввівши для цього ввести потрібну бактеріальну вакцину АКДС.

Щеплення у підлітків:

Особам, що досягли 12-річного віку, які не проходили щеплення і які не перехворіли на цю хворобу, мають бути введені 2 дози вакцини від віспи з інтервалами між дозами, як мінімум, 4 тижні (бажано 8-тижневий інтервал) або буде введена друга доза для завершення курсу вакцинації, якщо попередньо до цього була введена лише перша доза.

Щеплення у дорослих:

У осіб, у яких відсутні задокументовані докази їх імунітету до вітряної віспи у дорослому віці, будуть проведені серологічні аналізи (IgG). У випадку негативного результату цього серологічного аналізу людині мають бути введені 2 дози вакцини від віспи з інтервалами між дозами, як мінімум, 4 тижні (бажано 8-тижневий інтервал). Попередньо отримані 2 дози цієї вакцини вважаються синонімом імунітету до даної хвороби.

* Задокументовані докази імунітету до вітряної віспи у дорослому віці: документ, що засвідчує щеплення 2 дозами вакцини, офіційно задокументований факт, що людина вже перехворіла на цю хворобу, історія хвороби на оперізуючий герпес (герпес зостер) чи серологічні результати аналізу (IgG позитивна).

Дана вакцина протипоказана вагітним жінкам та імуноскомпроментованим особам.

6. Virus del papiloma humano (Вірус папіломи людини)

Щеплення по досягненню 12 річного віку (хлопці та дівчата народженні після 2011 року):

Мають бути введені 2 дози вакцини з інтервалами між дозами, як мінімум, 6 місяців.

Щеплення у віці між 12 і до досягнення 18 років:

Щеплення здійснювати лише особам жіночої статі які не отримали жодної дози вакцини або які отримали її лише частково до цього. Щеплення починати по досягненню 15 річного віку і мають бути введені 3 дози вакцини з інтервалом у 0, 1-2, 6 місяців (залежно від вакцини). Курс вакцинації буде завершений згідно віку отримання першої дози.

7. Gripe (Грип)

Пренатальне щеплення:

У сезон грипу щеплення буде здійснюватися усім вагітним жінкам, незалежно від терміну вагітності.

Щеплення у дитинстві:

Рекомендується щорічне щеплення (під час щорічної кампанії) 1 дозою вакцини дітей у віці від 6 до 59 місяців.

Щеплення у дорослому віці:

Рекомендується щорічне щеплення (під час щорічної кампанії) 1 дозою вакцини осіб яким виповнилося 60 років і більше.

8. Herpes Zóster (Герпес Зостер/оперізуючий герпес)

Вводяться 2 дози вакцини з інтервалом у 2 місяці.

Абревіатури

HB: Вакцина проти гепатиту В (Б)

DTPa: Адсорбована вакцина проти дифтерії, правця, коклюшу (Вакцина АКДП) з високим рівнем антигенів

dTPa: Адсорбована вакцина проти дифтерії, правця, коклюшу (Вакцина АКДП) з низьким рівнем антигенів

Td: Вакцина проти правця і дифтерії

VPI: Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ)

Hib: Вакцина проти Гемофільної палички (*Haemophilus influenzae*) типу б (b)

VNC: Валентна пневмококова кон'югована вакцина проти пневмококової інфекції

Men C: Кон'югована вакцина проти менінгококової інфекції серогрупи С (Ц)

Men B: Кон'югована вакцина проти менінгококової інфекції серогрупи В (Б)

Men ACWY: Кон'югована вакцина проти менінгококової інфекції серогрупи А, С, W та Y

SRP: Вакцина проти кору, краснухи та епідемічного паротиту (потрійна бактеріальна вакцина)

VVZ: Вакцина проти вітряної віспи

VPH: Вакцина проти вірусу папіломи людини

Flu: Вакцина проти грипу

Flu annual: щорічна вакцинація від грипу

HZ: Вакцина проти оперізуючого герпесу (герпес зостер)