


تطعيم



Castilla-La Mancha

80 سنة	65 سنة	≥ 60 سنة	19 - 64 سنة	14 سنة	12 سنة	6 سنوات	5 سنوات	4 سنوات	15 شهرًا	12 شهرًا	11 شهرًا	6 أشهر	4 أشهر	شهرين	قبل الولادة	
											HB		HB	HB		التهاب الكبد ب ¹
	Td		Td	Td		DTPa					DTPa		DTPa	DTPa	dTpa	الخناق والكزاز والسعال الديكي ²
						VPI					VPI		VPI	VPI		شلل الأطفال
											Hib		Hib	Hib		المستدمية النزلة من النوع ب
	VNC										VNC		VNC	VNC		مرض المكورات الرئوية
					Men ACWY					MenB MenC			MenB MenC	MenB		مرض المكورات السحائية ³
			SRP					SRP		SRP						الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف ⁴
			VVZ		VVZ			VVZ	VVZ							جدري الماء ⁵
					VPH											فيروس الورم الحليمي البشري ⁶
		Flu annual						Flu annual							Flu	انفلونزا ⁷
HZ	HZ															الهربس النطاقي ⁸

الإدارة المنهجية

الإدارة للأشخاص المعرضين للإصابة سابقا أو غير الملقحين

مفاتيح المصطلحات

1. التهاب الكبد ب

التطعيم خلال فترة الطفولة:

بجدول زمني لـ 0 أشهر و شهرين و 4 اشهر و 11 شهرا سيتم تطعيم أبناء الأمهات ذوات المستضد السطحي لالتهاب الكبد ب HBAG الإيجابي والأمهات غير الملقحات واللاتي لم يتم إجراء الفحص عليهن. سيتم إعطاء الجرعة الأولى في أول 24 ساعة من الولادة إلى جانب الغلوبولين المناعي المضاد لـ HB .

التطعيم لدى المراهقين والشباب:

سيتم إعطاء الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم سابقا حتى سن 18 عاما، ثلاث جرعات حسب الجدول الزمني 0 أشهر و6 أشهر و6 أشهر.

2. الخناق والكزاز والسعال الديكي

قبل الولادة(dTpa) :

جرعة من dTpa في كل حمل بداية من الأسبوع 27 من الحمل، ويفضل أن يكون ذلك في الأسبوع 27 أو 28.

التطعيم عند البالغين (Td):

التحقق من حالة التطعيم السابقة قبل بدء أو إكمال نظام التطعيم الأولي بلقاح الكزاز والدفتيريا Td لدى البالغين. وسيتم استخدام الاتصال بالخدمات الصحية، بما في ذلك الوقاية من المخاطر المهنية، للتحقق من حالة التطعيم، وإذا لزم الأمر، سيتم تطعيم Td حتى اكتمال 5 جرعات. سيتم إعطاء جرعة من Td في سن 65 تقريبا للأشخاص الذين تلقوا 5 جرعات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة.

لقاح DTPa / VPI المشتركين في سن 6 سنوات:

سيتم إعطاء لقاح DTPa/VPI المشتركين للأطفال الذين تم تطعيمهم في عمر الشهرين و4 أشهر و11 شهرا عند بلوغهم سن 6 سنوات. وان الذين تم تطعيمهم في عمر الشهرين و4 أشهر و6 أشهر و18 شهرا (4 جرعات في الجملة) يتم تطعيمهم بـ dTpa دون VPI ، عند بلوغهم سن 6 سنوات.

3.مرض المكورات السحائية (مواليد من 2023)

يوصى بإعطاء اللقاح ضد مرض المكورات السحائية عن طريق المجموعة المصلية ب مع احترام فترة أسبوع أو أسبوعين فيما يتعلق باللقاحات المعطلة الأخرى المشار إليها في نفس العمر، لتقليل التفاعل المحتمل للإعطاء المشترك. من المهم أن تعطى في الوقت المحدد في عمر الشهرين و4 أشهر.

4. الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف

في جرعة الأشخاص من العمر 4 سنوات، يمكن استخدام لقاح رباعي الفيروسات لتسهيل الإعطاء المشترك مع جدري الماء.

التطعيم عند البالغين:

سيتم انتهاء فرصة الاتصال بالخدمات الصحية، بما في ذلك الوقاية من المخاطر المهنية، لمراجعة حالة التطعيم. يوصى بالتطعيم للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ موثق من التطعيم المولودين في إسبانيا بعد عام 1970. و إذا لزم الأمر، يجب إعطاء جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف و الحصبة الألمانية (الثلاثي الفيروسي) TV على الأقل كل 4 أسابيع. إذا كنت قد تلقيت جرعة من قبل، إعطاء جرعة واحدة فقط من TV. وتطعيم لا يناسب النساء الحوامل والأشخاص الذين الأجهزة المناعية المنقوصة .

5. جدري الماء

بالنسبة لجرعة الأشخاص من العمر 4 سنوات، ولتسهيل التلقيح المشترك مع الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف ، يمكن استخدام لقاح رباعي الفيروسات.

التطعيم في مرحلة المراهقة:

بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما والذين لم يسبق لهم ان تعرضوا للمرض ولم يتم تطعيمهم مسبقا، يجب إعطاؤهم جرعتين من لقاح جدري الماء مفصولة بفاصل زمني لا يقل عن 4 أسابيع بين الجرعات (يفضل 8 أسابيع) أو يجب إكمال الجدول الزمني إذا تم تلقي جرعة واحدة فقط سابقا.

التطعيم عند البالغين:

بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دليل على المناعة ضد جدري الماء في السكان البالغين * سيتم الإجراء عليهم التحديد المصلي (IgG). في حالة الأمصال السلبية، يجب إعطاء جرعتين من لقاح جدري الماء مفصولة بفاصل زمني لا يقل عن 4 أسابيع (يفضل 8 أسابيع). وان الحصول المسبق على جرعتين من اللقاح هو مرادف للمناعة. * معايير الأدلة للمناعة ضد جدري الماء بالنسبة للسكان البالغين: توثيق التطعيم مع جرعتين أو سوابق جدري الماء، أو تاريخ الهربس النطاقي أو التأكيد المصلي (IgG الإيجابية). هذا التطعيم غير مناسب بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين الأجهزة المناعية المنقوصة.

6. فيروس الورم الحليمي البشري

التطعيم في سن 12 (كلا الجنسين، مواليد من 2011):

يجب إعطاء جرعتين على الأقل كل 6 أشهر على حدة.

التطعيم بعد سن 12 وحتى سن 18:

تطعيم النساء غير الملقحات سابقا أو الملقحات جزئيا. إذا بدأ التطعيم من سن 15 عاما، إعطاء 3 جرعات بجدول زمني من 0 أشهر، شهر، شهرين و6 أشهر (حسب اللقاح المستخدم). سيتم الانتهاء من الجدول الزمني بناء على العمر الذي تم فيه إعطاء الجرعة الأولى.

7. الانفلونزا

قبل الولادة:

في موسم الأنفلونزا، سيتم تطعيم النساء الحوامل في أي ثلاثي من فترة الحمل.

تطعيم خلال فترة الطفولة:

يوصى بالتطعيم بجرعة واحدة خلال الحملة السنوية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا.

التطعيم عند كبار السن:

يوصى بالتطعيم بجرعة واحدة خلال الحملة السنوية لمن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر.

8. الهربس النطاقي

يتم تطعيم جرعتين كل شهرين على حدة.

مختصرات

HB: لقاح التهاب الكبد ب

DTPa: لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي مع حمولة مستضدية عالية

dTPa: لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي مع حمولة مستضدية منخفضة

Td: لقاح ضد الكزاز والدفتيريا

VPI: لقاح ضد شلل الأطفال

Hib: لقاح ضد مرض المستدمية النزلية ب

VNC: لقاح ضد مرض المكورات الرئوية المقترن

Men C: لقاح مقترن ضد مرض المكورات السحائية من المجموعة المصلية س

Men B: لقاح مقترن ضد مرض المكورات السحائية من المجموعة المصلية ب

Men ACWY: لقاح مقترن ضد مرض المكورات السحائية بواسطة المجموعات المصلية أ،س ، و، ي

SRP: لقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (لقاح رباعي الفيروسات)

VVZ: لقاح ضد جدري الماء

VPH: لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري

Flu: لقاح ضد الإنفلونزا

Flu Annual: الانفلونزا السنوية

HZ: لقاح ضد الهربس النطاقي