



接种疫苗类型

Castilla-La Mancha

	出生前	2月龄	4月龄	6月龄	11月龄	12月龄	15月龄	4岁	5岁	6岁	12岁	14岁	19 -64岁	≥ 60岁	65岁	80岁
乙型肝炎 ¹		HB	HB		HB											
白喉，破伤风百日咳 ²	dTpa	DTPa	DTPa		DTPa					DTPa		Td	Td		Td	
脊髓灰质炎		VPI	VPI		VPI					VPI						
B型（乙型）流感嗜血杆菌		Hib	Hib		Hib											
肺炎球菌疾病		VNC	VNC		VNC										VNC	
脑膜炎球菌疾病 ³		MenB	MenB MenC			MenB MenC					Men ACWY					
麻疹，风疹 y 腮腺炎 ⁴						SRP		SRP					SRP			
水痘 ⁵							VVZ	VVZ			VVZ		VVZ			
人乳头瘤病毒 ⁶											VPH					
流感 ⁷	Flu			Flu annual										Flu annual		
带状疱疹 ⁸															HZ	HZ

按计划实施接种

面向抵抗力弱的易感人群或者之前没有接种过疫苗的人群实施接种

注解

1. 乙型肝炎

婴幼儿和儿童的疫苗接种:

按照“0-2-4-11个月”程序对乙肝病毒表面抗原（AgHBs）阳性以及未经筛查也未接种疫苗的产妇所生育的子女实施接种。第1剂在新生儿出生后24小时内接种，同时注射抗乙肝免疫球蛋白。

青、少年的疫苗接种:

对18岁之前从未接种过该疫苗者，按照“0-1-6个月”程序分三剂次接种。

2. 白喉，破伤风，百日咳

出生前 (dTpa):

每次怀孕期间接种一剂，从妊娠第27周即可开始接种，最好在27周或者28周。

成人的疫苗接种 (Td):

在对成年人开始实施或完成Td疫苗的全程接种程序之前需核实其前期疫苗接种情况。联系医疗中心，包括职业风险预防中心以便检查疫苗接种情况，如有需要则接种Td疫苗直至完成5剂次。对于在儿童和少年时期已经接种过5剂次疫苗的人群，到65岁左右时补种一剂Td。

6岁龄联合疫苗DTPa/VPI:

在2月，4月和11月龄时接种过的孩子年满6岁时要接种DTPa/VPI疫苗。按照“2-4-6-18个月”程序完成全程接种（共4剂）的孩子年满6岁时要接种不含VPI 疫苗成分的dTpa疫苗。

3. 脑膜炎球菌疾病（2023以后出生的）

建议接种预防B群脑膜炎球菌疾病疫苗，注意应与其他该年龄需要接种的灭活疫苗保持1或2周的间隔，以减少同时接种可能产生的不良反应。在2月龄和4月龄时按时接种是非常重要的。

4. 麻疹，风疹和腮腺炎

四岁龄疫苗剂次，为便于同水痘疫苗联合接种，可使用麻风腮及水痘四联疫苗。

成人的疫苗接种:

通过联系医疗中心，包括职业风险预防中心，来检查疫苗接种的情况。建议对1970年以后在西班牙出生却无疫苗接种史的人群进行接种。如有需要，分两剂次接种TV疫苗，两剂间隔至少4周。如果之前曾接种过1剂次则只需补种1剂TV疫苗。不建议孕妇以及免疫力低下人群接种。

5. 水痘

4岁龄疫苗剂次，为便于同麻疹，风疹和腮腺炎疫苗联合接种，可使用麻风腮及水痘四联疫苗。

青少年的疫苗接种：

满12岁没有出过水痘且未曾接种过该疫苗的孩子，分2剂次接种预防水痘疫苗，两剂间隔至少4周(最好8周)或者对于曾经接种过一剂次疫苗的孩子只需补种一剂次完成全程接种。

成人的疫苗接种：

对没有证据表明具有水痘免疫的成年人* 要进行血清学测定(IgG)。如果血清学检测结果呈阴性则接种两剂次预防水痘疫苗，间隔至少4周(最好8周)。先前已经接受过两剂次疫苗接种等同于具备免疫。

* 判断成年人是否具有水痘免疫证据的标准如下：完成两剂次疫苗接种的证明性文件，水痘患病史， 带状疱疹患病史，或通过血清检测确认 (IgG 阳性)。

不建议孕妇和免疫低下人群接种。

6. 人乳头瘤病毒

满12岁接种疫苗 (2011以后出生，男女都包括)：

分2剂次接种，间隔至少6个月。

12岁以后至年满18岁接种疫苗：

仅对未曾接种或曾部分接种过的女性进行。如果疫苗接种从15岁开始，则分3剂次按照 “0-1-2-6个月” 程序进行 (根据所使用的疫苗)。依照第1剂疫苗的接种年龄来完成全程接种。

7. 流感

出生前：

流感季为孕妇接种，可在妊娠的任一阶段进行。

婴幼儿和儿童的疫苗接种：

建议6到59个月的孩子每年接种一剂。

老年人的疫苗接种：

建议60岁及60岁以上人群每年接种一剂。

8. 带状疱疹

分两剂次进行接种，间隔2个月。

缩略语

- HB:** 乙型肝炎疫苗
- DTPa:** 高抗元负荷无细胞白喉，破伤风和百日咳联合疫苗
- dTPa:** 低抗元负荷无细胞白喉，破伤风和百日咳联合疫苗
- Td:** 破伤风和白喉联合疫苗
- VPI:** 脊髓灰质炎疫苗
- Hib:** 预防乙型流感嗜血杆菌疾病疫苗
- VNC:** 预防肺炎球菌病结合疫苗
- Men C:** 预防C群脑膜炎球菌病结合疫苗
- Men B:** 预防B群脑膜炎球菌病结合疫苗
- Men ACWY:** A，C，W和Y群脑膜炎球菌病结合疫苗
- SRP:** 麻疹，风疹和腮腺炎联合疫苗（麻风腮三联疫苗）
- VVZ:** 水痘疫苗
- VPH:** 人乳头瘤病毒疫苗
- Flu:** 流感疫苗
- Flu annual:** 每年一次
- HZ:** 带状疱疹疫苗