



VACCINARE

Castilla-La Mancha

	Prenatal	2 luni	4 luni	6 luni	11 luni	12 luni	15 luni	4 ani	5 ani	6 ani	12 ani	14 ani	19 – 64 ani	≥ 60 ani	65 ani	80 ani
Hepatită B ¹		HB	HB		HB											
Difterie, Tetanos, Tuse convulsiva ²	dTpa	DTPa	DTPa		DTPa					DTPa		Td	Td		Td	
Poliomielită		VPI	VPI		VPI					VPI						
Haemophilus Influenzae tip b		Hib	Hib		Hib											
Boală pneumococică		VNC	VNC		VNC										VNC	
Boală meningococică ³		MenB	MenB MenC			MenB MenC					Men ACWY					
Pojar, Rubeolă și Parotidită ⁴						SRP		SRP					SRP			
Varicelă ⁵							VVZ	VVZ			VVZ		VVZ			
Papiloma virus ⁶											VPH					
Gripă ⁷	Flu			Flu annual										Flu annual		
Herpes Zoster ⁸															HZ	HZ



Administrare sistematică

Administrare persoanelor predispuse unui eventual risc de îmbolnăvire sau care nu au fost vaccinate anterior

Descriere

1. Hepatită B

Vaccinare în copilărie:

Vor fi vaccinați la 0, 2, 4 și 11 luni, copiii mamelor cu AgHBs pozitiv și a celor nevaccinate, la care nu s-au efectuat testele de selecție. Prima doză se va administra în primele 24 de ore de viață, împreună cu imunoglobulina anti-HB.

Vaccinarea la adolescenți și tineri:

La persoanele de până la 18 ani, nevaccinate anterior, se vor administra trei doze, conform schemei 0, 1 și 6 luni.

2. Difterie, Tetanos, Tuse convulsivă

Prenatal (dTpa):

O doză de dTpa la fiecare sarcină, după săptămâna 27 de sarcină, de preferat în săptămâna 27 sau 28.

Vaccinarea la persoanele adulte (Td):

A se verifica vaccinarea anterioară, înainte de a începe sau completa schema primei vaccinări cu Td la adulți. Contactul cu serviciile sanitare, inclusiv cu cele de prevenire a riscurilor la locul de muncă, se va folosi pentru a analiza situația vaccinării și, dacă este nevoie, se va administra vaccinul cu Td, până se vor completa 5 doze. Se va administra o doză cu Td, în jur de 65 de ani, persoanelor care au primit 5 doze în copilărie și adolescență.

Vaccinul combinat DTPa/VPI, la 6 ani:

Se va administra vaccinul combinat DTPa/VPI, minorilor vaccinați la 2,4 și 11 luni, când ajung la vârsta de 6 ani. Cei care au completat schema de vaccinare la 2,4,6 și 18 luni (4 doze în total) vor primi dTpa fără VPI la 6 ani.

3. Boală meningococică (născuți după 2023)

Se recomandă administrarea vaccinului împotriva bolii meningococice din grupul B, respectând un interval de 1 sau 2 săptămâni față de celelalte vaccinuri inactivate, indicate pentru acea vârstă, pentru a minimiza posibilele reacții adverse comune ale administrării ambelor. Este important să se administreze la vârsta de 2 și 4 luni.

4. Pojar, Rubeolă și Parotidită

La doza de la vârsta de 4 ani, pentru a ușura administrarea comună cu varicela, se poate folosi vaccinul tetraviric.

Vaccinarea la adulți:

Se va folosi contactul cu serviciile sanitare, inclusiv cu cele de prevenire a riscurilor la locul de muncă, pentru a analiza situația vaccinării. Se recomandă vaccinarea persoanelor fără documente doveditoare, privitoare la vaccinare, născute în Spania, după anul 1970. Dacă este necesar, se vor administra 2 doze cu TV, la un interval minim de 4 săptămâni între doze. Dacă s-a primit o doză anterior, se va administra doar o doză cu TV. Este contraindicată vaccinarea femeilor însărcinate și a persoanelor cu sistemul imunitar deficitar.

5. Varicelă

La doza de la vârsta de 4 ani, pentru a ușura administrarea comună cu pojarul, rubeola și paratidita, se va putea folosi vaccinul tetraviric.

Vaccinarea în adolescență:

Persoanelor care la vârsta de 12 ani nu au antecedente de a fi trecut prin boală și nu s-au vaccinat, li se vor administra 2 doze din vaccinul împotriva varicelei, separate printr-un interval minim de 4 săptămâni (de preferat, de 8 săptămâni) sau se va completa schema, dacă înainte s-a primit doar o doză.

Vaccinarea la persoanele adulte:

La persoanele la care nu există evidența de imunitate la varicelă, în cadrul populației adulte*, se va realiza detectarea serologică (IgG). În cazul serologiei negative, se vor administra 2 doze împotriva varicelei, separate printr-un interval minim de 4 săptămâni (de preferat, de 8 săptămâni). Primirea anterioară a două doze din vaccin este sinonimă cu imunitatea.

* Criterii care evidențiază imunitatea față de varicelă, la populația adultă: documente referitoare la vaccinarea cu două doze, antecedente de varicelă, istoric referitor la herpes zoster sau confirmare serologică (IgG pozitivă).

Este contraindicată vaccinarea femeilor însărcinate și a persoanelor cu sistemul imunitar deficitar.

6. Papiloma virus

Vaccinarea la împlinirea vârstei de 12 ani (ambele sexe, născuți după 2011):

Se vor administra 2 doze, la un interval minim de 6 luni.

Vaccinare între 12 și 18 ani:

A se vaccina doar femeile nevaccinate sau vaccinate anterior, parțial. Dacă vaccinarea începe de la 15 ani, se vor administra 3 doze, conform schemei 0, 1-2, 6 luni (în funcție de vaccinul folosit). Se va completa schema, în funcție de vârsta primei doze.

7. Gripă

Prenatal:

În perioada gripei, femeile însărcinate se vor vaccina în orice trimestru al sarcinii.

Vaccinare în copilărie:

Se recomandă vaccinarea cu o doză, în perioada campaniei anuale, pentru cei cu vârsta cuprinsă între 6 și 59 luni.

Vaccinarea adulților:

Se recomandă vaccinarea cu o doză, în perioada campaniei anuale, pentru cei cu vârsta egală sau superioară celei de 60 de ani.

8. Herpes Zoster

Se vor administra 2 doze, la un interval de 2 luni.

Abreviaturi

HB: Vaccin împotriva hepatitei B

DTPa: Vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, acelulare, cu conținut crescut de antigeni

dTPa: Vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, acelulare, cu conținut scăzut de antigeni

Td: Vaccin împotriva tetanosului și a difteriei

VPI: Vaccin împotriva poliomielitei

Hib: Vaccin împotriva îmbolnăvirii cu haemophilus influenzae b

VNC: Vaccin conjugat împotriva bolii pneumococice

Men C: Vaccin conjugat împotriva bolii meningococice din grupul C

Men B: Vaccin conjugat împotriva bolii meningococice din grupul B

Men ACWY: Vaccin conjugat împotriva bolii meningococice din grupele A, C, W și Y

SRP: Vaccin împotriva pojarului, rubeolei și paritiditei (triplu viric)

VVZ: Vaccinul împotriva varicelei

VPH: Vaccinul împotriva virusului papiloma

Flu: Vaccinul împotriva gripei

Flu annual: Gripă anuală

HZ: Vaccinul împotriva herpesului zoster