



Castilla-La Mancha

Вакцинация

	Доро- довая	2 месяца	4 месяца	6 месяцев	11 месяцев	12 месяцев	15 месяцев	4 года	5 лет	6 лет	12 лет	14 лет	19–64 года	≥ 60 лет	65 лет	80 лет
Гепатит В ¹		HB	HB		HB											
Дифтерия, столбняк Коклюш ²	dTpa	DTPa	DTPa		DTPa					DTPa		Td	Td		Td	
Полиомиелит		VPI	VPI		VPI					VPI						
Гемофильная инфекция типа В		Hib	Hib		Hib											
Пневмококковая инфекция		VNC	VNC		VNC										VNC	
Менингококковая инфекция ³		MenB	MenB MenC			MenB MenC					Men ACWY					
Корь, краснуха и паротит ⁴						SRP		SRP					SRP			
Ветряная оспа ⁵							VVZ	VVZ			VVZ		VVZ			
Вирус папилломы человека ⁶											VPH					
Грипп ⁷	Flu			Flu annual										Flu annual		
Опоясывающий герпес ⁸															HZ	HZ



Систематическое введение

Введение восприимчивым или ранее не вакцинированным лицам

Условные обозначения

1. Гепатит В

Вакцинация детей:

Прививаются дети, родившиеся у матерей с положительным AgHBs, а также у непривитых матерей, не проходивших скрининг, при рождении, а затем через 2, 4 и 11 месяцев. Первая доза вводится в первые 24 часа жизни вместе с иммуноглобулином anti-HB.

Вакцинация подростков и молодежи:

Лицам в возрасте до 18 лет, не привитым ранее, вводятся три дозы, при этом вторая и третья — соответственно через 1 и 6 месяцев после первой.

2. Дифтерия, столбняк, коклюш

Пренатальная (dTpa):

Одна доза dTpa при каждой беременности начиная с 27-й недели гестации, предпочтительно на 27-й или 28-й неделе.

Вакцинация взрослых (Td):

Перед тем как начинать или завершать цикл введения первичной вакцины Td взрослому человеку, следует проверить состояние его предыдущей вакцинации. Эта проверка производится путем обращения в службы здравоохранения, включая службы профилактики производственных рисков, после чего, в случае необходимости, производится вакцинация Td с введением полного курса в количестве 5 доз. Лицам в возрасте около 65 лет, привитым 5 дозами в детском и подростковом возрасте, вводится одна доза Td.

Комбинированная вакцина DTPa/VPI в возрасте 6 лет:

Детям, привитым в возрасте 2, 4 и 11 месяцев, по достижении возраста 6 лет вводится комбинированная прививка DTPa/VPI. Тем детям, которые были привиты в 2, 4, 6 и 18 месяцев (всего 4 дозами), по достижении возраста 6 лет вводится dTpa без VPI.

3. Менингококковая инфекция (родившиеся начиная с 2023 года)

Рекомендуется делать прививку от менингококковой инфекции серогруппы B, соблюдая временной интервал 1–2 недели после других инактивированных вакцин, показанных для введения в том же возрасте, с целью свести к минимуму возможную реактогенность одновременного введения. Важно провести данную вакцинацию своевременно, в возрасте 2 и 4 месяцев.

4. Корь, краснуха и паротит

В возрасте 4 лет можно производить комбинированную прививку против четырех вирусных инфекций, чтобы одновременно обеспечить защиту от ветряной оспы.

Вакцинация взрослых:

Следует проверить состояние вакцинации путем обращения в службы здравоохранения, включая службы профилактики производственных рисков. Рекомендуется прививать людей, родившихся в Испании начиная с 1970 года и не имеющих официальной справки о прививках. В случае необходимости вводятся 2 дозы TV с минимальным интервалом в 4 недели между дозами. В том случае, если ранее уже была введена одна доза, вводится только одна доза TV. Прививка противопоказана беременным женщинам и иммунокомпрометированным людям.

5. Ветряная оспа

В возрасте 4 лет можно производить комбинированную прививку против четырех вирусных инфекций, чтобы одновременно обеспечить защиту от кори, краснухи и паротита.

Вакцинация подростков:

Лицам, которые в возрасте 12 лет сообщают, что не перенесли данное заболевание и не были от него привиты, вводятся 2 дозы прививки от ветряной оспы, разделенные интервалом не менее 4 недель (предпочтительно 8 недель). В том случае, если ранее уже была введена одна доза, следует дополнить вакцинацию соответствующим образом.

Вакцинация взрослых:

Для взрослых*, не имеющих подтвержденного иммунитета к ветряной оспе, проводится серологический анализ (IgG). В случае отрицательного результата вводятся 2 дозы прививки от ветряной оспы, разделенные интервалом не менее 4 недель (предпочтительно 8 недель). Если ранее были введены 2 дозы прививки, то это является подтверждением иммунитета.

* Критерии подтверждения иммунитета к ветряной оспе у взрослых: документальное подтверждение введения двух доз прививки; либо перенесенные заболевания: ветряная оспа или опоясывающий герпес; либо серологическое подтверждение (положительный IgG).

Прививка противопоказана беременным женщинам и иммунокомпромиссным людям.

6. Вирус папилломы человека

Вакцинация по достижении возраста 12 лет (лица обоих полов, родившиеся начиная с 2011 года)):

Вводятся 2 дозы с интервалом не менее 6 месяцев.

Вакцинация после 12 и до 18 лет:

Следует прививать только женщин, которые ранее не были вакцинированы или были частично вакцинированы. Если вакцинация производится начиная с возраста 15 лет, вводятся 3 дозы с интервалом 1–2 и 6 месяцев (в зависимости от используемой вакцины). Схема введения прививки составляется в зависимости от возраста, в котором была введена первая доза.

7. Грипп

Пренатальная:

В сезон повышенной заболеваемости гриппом прививка делается беременным женщинам на любом сроке беременности.

Вакцинация детей:

Рекомендуется введение одной дозы прививки во время ежегодной кампании детям в возрасте от 6 до 59 месяцев.

Вакцинация лиц старшего возраста:

Рекомендуется введение одной дозы прививки во время ежегодной кампании людям в возрасте от 60 лет и старше.

8. Опоясывающий герпес

Вводятся 2 дозы с интервалом 2 месяца.

Сокращения

HB: Вакцина от гепатита В

DTPa: Вакцина от дифтерии, столбняка и бесклеточного коклюша с высокой антигенной нагрузкой

dTPa: Вакцина от дифтерии, столбняка и бесклеточного коклюша с низкой антигенной нагрузкой

Td: Вакцина от столбняка и дифтерии

VPI: Вакцина от полиомиелита

Hib: Вакцина от гемофильной инфекции типа В

VNC: Конъюгатная вакцина от пневмококковой инфекции

Men C: Конъюгатная вакцина от менингококковой инфекции серогруппы С

Men B: Конъюгатная вакцина от менингококковой инфекции серогруппы В

Men ACWY: Конъюгатная вакцина от менингококковой инфекции серогрупп А, С, W и Y

SRP: Вакцина от кори, краснухи и паротита (тройная вирусная)

VVZ: Вакцина от ветряной оспы

VPH: Вакцина от вируса папилломы человека

Flu: Вакцина от гриппа

Flu annual: Ежегодный грипп

HZ: Вакцина от опоясывающего герпеса