

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/32989422>

Ingestion des microfilaires par le vecteur dans le cas des basses microfilarémies

Article in *Annales de parasitologie humaine et comparée* · January 1981

DOI: 10.1051/parasite/1982571073 · Source: OAI

CITATION

1

READS

14

2 authors, including:



Gaston Pichon

Institute of Research for Development

129 PUBLICATIONS 608 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Influence of environment on fish stock assessment [View project](#)



Influence of environment on stock assessment [View project](#)



INGESTION DES MICROFILAIRES PAR LE VECTEUR DANS LE CAS DES BASSES MICROFILAREMIES (1)

G. PETIT* et G. PICHON**

RÉSUMÉ. L'étude de l'ingestion des microfilaires de *Dipetalonema dessetae* par *Aedes aegypti* permet de tirer deux conclusions.

Quelle que soit la microfilariémie :

— il n'y a pas de concentration des microfilaires lors de l'ingestion par l'*Aedes*.

— les microfilaires sont réparties d'une façon quasi-homogène dans le sang de l'hôte vertébré accessible à la piqure par le vecteur.

Une telle répartition des microfilaires dans le sang cutané de l'hôte donne le maximum de chances à un moustique de s'infecter lors du repas sanguin.

Dans le couple *Wuchereria bancrofti* — *Aedes polynesiensis*, le pouvoir infectant des individus peu microfilariens paraît résulter du phénomène de limitation.

Intake of microfilariae by the vector in the case of a low microfilareamia.

SUMMARY. The study of the intake of microfilariae of *Dipetalonema dessetae* by *Aedes aegypti* leads to two conclusions with respect to the microfilareamia :

— there is no concentration of microfilariae in the uptake of blood by *Aedes*.

— the microfilariae are nearly homogeneously distributed in the vertebrate host blood available to the vector for feeding.

Such a distribution of microfilariae in the cutaneous blood supply of the host gives the maximum chance for a mosquito to become infected when taking a blood meal.

In the pair *Wuchereria bancrofti* — *Aedes polynesiensis* the capacity of individuals with a low microfilareamia to transmit infections seems to be related to a limitation phenomenon.

Introduction

Les traitements de masse à la diethylcarbazine des foyers de filariose lymphatique humaine laissent persister de très faibles taux de microfilaires dans le sang de certains individus traités ; ceux-ci semblent capables d'assurer le maintien du foyer.

* Laboratoire de Zoologie (Vers), associé au CNRS, Muséum national d'Histoire naturelle, 61, rue Buffon F 75231 Paris Cedex 05.

** ORSTOM, 50-74 route d'Aulnay, F 93140 Bondy.

Adresse actuelle : Laboratoire d'épidémiologie de la D.D.A.S.S., 8 rue J. Chatel, 97400 St-Denis (La Réunion).

(1) Ce travail a été effectué grâce à une subvention de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Accepté le 11 septembre 1981.

O.R.S.T.O.M. Fonds Documentaire
N° : 1388 ex 1
Cote : B

Date : 19 MAI 1982

Plusieurs auteurs ont envisagé l'existence d'une concentration des microfilaires dans le cas des faibles microfilariémies pour expliquer ce phénomène (Bryan J. H. et Southgate B. A., 1976 ; Samarawickrema W. A. *et al.*, 1979).

A l'aide de la filaire de rongeur *Dipetalonema dessetae* Bain, 1973, transmise expérimentalement par *Aedes aegypti*, nous recherchons l'existence d'une telle concentration en comparant l'ingestion des microfilaires dans le cas des basses microfilariémies et des fortes microfilariémies. Deux aspects principaux de l'ingestion semblent importants à étudier :

- le nombre moyen de microfilaires ingérées : comparaison entre le nombre moyen attendu et le nombre moyen observé ;
- la distribution des microfilaires dans le sang cutané de l'hôte vertébré et son influence sur le pourcentage de moustiques qui s'infecte lors de l'ingestion,

Les résultats de cinq expériences sont analysés (*tableaux I et II*). Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- Obtention des fortes microfilariémies par injection *sous-cutanée* de 50 stades infestants de *D. dessetae* à des *Proechimys* sains (expériences 21 GK, 35 GK et 37 GK).
- Obtention des faibles microfilariémies par injection intrapéritonéale de sang d'un *Proechimys* très infesté à des *Proechimys* sains, (expériences 39 GK et 44 GK).
- Mesure de la microfilariémie sur un prélèvement de 0,1 ml de sang au sinus de l'œil du rongeur avant chaque gorgement (dans le *tableau I*, la microfilariémie mesurée est rapportée à un volume de 1 ml de sang).
- Gorgement à réplétion des *Aedes* sur la peau abdominale du rongeur pendant le plateau diurne de microfilariémie maximale ; seuls les moustiques de même taille ayant ingéré un volume maximum de sang sont disséqués pour dénombrer les microfilaires intrastomacales (les moustiques sont placés à 0° C juste après le gorgement pour éviter que les microfilaires passent dans l'hémocèle).

A — *Nombre moyen de microfilaires ingérées : comparaison entre le nombre moyen attendu et le nombre moyen observé (Tableau I, colonnes 3, 4, 5)*

— Le nombre moyen attendu de microfilaires ingérées par *Aedes* est calculé en fonction de la densité microfilarienne au sinus de l'œil en estimant que chaque *Aedes* ingère 4,5 mm³ de sang (Petit, sous presse).

— Dans le cas des fortes densités microfilariennes (expériences 21 GK, 35 GK, 37 GK), le rapport $\frac{\text{nombre moyen observé}}{\text{nombre moyen attendu}}$ varie entre 1,09 et 1,13 ; dans le cas des faibles densités microfilariennes, il est égal à 1,25 (expérience 39 GK) et 1,51 (expérience 44 GK).

— Ce rapport ne varie pas significativement en fonction de la densité microfilarienne et ne met donc pas en évidence un phénomène de concentration des microfilaires dans le cas des faibles microfilariémies étudiées ici.

TABLEAU I. — Ingestion des microfilaires de *Dipetalonema dessetae* par *Aedes aegypti* en fonction de la densité des microfilaires dans le sang du *Proechimys*.

Exp. n°	Nb de mf pour 1 ml de sang au sinus de l'œil	Nb moyen de microfilaires ingérées par <i>Aedes</i>		Rapport Nb observé attendu	$k_1 = \frac{\overline{X}^2}{S^2 - \overline{X}}$	% de moustiques infestés	Nb d' <i>Aedes</i>	Test de conformité	
		Attendu	Observé*					Poisson	BN- k = 8,25
37 GK	82 100	369	416 ± 25	1,09	9,71	100	110 ♀	S	NS
35 GK	9 750	43,8	47,8 ± 3,5	1,13	7,04	100	115 ♀	S	NS
21 GK	336	15,12	16,5 ± 1,7	1,09	11,72	100	50 ♀	S	NS
39 GK	190	0,87	1,31 ± 0,25	1,51	—	22,57	70 ♀	NS	NS
44 GK	150	0,66	0,84 ± 0,19	1,25	—	57,95	88 ♀	NS	NS

Nb = nombre ; mf : microfilarie ; k_1 = coefficient d'agrégation calculé suivant la méthode des moments ; S = Test significatif ; NS = Test non significatif ; BN- = binomiale négative ; S^2 = variance ; \overline{X} = moyenne arithmétique.

* : l'erreur standard est indiquée.

TABLEAU II. — Distribution observée des microfilaires ingérées par *Aedes aegypti* sur 2 *Proechimys* peu infestés par *D. dessetae* (expériences 39 GK et 44 GK) ; Comparaison aux fréquences calculées pour différents degrés d'agrégation et pour une même moyenne (les accolades indiquent les regroupements effectués pour les calculs de χ^2).

	Nb de mf par <i>Aedes</i>	Nombre d' <i>Aedes</i>			
		Observés	k = 1	k = 8,25	Poisson
Exp. 39 GK N = 70	0	15	30,25	20,68	18,81
	1	29	17,18	23,44	24,72
	2	19	9,75	14,90	16,24
	3	5	5,54	6,99	7,12
	4	—	3,15	2,70	2,34
	5	2	4,13	0,29	0,78
χ^2			28,43	7,82	3,02
P (χ^2)			10 ⁻⁵	0,10	0,55
Test de conformité			S	NS	NS
Exp. 44 GK N = 88	0	37	47,80	39,51	37,96
	1	34	21,84	30,15	31,92
	2	11	9,97	12,90	13,42
	3	6	4,56	4,08	3,76
			3,67	1,36	0,95
χ^2			82,04	0,99	0,95
P (χ^2)			0,01	0,80	0,81
Test de conformité			S	NS	NS

N : nombre d'*Aedes*, P : probabilité.

B — *Distribution des Aedes en fonction du nombre de microfilaires ingérées : relation entre le coefficient d'agrégation k et la densité microfilarienne dans le sang de l'hôte vertébré.*

a — Analyse des distributions observées

— Dans le cas des fortes microfilariémies, ces distributions se rapprochent de la distribution homogène de type poissonnien (tableau I, colonne 6) (voir Petit, sous presse) ; en effet, le coefficient d'agrégation k a des valeurs élevées, qui peuvent dépasser 10. Pour les expériences 37 GK, 35 GK, 21 GK, où le coefficient k est calculable, la valeur commune de k la plus probable (méthode du maximum de vraisemblance) est 8,25.

— Dans le cas des faibles microfilarémies (expériences 39 GK et 44 GK) (*tableaux I et II*), le coefficient k n'est pas calculable, mais les distributions observées se rapprochent également du modèle poissonnien ; en effet, le rapport $\frac{S^2}{\bar{X}}$ ne diffère pas

significativement de 1 (Test de Bliss et Fisher, 1953). Ces deux distributions sont également compatibles avec une loi binomiale négative de coefficient $k = 8,25$.

— Lorsque chaque *Aedes* ingère un même volume de sang, la distribution des *Aedes* en fonction du nombre de microfilaraires ingérées donne l'image de la distribution des microfilaraires dans le sang de l'hôte accessible à la piqure du vecteur. Nous pouvons donc conclure ici que la distribution des microfilaraires dans le sang cutané du rongeur, de type quasi-homogène dans le cas des fortes microfilarémies, l'est aussi dans le cas des faibles microfilarémies.

b — Influence théorique du degré d'agrégation k sur le pourcentage d'*Aedes* infestés.

Grâce à la formule donnant la proportion d'individus négatifs d'une loi binomiale négative (Bliss et Fisher, 1953 ; cf. aussi Pichon *et al.*, 1980b, équation 1, et Cabaret, sous presse), on peut calculer le pourcentage théorique P d'*Aedes* qui s'infectent, en fonction du nombre moyen \bar{X} de parasites ingérés et pour différentes

valeurs du coefficient d'agrégation k : $P = [1 - \left\{ \frac{k}{k + \bar{X}} \right\}^k] \times 100$.

— Dans le cas des fortes moyennes de microfilaraires ingérées (exemple de l'expérience 37 GK) :

si $k = 0,5$, 96,5 % des *Aedes* sont infestés ;

si $k = 1$, 99,8 % — — ;

si $k = 8,25$, 100 % — — (pourcentage observé = 100 %).

— Dans le cas des faibles moyennes de microfilaraires ingérées (exemple de l'expérience 44 GK) :

si $k = 0,5$, 38,9 % des *Aedes* sont infestés ;

si $k = 3$, 52,3 % — — ;

si $k = 8,25$, 55,1 % — — ;

si la distribution est poissonnienne, 56,8 % des *Aedes* sont infestés (% observé : 57,9).

Pour une telle moyenne de microfilaraires ingérées, une distribution homogène des microfilaraires permet d'infecter nettement plus de moustiques qu'une distribution surdispersée (56,8 % contre 38,9 % quand $k = 0,5$).

— Pour des moyennes de microfilaraires ingérées encore plus basses, seule l'approche théorique est possible. En effet, plusieurs centaines de moustiques gorgés sont nécessaires pour avoir une bonne approche du nombre moyen de microfilaraires ingérées et pour étudier les distributions ; mais, la petite taille du rongeur (350 g à l'état adulte) ne permet pas une telle expérimentation.

Dans cette approche théorique, les chiffres obtenus sont les suivants, pour une moyenne de microfilaraires ingérées par *Aedes* égale à 0,1 :

si $k = 0,01$, 2,4 % des *Aedes* sont infestés ;
 si $k = 0,5$, 8,7 % — — ;
 si $k = 8,25$, 9,5 % — — ;
 si la distribution est poissonnienne, 9,5 % des *Aedes* sont infestés.

Conclusion

Pour les fortes densités microfilariennes, ainsi que pour les faibles densités que nous étudions particulièrement ici, la filaire *D. dessetae* se caractérise par :

- l'absence de tout phénomène de concentration des microfilaires lors de l'ingestion par *Aedes aegypti* ;
- une distribution quasi-homogène des microfilaires dans le sang de l'hôte vertébré accessible à la piqûre par le vecteur.

Ce type de répartition des microfilaires s'oppose aux distributions surdispersées observées généralement, dont le paramètre d'agrégation k est voisin de 1 (loi géométrique : Pichon *et al.*, 1980a). Celles-ci nous semblent résulter des variations de la quantité de sang ingéré par le vecteur (Petit, sous presse).

Une telle distribution des microfilaires dans le sang cutané de l'hôte vertébré donne le maximum de chances au vecteur de s'infecter lors de la piqûre.

Le phénomène de concentration envisagé par Bryan J. H. et Southgate B. A., 1976, Samarawickrema W. A. *et al.*, 1979, paraît correspondre à l'expression du phénomène de limitation (Bain, 1971), qui existe dans le couple *Wuchereria bancrofti* — *Aedes polynesiensis* (Pichon, 1974a, b ; Prod'hon *et al.*, 1980b) ; dans le couple *W. bancrofti* — *Aedes samoanus*, qui ne présente pas cette limitation, aucun phénomène de concentration n'est mis en évidence.

BIBLIOGRAPHIE

- BAIN O. : Transmission des Filarioses. Limitation des passages des microfilaires ingérées vers l'hémocèle du vecteur ; interprétation. *Ann. Parasitol. Hum. Comp.*, 1971, 46, 613-631.
- BLISS C. I., FISHER R. A. : Fitting the negative binomial distribution to biological data. *Biometrics*, 1953, 9, 176-200.
- BRYAN J. H., SOUTHGATE B. A. : Some observations in filariasis in Western Samoa after mass administration of diethylcarbamazine. *Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg.*, 1976, 70, 39-48.
- CABARET J. : Les critères de réceptivité à l'infestation par les Protostrongylidés chez les Mollusques. Étude comparée dans les conditions expérimentales et naturelles. *Ann. Parasitol. Hum. Comp.* (sous presse).
- PETIT G. : Ingestion des microfilaires par le vecteur dans le cas d'une Filaire périodique *Dipetalonema dessetae*. *Ann. Parasitol. Hum. Comp.*, (sous presse).
- PICHON G. : Relations numériques entre le nombre de microfilaires ingérées et le nombre de parasites chez différents vecteurs naturels ou expérimentaux de filarioses. *Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasitol.*, 1974b, 12, 199-216.
- PICHON G., PROD'HON J., RIVIÈRE F. : Hétérogénéité de l'ingestion des parasites sanguicoles par leurs vecteurs : description quantitative et interprétation. *C. R. Acad. Sc. Paris*, 1980a, 290, 1011-1013.
- PICHON G., PROD'HON J., RIVIÈRE F. : Filarioses : surdispersion parasitaire et surinfection de l'hôte vertébré. *Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasitol.*, 1980b, 18, 24-47.
- PROD'HON J., PICHON G., RIVIÈRE F. : Étude quantitative de la réduction parasitaire stomacale chez les vecteurs de filaires. *Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasitol.*, 1980b, 18, 13-25.
- SAMARAWICKREMA W. A., POLASONE, KAZUYOICHIMORI, CUMINGS R. F. : Filariasis in Western Samoa. I. Transmission studies of *Aedes (Stegomyia) polynesiensis* (Marks) and *Aedes (Finlaya) samoanus* (Gruenberg) on carriers with different levels of Microfilaraemia of *Wuchereria bancrofti*. *WHO. VBC.* 79.751, 1979, 21 p.