

DÉFINITION

Douleur lombaire aiguë résultant de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction (le plus souvent un calcul de calcium ou d'acide urique).

SIGNES CLINIQUES

- **Douleur** : Lombaire unilatérale brutale, irradiation vers organes génitaux (OMI/OGE).
- **Comportement** : Agitation, anxiété, aucune position antalgique ("colique frénétique").
- **Signes associés** : Nausées, vomissements, hématurie.

FORMES GRAVES

- **CN Fébrile** : Signe une infection (PNA sur obstacle) = Urgence drainage.
- **CN Anurique** : Rein unique ou obstacle bilatéral = Insuffisance rénale.
- **CN Hyperalgique** : Résistante à la morphine.

EXAMENS & TRAITEMENT

- ✓ **Scanner Abdomino-Pelvien** : Sans injection (Low Dose). Référence pour voir le calcul.
- ✓ **Traitement Crise** : AINS (Kétoprofène) IV (sauf contre-indication) + Antalgiques.
- ✓ **Restriction Hydrique** : Boire peu pendant la crise pour ne pas augmenter la pression rénale.

PIÈGE À ÉVITER

Les AINS sont formellement contre-indiqués chez la femme enceinte (risque fœtal). Utiliser uniquement Paracétamol et avis spécialisé.